

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Lycopodium 9CH, glóbulos

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

En 10 g de glóbulos se han procesado:

Sustancia activa:

Lycopodium (HAB) 9CH 0.1 g.

Excipiente: Sacarosa.

De acuerdo con el método 10 de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB) 10 g de glóbulos de sacarosa se impregnan con 0.1 g de solución hidroalcohólica de Lycopodium en la respectiva dilución y se secan.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Glóbulos

Aproximadamente esféricos, blanquecinos, tamaño 3.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1 Indicaciones terapéuticas

Lycopodium 9CH es un medicamento homeopático de uso oral sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

#### 4.2 Posología y forma de administración

Lycopodium 9CH requiere una posología individualizada basada en las instrucciones de un médico con experiencia en homeopatía. En la terapia homeopática la posología viene definida en primer lugar por el estado de los síntomas (agudos o crónicos) y en segundo lugar por la potencia del remedio unitario. Si existe experiencia documentada con niños, se indica la posología recomendada.

Edad paciente	Condiciones agudas (cada ½ h- 1 hora, max. 6 veces al día)	Condiciones crónicas (1 - 3 veces al día)
Adultos	5 glóbulos	5 glóbulos
Adolescentes 12 - 17 años	5 glóbulos	5 glóbulos
Niños 6 - 11 años	3 glóbulos	3 glóbulos
Niños 2 - 5 años	2 glóbulos	2 glóbulos

#### Población pediátrica menores de 2 años

No hay datos disponibles. No se puede hacer una recomendación posológica.

La posología puede cambiarse de acuerdo con las instrucciones del médico.

Tan pronto como la mejoría tiene lugar, la frecuencia de uso debe reducirse.

Se recomienda tomar los glóbulos media hora antes o después de las comidas y dejar deshacer lentamente los glóbulos en la boca.

No existen datos que indiquen efectos negativos por el uso prolongado de Lycopodium 9CH.

#### **4.3 Contraindicaciones**

No se conocen contraindicaciones hasta la fecha.

#### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

El paciente debe consultar al médico si los síntomas persisten.

Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

*Nota general:* La acción de los medicamentos homeopáticos puede verse adversamente afectada generalmente por factores de hábitos de vida generalmente negativos, así como por estimulantes (tabaco, menta, café, té, etc).

#### **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han observado interacciones con otros medicamentos.

Se advierte a los pacientes de que informen a su médico o farmacéutico si están tomando o han tomado recientemente algún otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

#### **4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia**

No se conocen riesgos específicos por el uso de Lycopodium 9CH durante el embarazo o la lactancia. Por razones generales las mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia se aconseja que consulten al médico antes de utilizar este medicamento.

#### **4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

No son necesarias precauciones especiales.

#### **4.8 Reacciones adversas**

No se conocen reacciones adversas hasta la fecha.

*Nota:* El uso de medicamentos homeopáticos puede temporalmente aumentar los síntomas existentes (agravación inicial). En estos casos la medicación debe suspenderse y debe consultarse a un médico.

Para los remedios homeopáticos los posibles efectos adversos derivan de las propiedades farmacológicas o toxicológicas de las materias primas o excipiente(s). Generalmente no se dispone de estudios clínicos que informen sobre la frecuencia de reacciones adversas.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano <http://www.notificaram.es>.

#### **4.9 Sobredosis**

No se esperan efectos adversos en casos de sobredosis.

### **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

#### **5.1 Propiedades farmacodinámicas**

Grupo farmacoterapéutico: Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

#### **5.2 Propiedades farmacocinéticas**

No aplicable para estos medicamentos homeopáticos.

#### **5.3 Datos preclínicos sobre seguridad**

Las conclusiones obtenidas de datos bibliográficos en farmacología, toxicidad de dosis repetida, genotoxicidad, toxicidad para la reproducción y potencial carcinogénico de esporas de *Lycopodium* no indican ningún riesgo para preparaciones homeopáticas para uso humano.

### **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

#### **6.1 Lista de excipientes**

Sacarosa.

#### **6.2 Incompatibilidades**

No aplicable.

#### **6.3 Periodo de validez**

60 meses.

Período de validez después de la primera apertura: 12 meses.

#### **6.4 Precauciones especiales de conservación**

Este medicamento no requiere ninguna condición especial de conservación.

#### **6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Frasco de vidrio marrón (tipo III) con tapón interno de polietileno de baja densidad y cierre de rosca de polipropileno blanco.

Envase con 10 g de glóbulos.

#### **6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

Ninguna especial.

### **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe

Alemania.  
info@dhu.de

**8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

75663

**9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

03/2012

**10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

10/2014

*La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.*