

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Solenota 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG.

Solenota 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene 5 mg de succinato de solifenacina, equivalente a 3,8 mg de solifenacina.

Cada comprimido contiene 10 mg de succinato de solifenacina, equivalente a 7,5 mg de solifenacina

#### Excipiente con efecto conocido:

Cada comprimido contiene 117,52 mg de lactosa anhidra.

Cada comprimido contiene 112,52 mg de lactosa anhidra.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido recubierto con película.

Cada comprimido de 5 mg es de color amarillo claro, redondo, biconvexo, recubierto con película y grabado con “APO” en una cara y con “S 5” en la otra cara.

Cada comprimido de 10 mg es de color rosa claro, redondo, biconvexo, recubierto con película y grabado con “APO” en una cara y con “S 10” en la otra cara.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento sintomático de la incontinencia de urgencia y/o aumento de la frecuencia urinaria y la urgencia que puede producirse en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva.

#### 4.2. Posología y forma de administración

##### Posología

##### *Adultos, incluidos pacientes de edad avanzada*

La dosis recomendada es de 5 mg de succinato de solifenacina una vez al día. En caso necesario, se puede aumentar la dosis a 10 mg de succinato de solifenacina una vez al día.

##### *Población pediátrica*

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de solifenacina en niños. Por tanto, solifenacina no se debe utilizar en niños.

##### *Pacientes con insuficiencia renal*

No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina  $> 30$  ml/min). Los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min) deben ser tratados con precaución y no deben recibir más de 5 mg una vez al día (ver sección 5.2).

#### *Pacientes con insuficiencia hepática*

No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. Los pacientes con insuficiencia hepática moderada (Puntuación de Child-Pugh de 7 a 9) deben ser tratados con precaución y no deben recibir más de 5 mg una vez al día (ver sección 5.2).

#### *Pacientes en tratamiento con inhibidores potentes del citocromo P450 3A4*

La dosis máxima de solifenacina debe limitarse a 5 mg cuando se administre simultáneamente con ketoconazol o con dosis terapéuticas de otros inhibidores potentes del CYP3A4, como por ejemplo ritonavir, nelfinavir, itraconazol (ver sección 4.5).

#### Forma de administración

Solenota se debe tomar por vía oral y debe tragarse entero con líquidos. Puede tomarse con o sin alimentos.

### **4.3. Contraindicaciones**

Solifenacina está contraindicada en pacientes con retención urinaria, trastornos gastrointestinales graves (incluyendo megacolon tóxico), miastenia gravis o glaucoma de ángulo estrecho y en pacientes que presentan riesgo de estas patologías.

- Pacientes hipersensibles al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Pacientes sometidos a hemodiálisis (ver sección 5.2).
- Pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 5.2).
- Pacientes con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática moderada en tratamiento simultáneo con un inhibidor potente del CYP3A4, por ejemplo, ketoconazol (ver sección 4.5).

### **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Antes de iniciar el tratamiento con Solifenacina deben ser valoradas otras causas de micción frecuente (insuficiencia cardíaca o enfermedad renal). Si se presenta una infección del tracto urinario, se debe iniciar el tratamiento antibacteriano apropiado.

Solifenacina debe usarse con precaución en pacientes con:

- Obstrucción clínicamente significativa de la salida vesical con riesgo de retención urinaria.
- Trastornos obstructivos gastrointestinales.
- Riesgo de motilidad gastrointestinal disminuida.
- Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min; ver secciones 4.2 y 5.2), y las dosis no deben exceder de 5 mg en estos pacientes.
- Insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9; ver secciones 4.2 y 5.2), y las dosis no deben exceder de 5 mg en estos pacientes.
- Uso concomitante de un inhibidor potente del CYP3A4, por ejemplo ketoconazol (ver secciones 4.2 y 4.5).
- Hernia de hiato/reflujo gastroesofágico y/o que estén en tratamiento con medicamentos (como bifosfonatos) que puedan causar o empeorar la esofagitis.
- Neuropatía autonómica.

#### *Prolongación del intervalo QT*

Se han observado casos de prolongación del intervalo QT y de Torsades de Pointes en pacientes con factores de riesgo, tales como síndrome de QT largo preexistente e hipopotasemia.

Todavía no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con hiperactividad del detrusor por causa neurogénica.

Se ha notificado angioedema con obstrucción de vías respiratorias en algunos pacientes tratados con succinato de solifenacina. Si aparece angioedema, se debe interrumpir el tratamiento con succinato de solifenacina y se debe instaurar la terapia y/o las medidas adecuadas.

Se ha notificado reacción anafiláctica en algunos pacientes tratados con succinato de solifenacina. En pacientes que desarrollan reacciones anafilácticas, se debe interrumpir el tratamiento con succinato de solifenacina y se debe instaurar la terapia y/o las medidas adecuadas.

El máximo efecto de solifenacina puede alcanzarse a partir de las 4 semanas de tratamiento.

Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

#### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

##### Interacciones farmacológicas

La medicación concomitante con otros medicamentos con propiedades anticolinérgicas puede dar lugar a efectos terapéuticos y efectos adversos más pronunciados. Debe dejarse un intervalo de aproximadamente una semana después de interrumpir el tratamiento con solifenacina antes de comenzar con otro tratamiento anticolinérgico. El efecto terapéutico de solifenacina puede verse reducido por la administración concomitante de agonistas de los receptores colinérgicos.

La solifenacina puede reducir el efecto de los medicamentos que estimulan la motilidad del tubo digestivo, como metoclopramida y cisaprida.

##### Interacciones farmacocinéticas

Estudios *in vitro* han demostrado que a concentraciones terapéuticas, solifenacina no inhibe las enzimas CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 o 3A4 derivadas de microsomas hepáticos humanos. Por tanto, es improbable que solifenacina altere el aclaramiento de los medicamentos metabolizados por dichas enzimas CYP.

##### Efecto de otros medicamentos sobre la farmacocinética de solifenacina

Solifenacina se metaboliza por el CYP3A4. La administración simultánea de ketoconazol (200 mg/día), un potente inhibidor del CYP3A4, duplicó el AUC de solifenacina, mientras que la administración de ketoconazol a dosis de 400 mg/día triplicó el AUC de solifenacina. Por tanto, la dosis máxima de solifenacina debe limitarse a 5 mg cuando se administre simultáneamente con ketoconazol o con dosis terapéuticas de otros potentes inhibidores del CYP3A4 (como ritonavir, nelfinavir, itraconazol) (ver sección 4.2).

El tratamiento simultáneo de solifenacina y un inhibidor potente de CYP3A4 está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática moderada.

No se han estudiado los efectos de la inducción enzimática sobre la farmacocinética de la solifenacina y sus metabolitos ni el efecto de los sustratos con elevada afinidad por el CYP3A4 sobre la exposición de solifenacina. Dado que la solifenacina es metabolizada por el CYP3A4, son posibles las interacciones farmacocinéticas con otros sustratos con elevada afinidad por el CYP3A4 (p.ej., verapamilo, diltiazem) e inductores del CYP3A4 (p.ej., rifampicina, fenitoína, carbamazepina).

##### Efecto de solifenacina sobre la farmacocinética de otros medicamentos

##### *Anticonceptivos orales*

La administración de solifenacina no mostró interacción farmacocinética de solifenacina con anticonceptivos orales combinados (etinilestradiol/levonorgestrel).

#### *Warfarina*

La administración de solifenacina no alteró la farmacocinética de *R*-warfarina ni de *S*-warfarina ni su efecto sobre el tiempo de protrombina.

#### *Digoxina*

La administración de solifenacina no mostró efectos sobre la farmacocinética de digoxina.

### **4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia**

#### Embarazo

No hay datos los datos son reducidos sobre el uso de succinato de solifenacina en mujeres embarazadas.

Los estudios en animales no indican efectos dañinos directos o indirectos con respecto a la toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3).

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Solifenacina durante el embarazo.

#### Lactancia

Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales han demostrado la excreción de succinato de solifenacina/metabolitos en la leche (para más detalles ver 5.3).

No se puede excluir un riesgo para los recién nacidos/lactantes.

Se debe tomar la decisión de suspender la lactancia o suspender/abstenerse del tratamiento con Solifenacina teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia materna para el niño y el beneficio del tratamiento para la mujer.

### **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

Dado que solifenacina, al igual de otros anticolinérgicos, puede provocar visión borrosa y, de forma poco frecuente, somnolencia y fatiga (ver sección 4.8, Reacciones adversas), la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede verse afectada negativamente.

### **4.8. Reacciones adversas**

#### Resumen del perfil de seguridad

Debido al efecto farmacológico de solifenacina, Solenota puede provocar efectos adversos anticolinérgicos (en general) de intensidad leve o moderada. La frecuencia de los efectos adversos anticolinérgicos está relacionada con la dosis.

La reacción adversa comunicada con mayor frecuencia con solifenacina fue sequedad de boca. Se produjo en un 11% de los pacientes tratados con 5 mg una vez al día, en un 22% de los pacientes tratados con 10 mg una vez al día y en un 4% de los pacientes tratados con placebo. La intensidad de sequedad de boca fue generalmente leve y sólo ocasionalmente dio lugar a la interrupción del tratamiento. En general, el cumplimiento terapéutico fue muy elevado (aproximadamente el 99%) y aproximadamente un 90% de los pacientes tratados con solifenacina completaron todo el periodo de estudio de 12 semanas de tratamiento.

#### Tabla de reacciones adversas

| <b>Clasificación de órganos del Sistema MedDRA</b>     | <b>Muy frecuentes<br/>≥1/10</b> | <b>Frecuentes<br/>&gt;1/100 a<br/>&lt;1/10</b>           | <b>Poco frecuentes<br/>&gt;1/1.000 a<br/>&lt;1/100</b>   | <b>Raras<br/>&gt;1/10.000 a<br/>&lt;1/1.000</b>       | <b>Muy raras<br/>&lt;1/10.000</b>                | <b>Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)</b>  |
|--|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| Infecciones e infestaciones                            |                                 |  | Infección del tracto urinario<br>Cistitis                |   |  |   |
| Trastornos del sistema inmunológico                    |                                 |  |  |   |  | Reacción anafiláctica*  |
| Trastornos del metabolismo y de la nutrición           |                                 |  |  |   |  | Apetito disminuido*<br>Hipertensión*  |
| Trastornos psiquiátricos                               |                                 |  |  |   | Alucinaciones*<br>Estado de confusión*           | Delirio*  |
| Trastornos del sistema nervioso                        |                                 |  | Somnolencia<br>Disgeusia                                 | Mareo*<br>Dolor de cabeza*                            |  |   |
| Trastornos oculares                                    |                                 | Visión borrosa   | Ojos secos   |   |  | Glaucoma*   |
| Trastornos cardíacos                                   |                                 |  |  |   |  | Torsades de Pointes*<br>Intervalo QT del electrocardiograma prolongado*<br>Fibrilación auricular*<br>Palpitaciones*<br>Taquicardia* |
| Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos    |                                 |  | Sequedad nasal   |   |  | Disfonía*   |
| Trastornos gastrointestinales                          | Sequedad de boca                | Estreñimiento<br>Nauseas<br>Dispepsia<br>Dolor abdominal | Enfermedades de reflujo gastroesofágico<br>Garganta seca | Obstrucción colónica<br>Impactación fecal<br>Vómitos* |  | Íleo*<br>Molestia abdominal*  |
| Trastornos hepatobiliares                              |                                 |  |  |   |  | Trastorno hepático*<br>Prueba anormal de función hepática*  |
| Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo          |                                 |  | Piel seca  | Prurito*<br>Erupción cutánea*                         | Eritema multiforme*<br>Urticaria*<br>Angioedema* | Dermatitis exfoliativa*   |
| Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo |                                 |  |  |   |  | Pérdida de fuerza muscular*   |
| Trastornos renales y urinarios                         |                                 |  | Dificultad de micción                                    | Retención urinaria                                    |  | Insuficiencia renal*  |
| Trastornos   |                                 |  | Cansancio  |   |  |   |

| Clasificación de órganos del Sistema MedDRA               | Muy frecuentes<br>≥1/10 | Frecuentes<br>>1/100 a<br><1/10 | Poco frecuentes<br>>1/1.000 a<br><1/100 | Raras<br>>1/10.000 a<br><1/1.000 | Muy raras<br><1/10.000 | Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|
| generales y alteraciones en el lugar de la administración |                         |                                 | Edema periférico                        |                                  |                        |   |

\*Observados después de la comercialización.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es).

### 4.9. Sobredosis

#### Síntomas

La sobredosis con succinato de solifenacina puede producir potencialmente efectos anticolinérgicos graves. La dosis más alta de succinato de solifenacina administrada accidentalmente a un único paciente fue de 280 mg durante un periodo de 5 horas, produciendo cambios en el estado mental que no requirieron hospitalización.

#### Tratamiento

En caso de sobredosis con succinato de solifenacina el paciente debe ser tratado con carbón activo. El lavado gástrico es útil si se realiza dentro de la hora siguiente, pero no se debe inducir el vómito.

Como ocurre con otros anticolinérgicos, los síntomas pueden tratarse de la siguiente manera:

- Efectos anticolinérgicos centrales graves como alucinaciones o excitación pronunciada: debe tratarse con fisostigmina o carbacol.
- Convulsiones o excitación pronunciada: debe tratarse con benzodiazepinas.
- Insuficiencia respiratoria: debe tratarse con respiración artificial.
- Taquicardia: debe tratarse con betabloqueantes.
- Retención urinaria: debe tratarse con sondaje.
- Midriasis: debe tratarse con un colirio de pilocarpina y/o colocando al paciente en una habitación oscura.

Al igual que con otros antimuscarínicos, en caso de sobredosis, se debe prestar atención específica a pacientes con riesgo conocido de prolongación del intervalo QT (es decir, hipopotasemia, bradicardia y administración concomitante de fármacos que prolongan el intervalo QT) y enfermedades cardíacas relevantes preexistentes (como isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva).

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antiespasmódicos urinarios, código ATC: G04B D08.

#### Mecanismo de acción

Solifenacina es un antagonista competitivo específico del receptor colinérgico.

La vejiga urinaria está inervada por nervios colinérgicos parasimpáticos. La acetilcolina contrae el músculo liso detrusor mediante los receptores muscarínicos, de los cuales, el subtipo M3 está implicado de forma predominante. Los estudios farmacológicos *in vitro* e *in vivo* indican que la solifenacina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos subtipo M3. Además, la solifenacina ha demostrado ser un antagonista específico de los receptores muscarínicos mostrando baja o ninguna afinidad por otros diversos receptores y por los canales iónicos analizados.

#### Efectos farmacodinámicos

El tratamiento con solifenacina administrado en dosis de 5 mg y 10 mg al día se estudió en varios ensayos clínicos doble ciego, aleatorizados y controlados, realizados en hombres y mujeres con vejiga hiperactiva.

Como se muestra en la tabla siguiente, tanto las dosis de 5 mg como las de 10 mg de solifenacina produjeron mejorías estadísticamente significativas en los parámetros primarios y secundarios en comparación con placebo. Se observó eficacia a partir de la primera semana tras comenzar con el tratamiento, estabilizándose durante un periodo de 12 semanas. Un estudio abierto a largo plazo demostró que la eficacia se mantenía durante al menos 12 meses. Después de 12 semanas de tratamiento, aproximadamente un 50% de los pacientes que padecían incontinencia antes del tratamiento dejaron de padecerla y, además, un 35% de los pacientes alcanzó una frecuencia de micción de menos de 8 micciones por día. El tratamiento de los síntomas de vejiga hiperactiva además produce un efecto beneficioso sobre varias medidas de calidad de vida, como la percepción de salud general, impacto de la incontinencia, limitaciones de funciones, limitaciones físicas, limitaciones sociales, emociones, intensidad de los síntomas, medidas de gravedad y sueño/energía.

*Resultados (datos agrupados) de cuatro estudios controlados fase III con una duración de tratamiento de 12 semanas*

|   | <b>Placebo</b> | <b>Solifenacina<br/>5 mg<br/>1 vez/día</b> | <b>Solifenacina<br/>10 mg<br/>1 vez/día</b> | <b>Tolterodina<br/>2 mg<br/>2 veces/día</b> |
|---|----------------|--|---|---|
| <b>Nº micciones/24 h</b>                  |                |  |   |   |
| Media basal                               | 11,9           | 12,1                                       | 11,9  | 12,1  |
| Reducción media desde el inicio           | 1,4            | 2,3  | 2,7   | 1,9   |
| % cambio desde el inicio                  | (12%)          | (19%)                                      | (23%)                                       | (16%)                                       |
| n   | 1138           | 552  | 1158  | 250   |
| Valor p*                                  |                | <0,001                                     | <0,001                                      | 0,004                                       |
| <b>Nº de episodios de urgencia/24 h</b>   |                |  |   |   |
| Media basal                               | 6,3            | 5,9  | 6,2   | 5,4   |
| Reducción media desde el inicio           | 2,0            | 2,9  | 3,4   | 2,1   |
| % cambio desde el inicio                  | (32%)          | (49%)                                      | (55%)                                       | (39%)                                       |
| n   | 1124           | 548  | 1151  | 250   |
| Valor p*                                  |                | <0,001                                     | <0,001                                      | 0,031                                       |
| <b>Nº episodios de incontinencia/24 h</b> |                |  |   |   |
| Media basal                               | 2,9            | 2,6  | 2,9   | 2,3   |
| Reducción media desde el inicio           | 1,1            | 1,5  | 1,8   | 1,1   |
| % cambio desde el inicio                  | (38%)          | (58%)                                      | (62%)                                       | (48%)                                       |
| n   | 781            | 314  | 778   | 157   |
| Valor p*                                  |                | <0,001                                     | <0,001                                      | <0,009                                      |
| <b>Nº episodios de nocturia/24 h</b>      |                |  |   |   |
| Media basal                               | 1,8            | 2,0  | 1,8   | 1,9   |
| Reducción media desde el inicio           | 0,4            | 0,6  | 0,6   | 0,5   |
| % cambio desde el inicio                  | (22%)          | (30%)                                      | (33%)                                       | (26%)                                       |
| n   | 1005           | 494  | 1035  | 232   |



|                                 | <b>Placebo</b> | <b>Solifenacina<br/>5 mg<br/>1 vez/día</b> | <b>Solifenacina<br/>10 mg<br/>1 vez/día</b> | <b>Tolterodina<br/>2 mg<br/>2 veces/día</b> |
|---------------------------------|----------------|--|---|---|
| Valor p*                        |                | 0,025                                      | <0,001                                      | 0,199                                       |
| <b>Volumen evacuado/micción</b> |                |  |   |   |
| Media basal                     | 166 ml         | 146 ml                                     | 163 ml                                      | 147 ml                                      |
| Reducción media desde el inicio | 9 ml           | 32 ml                                      | 43 ml                                       | 24 ml                                       |
| % cambio desde el inicio        | (5%)           | (21%)                                      | (26%)                                       | (16%)                                       |
| n                               | 1135           | 552  | 1156  | 250   |
| Valor p*                        |                | <0,001                                     | <0,001                                      | <0,001                                      |
| <b>Nº de compresas/24 h</b>     |                |  |   |   |
| Media basal                     | 3,0            | 2,8  | 2,7   | 2,7   |
| Reducción media desde el inicio | 0,8            | 1,3  | 1,3   | 1,0   |
| % cambio desde el inicio        | (27%)          | (46%)                                      | (48%)                                       | (37%)                                       |
| n                               | 238            | 236  | 242   | 250   |
| Valor p*                        |                | <0,001                                     | <0,001                                      | 0,010                                       |

Nota: En 4 de los estudios fundamentales, se usaron 10 mg de solifenacina y placebo. En 2 de los 4 estudios se emplearon además 5 mg de solifenacina y uno de estos estudios incluyó 2 mg de tolterodina dos veces/día. No todos los parámetros ni grupos de tratamiento se evaluaron en cada estudio individual. Por tanto, las cifras de pacientes que se indican pueden presentar desviaciones por parámetro y grupo de tratamiento.

\*Valor de p para la comparación por parejas frente a placebo.

## 5.2. Propiedades farmacocinéticas

### Absorción

Después de tomar solifenacina comprimidos, las concentraciones plasmáticas máximas de solifenacina (C<sub>máx</sub>) se alcanzan después de 3 a 8 horas. La t<sub>máx</sub> es independiente de la dosis. La C<sub>máx</sub> y el área bajo la curva (AUC) aumentan en proporción a la dosis entre 5 y 40 mg. La biodisponibilidad absoluta es aproximadamente del 90%.

La ingesta de alimentos no afecta a la C<sub>máx</sub> ni al AUC de solifenacina.

### Distribución

El volumen de distribución aparente de solifenacina tras la administración intravenosa es aproximadamente 600 litros. Solifenacina se une en gran medida (aproximadamente un 98%) a proteínas plasmáticas, principalmente a la glucoproteína ácida  $\alpha$ 1.

### Biotransformación

Solifenacina es ampliamente metabolizada por el hígado, principalmente por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4). No obstante, existen vías metabólicas alternativas que pueden contribuir al metabolismo de solifenacina. El aclaramiento sistémico de solifenacina es de alrededor de 9,5 l/h y la semivida terminal es de 45-68 horas. Después de la dosificación oral, se ha identificado en el plasma un metabolito farmacológicamente activo (4R-hidroxi solifenacina) y tres inactivos (N-glucurónido, N-óxido y 4R-hidroxi-N-óxido de solifenacina), además de la solifenacina.

### Eliminación

Después de una administración única de 10 mg de solifenacina [marcada con C14], aproximadamente el 70% de la radiactividad se detectó en orina y un 23% en heces durante 26 días. En orina, aproximadamente un 11% de la radiactividad se recuperó como sustancia activa inalterada, alrededor de un 18% como el metabolito N-óxido, 9% como el metabolito 4R-hidroxi-N-óxido y 8% como el metabolito 4R-hidroxi (metabolito activo).

### Linealidad/No linealidad

La farmacocinética es lineal en el intervalo de dosis terapéutica.



## Otras poblaciones especiales

### *Personas de edad avanzada*

No se precisa ajuste de la dosificación en función de la edad del paciente. Los estudios en pacientes de edad avanzada han demostrado que la exposición a solifenacina, expresada como el AUC, después de la administración de succinato de solifenacina (5 mg y 10 mg una vez al día) fue similar en pacientes de edad avanzada sanos (edades entre 65 y 80 años) y en sujetos jóvenes sanos (edad inferior a 55 años). La velocidad media de la absorción expresada como  $t_{max}$  fue ligeramente más lenta en los pacientes de edad avanzada y la semivida terminal fue aproximadamente un 20% más larga en los pacientes de edad avanzada. Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas.

### *Pacientes pediátricos*

No se ha establecido la farmacocinética de solifenacina en niños ni adolescentes.

### *Sexo*

La farmacocinética de solifenacina no está influenciada por el sexo.

### *Raza*

La farmacocinética de solifenacina no está influenciada por la raza.

### *Insuficiencia renal*

El AUC y la  $C_{max}$  de solifenacina en pacientes con insuficiencia renal leve y moderada, no fue significativamente diferente de la observada en voluntarios sanos. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min) la exposición a solifenacina fue significativamente mayor que en los controles con incrementos de aproximadamente un 30% en la  $C_{max}$ , de más del 100% en el AUC y de más del 60% en la  $t_{1/2}$ . Se observó una relación estadísticamente significativa entre el aclaramiento de creatinina y el aclaramiento de solifenacina. No se ha estudiado la farmacocinética en pacientes sometidos a hemodiálisis.

### *Insuficiencia hepática*

En pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9) la  $C_{max}$  no se vio afectada, el AUC aumentó un 60% y la  $t_{1/2}$  se duplicó. No se ha estudiado la farmacocinética de solifenacina en pacientes con insuficiencia hepática grave.

## **5.3. Datos preclínicos sobre seguridad**

Los datos preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales sobre farmacología de seguridad, toxicidad de dosis repetidas, fertilidad, desarrollo embrionofetal, genotoxicidad y potencial carcinogénico. En los estudios de desarrollo pre- y postnatal en ratones, el tratamiento con solifenacina de la madre durante la lactancia causó un índice de supervivencia postpartum inferior y dosis-dependiente, disminución del peso de las crías y desarrollo físico más lento a niveles clínicamente relevantes. Se observó un aumento de la mortalidad dosis dependiente en ratones jóvenes, sin signos clínicos anteriores, que comenzaron a tratarse el día 10 o el día 21 de vida, con dosis que suponen un efecto farmacológico. La mortalidad en los dos grupos de ratones jóvenes fue más elevada que en los ratones adultos. La exposición plasmática en los ratones jóvenes que comenzaron a tratarse el día 10 de vida fue superior a la de los ratones adultos; la exposición sistémica desde el día 21 de vida en adelante fue comparable a la de los ratones adultos. Se desconocen las implicaciones clínicas del aumento de la mortalidad en ratones jóvenes.

## **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

### **6.1. Lista de excipientes**

*Núcleo del comprimido:*

Lactosa anhidra  
Croscarmelosa sódica  
Hidroxipropil celulosa (Klucel EXF)  
Estearato de magnesio

*Recubrimiento del comprimido:*

Polivinil alcohol  
Polietilen glicol 8000  
Dióxido de titanio (E171)  
Talco  
Óxido de hierro amarillo (E172) (sólo para la dosis de 5 mg)  
Óxido de hierro rojo (E172) (sólo para la dosis de 10 mg)

### **6.2. Incompatibilidades**

No procede.

### **6.3. Periodo de validez**

3 años.

### **6.4. Precauciones especiales de conservación**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

### **6.5. Naturaleza y contenido del envase**

Blísters de película transparente de aluminio HSL Alu-PVC: Envase blíster que contiene 10, 30 y 100 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

### **6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

Ninguna especial.

## **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

SETONDA S.L.  
C/ Joaquim Costa 18, 1  
08390 Montgat (Barcelona)  
España

## **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

## **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Marzo 2020

## **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Junio 2017