

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 5 mg de amlodipino (como amlodipino besilato), 160 mg de valsartán y 12,5 mg de hidroclorotiazida.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 5 mg de amlodipino (como amlodipino besilato), 160 mg de valsartán y 25 mg de hidroclorotiazida.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de amlodipino (como amlodipino besilato), 160 mg de valsartán y 12,5 mg de hidroclorotiazida.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de amlodipino (como amlodipino besilato), 160 mg de valsartán y 25 mg de hidroclorotiazida.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de amlodipino (como amlodipino besilato), 320 mg de valsartán y 25 mg de hidroclorotiazida.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido recubierto con película (comprimido).

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimido recubierto con película de color blanco, alargado y biconvexo, con la inscripción "LLL" en una cara y unas dimensiones aproximadas de 15,3 mm x 6,2 mm.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimido recubierto con película de color amarillo, alargado y biconvexo, con la inscripción "LLH" en una cara y unas dimensiones aproximadas de 15,3 mm x 6,2 mm.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimido recubierto con película de color amarillo pálido, alargado y biconvexo, con la inscripción "HLL" en una cara y unas dimensiones aproximadas de 15,3 mm x 6,2 mm.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimido recubierto con película de color marrón amarillento, alargado y biconvexo, con la inscripción "HLH" en una cara y unas dimensiones aproximadas de 15,3 mm x 6,2 mm.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/320 mg/25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Comprimido recubierto con película de color marrón amarillento, alargado y biconvexo, con la inscripción "HHH" en una cara y unas dimensiones aproximadas de 19,1 mm x 8,3 mm.

## 4. DATOS CLÍNICOS

### 4.1 Indicaciones terapéuticas

Tratamiento de la hipertensión arterial esencial como tratamiento de sustitución en pacientes adultos cuya presión arterial está adecuadamente controlada con la combinación de amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida (HCTZ), tomada en formulaciones de cada uno de los tres componentes por separado o en una formulación de dos componentes más la de un componente solo.

### 4.2 Posología y forma de administración

#### Posología

La dosis recomendada de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan es un comprimido al día, administrado preferentemente por la mañana.

Antes de cambiar a Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, el paciente debe estar controlado con dosis estables de los componentes individuales administradas concomitantemente. Cuando se realice el cambio, la dosis de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan ha de basarse en la dosis de los componentes individuales de la combinación.

La dosis máxima recomendada de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan es 10 mg/320 mg/25 mg.

#### Poblaciones especiales

##### *Insuficiencia renal*

Debido al componente hidroclorotiazida, la administración de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicada en pacientes con anuria (ver sección 4.3) y en pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular (TFG) <30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2).

No se requiere un ajuste de la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (ver secciones 4.4 y 5.2).

##### *Insuficiencia hepática*

Debido al componente valsartán, Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 4.3). En pacientes con insuficiencia hepática de leve

a moderada sin colestasis, la dosis máxima recomendada es 80 mg de valsartán y por lo tanto Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan no es adecuado para este grupo de pacientes (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). No se han establecido recomendaciones de dosis de amlodipino en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. Cuando a los pacientes hipertensos candidatos (ver sección 4.1) con insuficiencia hepática se les cambie a Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, se debe utilizar la dosis más baja disponible del componente de amlodipino.

#### *Insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria*

Se dispone de una experiencia limitada de uso de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, especialmente con la dosis máxima, en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Se recomienda precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, en particular con la dosis máxima de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, 10 mg/320 mg/25 mg.

#### *Pacientes de edad avanzada (65 años o mayores)*

Se recomienda precaución, incluyendo una monitorización más frecuente de la presión arterial, en pacientes de edad avanzada, en particular con la dosis máxima de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, 10 mg/320 mg/25 mg, ya que se dispone de datos limitados en esta población de pacientes. Cuando a los pacientes hipertensos de edad avanzada candidatos (ver sección 4.1) cuando se les cambie a Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, se debe utilizar la dosis más baja disponible del componente de amlodipino.

#### *Población pediátrica*

No existe una recomendación de uso específica para Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan en la población pediátrica (pacientes menores de 18 años) para la indicación de hipertensión arterial esencial.

#### Forma de administración

Vía oral.

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan se puede tomar con o sin alimentos.

Los comprimidos deben tragarse enteros con un poco de agua, cada día a la misma hora y preferentemente por la mañana.

### **4.3 Contraindicaciones**

- Hipersensibilidad a los principios activos, a otros derivados de las sulfonamidas, a derivados de la dihidropiridina, o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Segundo y tercer trimestres del embarazo (ver secciones 4.4 y 4.6).
- Insuficiencia hepática, cirrosis biliar o colestasis.
- Insuficiencia renal grave (TFG  $<30$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), anuria y pacientes sometidos a diálisis.
- El uso concomitante de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan con Aliskiren está contraindicado en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal (TFG  $<60$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) (ver secciones 4.5 y 5.1).
- Hipopotasemia refractaria, hiponatremia, hipercalcemia e hiperuricemia sintomática.
- Hipotensión grave.
- Shock (incluyendo shock cardiogénico).
- Obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (p.ej. cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y estenosis aórtica de alto grado).
- Insuficiencia cardíaca hemodinámicamente inestable tras infarto agudo de miocardio.

### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

No se ha establecido la seguridad y eficacia de amlodipino en crisis hipertensivas.

### Pacientes con depleción de sodio y/o de volumen

Se observó una hipotensión excesiva, incluida hipotensión ortostática, en 1,7% de los pacientes tratados con la dosis máxima de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan (10 mg/320 mg/25 mg) en comparación con el 1,8% de los pacientes tratados con valsartán/hidroclorotiazida (320 mg/25 mg), el 0,4% de los pacientes tratados con amlodipino/valsartán (10 mg/320 mg) y el 0,2% de los pacientes tratados con hidroclorotiazida/amlodipino (25 mg/10 mg) en un ensayo clínico controlado con pacientes que padecían hipertensión sin complicaciones de moderada a grave.

En pacientes con depleción de sodio y/o de volumen, como los que reciben dosis altas de diuréticos, puede ocurrir una hipotensión sintomática tras el inicio del tratamiento con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan. Este medicamento solo debe utilizarse tras corregir cualquier depleción de sodio y/o volumen preexistentes.

Si se presenta una hipotensión excesiva con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, debe colocarse al paciente en posición de decúbito supino y, si es necesario, administrar una perfusión intravenosa de solución fisiológica salina. Una vez la presión arterial haya sido estabilizada, el tratamiento puede continuarse.

### Cambios en las concentraciones séricas de electrolitos

#### Amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida

En un ensayo clínico controlado con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, los efectos contrarios de 320 mg de valsartán y de 25 mg de hidroclorotiazida sobre las concentraciones de potasio en suero se compensaron bastante uno a otro en muchos pacientes. En otros pacientes, uno u otro efecto puede predominar. Se deberán llevar a cabo determinaciones periódicas de las concentraciones séricas de electrolitos a intervalos apropiados para detectar un posible desequilibrio electrolítico.

Se deberá llevar a cabo una determinación periódica de las concentraciones séricas de electrolitos y en particular del potasio a intervalos apropiados para detectar un posible desequilibrio electrolítico, especialmente en pacientes con otros factores de riesgo como la insuficiencia renal, el tratamiento con otros medicamentos o con antecedentes de desequilibrio electrolítico.

#### Valsartán

No se recomienda el uso concomitante de suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan aumentar los niveles de potasio (heparina, etc.). Debe realizarse oportunamente la monitorización de los niveles de potasio.

#### Hidroclorotiazida

El tratamiento con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan solo debe iniciarse tras corregir la hiperpotasemia y cualquier hipomagnesemia coexistente. Los diuréticos tiazídicos pueden precipitar una hipopotasemia de nueva aparición o exacerbar una hipopotasemia preexistente. Los diuréticos tiazídicos deben administrarse con precaución en pacientes con patologías que impliquen una potenciación de la pérdida de potasio, por ejemplo, nefropatías con pérdida de sal y deterioro prerrenal (cardiogénico) de la función renal. Si la hipopotasemia se desarrolla durante el tratamiento con hidroclorotiazida, debe interrumpirse la administración de este medicamento hasta corregir de forma estable el balance de potasio.

Los diuréticos tiazídicos pueden precipitar una hiponatremia de nueva aparición y una alcalosis hipoclorémica o exacerbar una hiponatremia preexistente. Se ha observado hiponatremia acompañada de síntomas neurológicos (náuseas, desorientación progresiva, apatía). El tratamiento con hidroclorotiazida solo debe iniciarse tras corregir la hiponatremia preexistente. En el caso que durante el tratamiento con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan se desarrolle una hiponatremia grave o rápida, el tratamiento debe interrumpirse hasta la normalización de la hiponatremia.

Todos los pacientes que reciban diuréticos tiazídicos deben monitorizarse periódicamente con respecto a desequilibrios en los electrolitos, especialmente de potasio, sodio y magnesio.

### Insuficiencia renal

Los diuréticos tiazídicos pueden precipitar una azoemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan se administra en pacientes con insuficiencia renal, se recomienda la monitorización periódica de las concentraciones de electrolitos en suero (incluyendo potasio), creatinina y ácido úrico. Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave, anuria o sometidos a diálisis (ver sección 4.3).

No es necesario ajustar la dosis de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan en los pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (TFG  $\geq 30$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>).

### Estenosis de la arteria renal

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan debe utilizarse con precaución para tratar la hipertensión en pacientes con estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal o estenosis en pacientes con un único riñón ya que las concentraciones de urea en sangre y creatinina en suero pueden aumentar en estos pacientes.

### Trasplante renal

Actualmente no existe experiencia en el uso seguro de este medicamento en pacientes que hayan sufrido recientemente un trasplante renal.

### Insuficiencia hepática

Valsartán se elimina principalmente inalterado a través de la bilis. La semivida de amlodipino se prolonga y los valores del AUC son mayores en pacientes con insuficiencia hepática; no se han establecido recomendaciones respecto a la dosis. En pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada sin colestasis, la dosis máxima recomendada es de 80 mg de valsartán, por lo que Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan no resulta adecuado en este grupo de pacientes (ver secciones 4.2, 4.3 y 5.2).

### Angioedema

En pacientes tratados con valsartán se ha notificado angioedema, incluyendo hinchazón de la laringe y la glotis, que causa una obstrucción de las vías respiratorias y/o hinchazón de la cara, labios, faringe y/o lengua. Algunos de estos pacientes experimentaron previamente angioedema con otros medicamentos, incluyendo inhibidores de la ECA. La administración de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan debe interrumpirse inmediatamente en pacientes que desarrollen angioedema y no debe volver a administrarse en estos pacientes.

### Insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria/posinfarto de miocardio

En pacientes susceptibles, pueden anticiparse cambios en la función renal como consecuencia de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En pacientes con insuficiencia cardíaca grave cuya función renal pueda depender de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se asocia el tratamiento con inhibidores de la ECA y antagonistas del receptor de la angiotensina con oliguria y/o azotemia progresiva y (en raras ocasiones) con insuficiencia renal aguda y/o muerte. Con valsartán se han registrado resultados similares. La evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca o posinfarto de miocardio siempre debe incluir una valoración de la función renal.

En el estudio a largo plazo, controlado con placebo de amlodipino (PRAISE-2) en pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases III y IV de la NYHA (New York Heart Association Classification) de etiología no isquémica, se asoció amlodipino con un aumento de casos de edema pulmonar a pesar de que no hubo diferencia significativa en la incidencia de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en comparación con placebo.

Los antagonistas de los canales del calcio, incluyendo amlodipino, se deben utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ya que pueden aumentar el riesgo de futuros eventos cardiovasculares y de mortalidad.

Se recomienda precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, particularmente con la dosis máxima de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, 10 mg/320 mg/25 mg, ya que los datos en esta población de pacientes son limitados.

#### Estenosis valvular aórtica y mitral

Como con todos los vasodilatadores, se recomienda especial precaución en pacientes con estenosis mitral o estenosis aórtica importante que no sea de grado elevado.

#### Embarazo

No se debe iniciar ningún tratamiento con Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II (ARAI) durante el embarazo. Salvo que se considere esencial continuar el tratamiento con ARAII, las pacientes que estén planeando quedarse embarazadas deben cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, debe interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARAII, y si procede, iniciar un tratamiento alternativo (ver secciones 4.3 y 4.6).

#### Hiperaldosteronismo primario

Los pacientes con hiperaldosteronismo primario no deben ser tratados con el antagonista de la angiotensina II valsartán ya que el sistema renina-angiotensina no está activado. Por lo tanto, el uso de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan no está recomendado en esta población.

#### Lupus eritematoso sistémico

Se ha notificado que los diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, exacerbaban o activan el lupus eritematoso sistémico.

#### Otras alteraciones metabólicas

Los diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, pueden alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. En pacientes diabéticos pueden ser necesarios ajustes de las dosis de insulina o de los agentes hipoglucemiantes orales.

Debido al componente hidroclorotiazida, Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en caso de hiperuricemia sintomática. La hidroclorotiazida puede aumentar el nivel sérico de ácido úrico debido a una reducción del aclaramiento de ácido úrico y puede causar o exacerbar una hiperuricemia así como desencadenar un ataque de gota en pacientes susceptibles.

Las tiazidas reducen la excreción del calcio en orina y pueden causar una ligera e intermitente elevación de la concentración del calcio en suero en ausencia de alteraciones conocidas en el metabolismo del calcio. Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en pacientes con hipercalcemia y solo debe administrarse tras corregir cualquier hipercalcemia preexistente. Debe interrumpirse el tratamiento con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan si se desarrolla hipercalcemia durante este. Durante el tratamiento con tiazidas, deben controlarse periódicamente los niveles de calcio sérico. Una marcada hipercalcemia puede ser indicativa de un hiperparatiroidismo subyacente. El tratamiento con tiazidas debe discontinuarse antes de efectuar las pruebas de la función paratiroidea.

#### Fotosensibilidad

Con los diuréticos tiazídicos se han notificado casos de reacciones de fotosensibilidad (ver sección 4.8). Si durante el tratamiento con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan aparecen reacciones de fotosensibilidad, se recomienda interrumpir el tratamiento. Si la readministración del diurético se considera necesaria, se recomienda proteger las zonas expuestas al sol o a los rayos UVA.

#### Derrame coroideo, miopía aguda y glaucoma agudo de ángulo cerrado

La hidroclorotiazida, una sulfonamida, se ha asociado con una reacción idiosincrásica que da lugar a un derrame coroideo con defecto del campo visual, miopía transitoria y un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Los síntomas incluyen el inicio agudo de una disminución de la agudeza visual o de dolor ocular y por lo general ocurren en cuestión de horas a semanas del inicio del tratamiento. Un glaucoma agudo de ángulo cerrado no tratado puede producir una pérdida permanente de la visión.

El tratamiento principal es suspender el uso de hidroclorotiazida lo más rápido posible. Si no se logra controlar la presión intraocular, se deberá considerar la administración de un tratamiento médico o quirúrgico inmediato. Entre los factores de riesgo para desarrollar un glaucoma agudo de ángulo cerrado se pueden incluir antecedentes de alergia a las sulfonamidas o a la penicilina.

#### Aspectos generales

Debe tenerse precaución en pacientes con hipersensibilidad previa a otros antagonistas del receptor de la angiotensina II. Las reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida son más probables en pacientes con alergia y asma.

#### Pacientes de edad avanzada (65 años o mayores)

Se recomienda precaución, incluyendo una monitorización más frecuente de la presión arterial, en pacientes de edad avanzada, en particular con la dosis máxima de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan, 10 mg/320 mg/25 mg, ya que se dispone de datos limitados en esta población de pacientes.

#### Bloqueo doble del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

Existe evidencia de que el uso concomitante de inhibidores de la ECA, ARAII o Aliskiren aumentan el riesgo de hipotensión, hiperpotasemia, y disminución de la función renal (incluyendo insuficiencia renal aguda). Como consecuencia, no se recomienda el bloqueo dual del SRAA mediante la utilización combinada de inhibidores de la ECA, ARAII o Aliskiren (ver secciones 4.5 y 5.1).

Si se considera absolutamente necesario el tratamiento de bloqueo doble, únicamente debe realizarse bajo la supervisión de un especialista y la estrecha vigilancia frecuente de la función renal, los electrolitos y la presión arterial. Los inhibidores de la ECA y los ARAII no deben utilizarse en forma concomitante en pacientes con nefropatía diabética.

#### Cáncer de piel no melanoma

Se ha observado un aumento del riesgo de cáncer de piel no melanoma (CPNM) [carcinoma basocelular (CBC) y carcinoma de células escamosas (CEC)] con la exposición a dosis acumuladas crecientes de hidroclorotiazida en dos estudios epidemiológicos, con base en el Registro Nacional Danés de Cáncer. Los efectos fotosensibilizantes de la hidroclorotiazida podrían actuar como un posible mecanismo del CPNM.

Se informará a los pacientes tratados con hidroclorotiazida del riesgo de CPNM y se les indicará que se revisen de manera periódica la piel en busca de lesiones nuevas y que informen de inmediato cualquier lesión de la piel sospechosa. Se indicarán a los pacientes las posibles medidas preventivas, como limitar la exposición a la luz solar y a los rayos UV y, en caso de exposición, utilizar protección adecuada para reducir al mínimo el riesgo de cáncer de piel. Las lesiones de piel sospechosas se deben evaluar de forma rápida, incluidos los análisis histológicos de biopsias. Además, puede ser necesario reconsiderar el uso de hidroclorotiazida en pacientes que hayan experimentado previamente un CPNM (ver también sección 4.8).

### **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han realizado estudios de interacciones de otros medicamentos con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. Por ello, en esta sección solo se proporciona información sobre interacciones con otros medicamentos que son conocidas para las sustancias activas individuales.

Sin embargo, es importante tener en consideración que Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan puede aumentar el efecto hipotensor de otros agentes antihipertensores.

#### Uso concomitante no recomendado

| <b>Componente individual de Amlodipino/ Valsartán/HCTZ</b> | <b>Interacciones observadas con los siguientes agentes</b>  | <b>Efecto de la interacción con otros medicamentos</b>   |
|--|---|--|
| Valsartán y HCTZ   | Litio   | Se han notificado aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio y toxicidad durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la ECA, antagonistas del receptor de la angiotensina II, incluyendo valsartán o tiazidas. Dado que las tiazidas reducen el aclaramiento renal de litio, el riesgo de toxicidad por litio puede presumiblemente aumentar aún más con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. Por ello, durante el uso concomitante se recomienda un control exhaustivo de las concentraciones séricas de litio. |
| Valsartán  | Diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio y otras sustancias que puedan aumentar los niveles de potasio | Se recomienda controlar con frecuencia los niveles plasmáticos de potasio si se considera necesario administrar un medicamento que afecte los niveles de potasio en combinación con valsartán.   |
| Amlodipino   | Pomelo o zumo de pomelo   | No se recomienda la administración de amlodipino con pomelo o zumo de pomelo ya que la biodisponibilidad puede aumentar en algunos pacientes, dando lugar a un aumento de los efectos reductores sobre la presión arterial.  |

Se requiere precaución con el uso concomitante

| <b>Componente individual de Amlodipino/ Valsartán/HCTZ</b> | <b>Interacciones observadas con los siguientes agentes</b>   | <b>Efecto de la interacción con otros medicamentos</b>   |
|--|--|--|
| Amlodipino   | <i>Inhibidores de CYP3A4</i> (p. ej., ketoconazol, itraconazol, ritonavir)   | El uso concomitante de amlodipino con inhibidores fuertes o moderados del citocromo CYP3A4 (inhibidores de la proteasa, antifúngicos azólicos, macrólidos como la eritromicina o la claritromicina, verapamilo o diltiazem) puede dar lugar a un aumento significativo en la exposición a amlodipino. La traducción clínica de estas variaciones de la farmacocinética puede ser más pronunciada en los ancianos. Así, puede requerirse una monitorización clínica y un ajuste de dosis. |
|  | <i>Inductores de CYP3A4</i> (agentes anticonvulsivantes [p. ej. carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, fosfenitoína, primidona], rifampicina, <i>Hypericum perforatum</i> [hierba de San Juan]) | Tras la administración concomitante de inductores conocidos del CYP3A4, la concentración plasmática de amlodipino puede variar. Por lo tanto, se debe vigilar la presión arterial y se debe considerar la regulación de la dosis tanto durante como después de la medicación concomitante, en particular con inductores potentes del CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina e <i>Hypericum perforatum</i> [hierba de San Juan]).   |



|                  |   |   |
|------------------|---|---|
|                  | <i>Simvastatina</i>   | La administración concomitante de dosis múltiples de 10 mg de amlodipino con 80 mg de simvastatina dio lugar a un aumento del 77% en la exposición a simvastatina en comparación con la administración de simvastatina sola. Se recomienda limitar la dosis de simvastatina a 20 mg diarios en pacientes que reciban amlodipino.  |
|                  | <i>Dantroleno (infusión)</i>  | En animales se observan fibrilación ventricular letal y colapso cardiovascular en asociación con hiperpotasemia tras la administración de verapamilo y dantroleno intravenoso. Debido al riesgo de hiperpotasemia, se recomienda evitar la administración conjunta de antagonistas de los canales del calcio, tales como amlodipino, en pacientes susceptibles a hipertermia maligna y en el tratamiento de la hipertermia maligna.   |
| Valsartán y HCTZ | <i>Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2), ácido acetilsalicílico (&gt;3 g/día), y AINEs no selectivos</i> | Los AINEs pueden atenuar el efecto antihipertensivo tanto de los antagonistas de la angiotensina II como de la hidroclorotiazida cuando se administran simultáneamente. Además, el uso concomitante de AINEs y amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida puede llevar a un empeoramiento de la función renal y al incremento del potasio sérico. Por ello, se recomienda un control de la función renal al inicio del tratamiento, así como una hidratación adecuada del paciente. |
| Valsartán        | <i>Inhibidores del transportador de recaptación (rifampicina, ciclosporina) o del transportador de eflujo (ritonavir)</i>   | Los resultados de un estudio <i>in vitro</i> con tejido de hígado humano indican que valsartán es un sustrato del transportador de recaptación hepático OATP1B1 y del transportador de eflujo hepático MRP2. La administración concomitante de inhibidores del transportador de recaptación (rifampicina, ciclosporina) o del transportador de eflujo (ritonavir) pueden aumentar la exposición sistémica a valsartán.  |
| HCTZ             | <i>Alcohol, barbitúricos o narcóticos</i>   | La administración concomitante de diuréticos tiazídicos con sustancias que también tienen un efecto reductor sobre la presión arterial (p. ej. mediante la reducción del sistema nervioso central simpático o una vasodilatación directa) puede potenciar la hipotensión ortostática.   |
|                  | <i>Amantadina</i>   | Las tiazidas, incluyendo hidroclorotiazida, pueden elevar el riesgo de reacciones adversas causadas por la amantadina.  |
|                  | <i>Agentes anticolinérgicos y otros medicamentos que afectan a la motilidad gástrica</i>  | La biodisponibilidad de los diuréticos del tipo de las tiazidas puede aumentar con los agentes anticolinérgicos, (p. ej. atropina, biperideno) aparentemente debido a una disminución de la motilidad gastrointestinal y de la velocidad de vaciado del estómago. Por el contrario, se estima que las sustancias procinéticas como la cisaprida pueden disminuir la biodisponibilidad de los diuréticos tipo tiazida.   |
|                  | <i>Agentes antidiabéticos (p. ej. insulina y agentes antidiabéticos orales) Metformina</i>  | Las tiazidas pueden alterar la tolerancia a la glucosa. Puede ser necesario ajustar la dosis del medicamento antidiabético.   |

|  |  |
|--|--|
|  | Metformina debe utilizarse con precaución debido al riesgo de acidosis láctica inducida por una posible insuficiencia renal funcional ligada a hidroclorotiazida.  |
| <i>Betabloqueantes y diazóxido</i>   | El uso concomitante de diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, con betabloqueantes puede aumentar el riesgo de hiperglucemia. Los diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, pueden incrementar el efecto hiperglucémico del diazóxido.   |
| <i>Ciclosporina</i>  | El tratamiento concomitante con ciclosporina puede aumentar el riesgo de hiperuricemia y complicaciones tipo gota.   |
| <i>Agentes citotóxicos</i>   | Las tiazidas, incluyendo hidroclorotiazida, pueden reducir la excreción renal de los agentes citotóxicos (p.ej. ciclofosfamida y metotrexato) y potenciar sus efectos mielosupresores.   |
| <i>Glucósidos digitálicos</i>  | La hipopotasemia o la hipomagnesemia provocada por las tiazidas pueden presentarse como efectos adversos, favoreciendo la aparición de arritmias cardíacas causadas por digitálicos.   |
| <i>Contrastes yodados</i>  | En caso de deshidratación inducida por diuréticos, existe un aumento del riesgo de insuficiencia renal aguda, especialmente con dosis altas de productos yodados. Los pacientes deben de ser rehidratados antes de la administración.  |
| <i>Resinas de intercambio iónico</i>   | La absorción de los diuréticos tiazídicos, incluyendo la hidroclorotiazida, está disminuida por la colestiramina o el colestipol. Esto puede dar lugar a un efecto sub terapéutico de los diuréticos tiazídicos. Sin embargo, escalonando la dosis de hidroclorotiazida y resina de forma que la hidroclorotiazida se administre al menos 4 horas antes o 4-6 horas después de la administración de las resinas potencialmente se minimizaría la interacción.  |
| <i>Medicamentos que afectan a las concentraciones séricas de potasio</i>         | El efecto hipopotasémico de hidroclorotiazida puede ser aumentado por la administración concomitante de diuréticos caluréticos, corticosteroides, laxantes, hormona adrenocorticotrópica (ACTH), anfotericina, carbenoxolona, penicilina G y derivados del ácido salicílico o antiarrítmicos. Se recomienda controlar los niveles séricos de potasio si estos medicamentos han de prescribirse con la combinación de amlodipino/ valsartán/ hidroclorotiazida. |
| <i>Medicamentos que afectan a las concentraciones séricas de sodio</i>           | El efecto hiponatémico de los diuréticos puede intensificarse por la administración concomitante de medicamentos tales como antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, etc. Se recomienda precaución con la administración a largo plazo de estos medicamentos.  |
| <i>Medicamentos que podrían inducir torsades de pointes</i>                      | Debido al riesgo de hipopotasemia, la hidroclorotiazida debe administrarse con precaución cuando se asocia con medicamentos que podrían inducir torsades de pointes, en particular antiarrítmicos de Clase Ia y Clase III y algunos antipsicóticos.  |
| <i>Medicamentos utilizados para tratar la gota (probenecid, sulfínpirazona y</i> | Puede ser necesario un ajuste de la dosis de los medicamentos uricosúricos ya que la hidroclorotiazida puede elevar el nivel del ácido úrico sérico. Puede ser necesario aumentar la dosis de probenecid o   |

|  |  |
|--|--|
| <i>alopurinol</i> )  | sulfinpirazona.<br>La administración concomitante de diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, puede aumentar la incidencia de reacciones de hipersensibilidad a alopurinol.  |
| <i>Metildopa</i>   | Se han notificado casos aislados de anemia hemolítica con el uso concomitante de hidroclorotiazida y metildopa.  |
| <i>Relajantes del músculo esquelético no despolarizantes (p. ej. tubocurarina)</i> | Las tiazidas, incluyendo hidroclorotiazida, potencian la acción de los derivados del curare  |
| <i>Otros medicamentos antihipertensivos</i>  | Las tiazidas potencian la acción antihipertensiva de otros fármacos antihipertensivos (p. ej. guanetidina, metildopa, betabloqueantes, vasodilatadores, antagonistas de los canales del calcio, inhibidores de la ECA, ARA II e inhibidores directos de la renina [IDR]).  |
| <i>Aminas presoras (p. ej. noradrenalina, adrenalina)</i>                          | La hidroclorotiazida puede reducir la respuesta a las aminas presoras tales como noradrenalina. Se desconoce el significado clínico de este efecto y no es suficiente para excluir su uso.   |
| <i>Vitamina D y sales de calcio</i>  | La administración de diuréticos tiazídicos, incluyendo hidroclorotiazida, con vitamina D o con sales de calcio puede potenciar el aumento de los niveles séricos de calcio. El uso concomitante de los diuréticos del tipo tiazida puede producir una hipercalcemia en pacientes predispuestos a una hipercalcemia (p. ej. hiperparatiroidismo, cáncer o condiciones mediadas por la vitamina D) al incrementar la reabsorción tubular del calcio. |

#### Bloqueo dual del SRAA con ARAII, inhibidores de la ECA o Aliskiren

Los datos de los estudios clínicos han demostrado que el bloqueo dual del SRAA mediante el uso combinado de inhibidores de la ECA, ARAII o Aliskiren se asocia con una mayor frecuencia de acontecimientos adversos tales como hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal (incluyendo insuficiencia renal aguda) en comparación con el uso de un solo agente con efecto sobre el SRAA (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.1).

## **4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia**

### Embarazo

#### Amlodipino

No se ha establecido la seguridad de amlodipino durante el embarazo en humanos. En estudios con animales, la toxicidad reproductiva se observó a dosis altas (ver sección 5.3). El uso durante el embarazo está únicamente recomendado si no hay otra alternativa segura y cuando la enfermedad en sí misma implica un mayor riesgo para la madre y el feto.

#### Valsartán

No se recomienda el uso de los ARAII durante el primer trimestre del embarazo (ver sección 4.4). Está contraindicado el uso de los ARAII durante el segundo y tercer trimestre del embarazo (ver secciones 4.3 y 4.4).

La evidencia epidemiológica sobre el riesgo de teratogenicidad tras la exposición a inhibidores de la ECA durante el primer trimestre de embarazo no ha sido concluyente; sin embargo, no se puede excluir un pequeño aumento del riesgo. Aunque no hay datos epidemiológicos específicos sobre el riesgo que conlleva la administración de Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II (ARAI) durante el

embarazo, pueden existir riesgos similares para este tipo de medicamentos. Salvo que se considere esencial continuar el tratamiento con ARAII, las pacientes que estén planeando quedarse embarazadas deben cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse inmediatamente el tratamiento con los ARAII y, si procede, iniciar un tratamiento alternativo.

Se sabe que la exposición a ARAII durante el segundo y el tercer trimestre induce fetotoxicidad humana (disminución de la función renal, oligohidramnios, retraso de la osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo renal, hipotensión, hiperpotasemia) (ver sección 5.3.).

Si se produce una exposición a ARAII a partir del segundo trimestre del embarazo, se recomienda realizar una prueba de ultrasonidos de la función renal y del cráneo.

Los lactantes cuyas madres hayan sido tratadas con ARAII deberán ser cuidadosamente monitorizados por si se produce hipotensión (ver secciones 4.3 y 4.4).

#### Hidroclorotiazida

Hay limitada experiencia sobre el uso de hidroclorotiazida durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Los estudios en animales no son suficientes.

La hidroclorotiazida atraviesa la placenta. Sobre la base del mecanismo de acción farmacológico de hidroclorotiazida, su uso durante el segundo y tercer trimestre puede comprometer la perfusión placentar del feto y originar efectos fetales y neonatales, como ictericia, alteraciones del balance de electrolitos y trombocitopenia.

#### Amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida

No hay experiencia sobre el uso de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida en mujeres embarazadas. En base a los datos disponibles de los componentes, no se recomienda el uso de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan durante el primer trimestre del embarazo y está contraindicado durante el segundo y tercer trimestres (ver secciones 4.3 y 4.4).

#### Lactancia

Amlodipino se excreta en la leche materna. La proporción de la dosis materna recibida por el lactante se ha calculado con una amplitud intercuartílica del 3 al 7%, con un máximo del 15%. Se desconoce el efecto de amlodipino en los lactantes. No existe información acerca del uso de valsartán durante la lactancia. La hidroclorotiazida se excreta en pequeñas cantidades en la leche materna humana. Dosis elevadas de tiazidas pueden causar una diuresis intensa e inhibir la producción de leche. No es recomendable el uso de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan durante el período de lactancia. Si este medicamento se administra durante la lactancia, las dosis deben mantenerse lo más bajas posible. Es preferible cambiar a un tratamiento cuyo perfil de seguridad en el periodo de lactancia sea más conocido, especialmente en recién nacidos o prematuros.

#### Fertilidad

No hay ensayos clínicos sobre fertilidad con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida.

#### Valsartán

Valsartán no presentó efectos adversos sobre la capacidad reproductiva de ratas macho y hembra con dosis orales de hasta 200 mg/kg/día. Esta dosis es 6 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre la base de mg/m<sup>2</sup> (los cálculos asumen una dosis oral de 320 mg/día y un paciente de 60 kg).

#### Amlodipino

En algunos pacientes tratados con antagonistas del calcio han sido notificados cambios bioquímicos reversibles en las cabezas de los espermatozoides. Los datos clínicos son insuficientes con respecto al posible efecto de amlodipino sobre la fertilidad. En un estudio en ratas se encontraron efectos adversos en la fertilidad de los machos (ver sección 5.3).

#### 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Los pacientes tratados con Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan y que conduzcan vehículos o utilicen máquinas deben tener en cuenta que ocasionalmente pueden presentarse mareo o cansancio.

Amlodipino puede tener una influencia leve o moderada sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si el paciente que recibe Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan presenta mareo, dolor de cabeza, fatiga o náuseas, estos podrían afectar su capacidad de reacción.

#### 4.8 Reacciones adversas

El perfil de seguridad de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida presentado a continuación se basa en los estudios clínicos realizados con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida y el perfil de seguridad conocido de los componentes individuales amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida.

##### Resumen del perfil de seguridad

La seguridad de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida ha sido evaluada con la dosis máxima de 10 mg/320 mg/25 mg en un ensayo clínico controlado a corto plazo (8 semanas) con 2.271 pacientes, 582 de los cuales recibieron valsartán en combinación con amlodipino e hidroclorotiazida. Las reacciones adversas fueron generalmente de naturaleza leve y transitoria y solo de forma infrecuente requirieron la discontinuación del tratamiento. En este ensayo clínico controlado con placebo, las razones más comunes para la discontinuación del tratamiento con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida fueron mareo e hipotensión (0,7%).

En el ensayo clínico controlado de 8 semanas, no se observaron reacciones adversas nuevas o inesperadas con la triple terapia de tratamiento en comparación con los efectos conocidos de la monoterapia o los componentes del tratamiento dual.

En el ensayo clínico controlado de 8 semanas, los cambios observados en los parámetros de laboratorio con la combinación amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida fueron menores y concordaron con el mecanismo de acción farmacológico de los agentes en monoterapia. La presencia de valsartán en la triple combinación atenuó el efecto hipopotasémico de hidroclorotiazida.

##### Tabla de reacciones adversas

Las siguientes reacciones adversas, enumeradas según la frecuencia y clasificación por órganos y sistemas de MedDRA, conciernen a amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida y a amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida de forma individual. Muy frecuentes:  $\geq 1/10$ ; frecuentes:  $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ; poco frecuentes:  $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ; raras:  $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ; muy raras:  $< 1/10.000$ , frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

| Clasificación por órganos y sistemas de MedDRA                             | Reacciones adversas   | Frecuencia                    |            |           |                        |
|--|---|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
|  |   | Amlodipino/<br>valsartán/HCTZ | Amlodipino | Valsartán | HCTZ                   |
| Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos) | Cáncer de piel no melanoma (Carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas) | -                             | -          | -         | Frecuencia no conocida |
| Trastornos de la sangre y del sistema linfático                            | Agranulocitosis, insuficiencia de la médula ósea                                    | -                             | -          | -         | Muy raras              |

| Clasificación por                            | Reacciones adversas                           | Frecuencia      |                        |                        |                        |
|--|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Hemoglobina y hematocrito disminuidos         | -               | -                      | Frecuencia no conocida | -                      |
|  | Anemia hemolítica                             | -               | -                      | -                      | Muy raras              |
|  | Leucopenia                                    | -               | Muy raras              | -                      | Muy raras              |
|  | Neutropenia                                   | -               | -                      | Frecuencia no conocida | -                      |
|  | Trombocitopenia, a veces con púrpura          | -               | Muy raras              | Frecuencia no conocida | Raras                  |
|  | Anemia aplásica                               | -               | -                      | -                      | Frecuencia no conocida |
| Trastornos del sistema inmunológico          | Hipersensibilidad                             | -               | Muy raras              | Frecuencia no conocida | Muy raras              |
| Trastornos del metabolismo y de la nutrición | Anorexia                                      | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Hipercalcemia                                 | Poco frecuentes | -                      | -                      | Raras                  |
|  | Hiper glucemia                                | -               | Muy raras              | -                      | Raras                  |
|  | Hiperlipidemia                                | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Hiperuricemia                                 | Poco frecuentes | -                      | -                      | Frecuentes             |
|  | Alcalosis hipoclorémica                       | -               | -                      | -                      | Muy raras              |
|  | Hipopotasemia                                 | Frecuentes      | -                      | -                      | Muy frecuentes         |
|  | Hipomagnesemia                                | -               | -                      | -                      | Frecuentes             |
|  | Hiponatremia                                  | Poco frecuentes | -                      | -                      | Frecuentes             |
|  | Empeoramiento del estado metabólico diabético | -               | -                      | -                      | Raras                  |
| Trastornos psiquiátricos                     | Depresión                                     | -               | Poco frecuentes        | -                      | Raras                  |
|  | Insomnio/trastornos del sueño                 | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | -                      | Raras                  |
|  | Cambios del estado de ánimo                   | -               | Poco frecuentes        | -                      |                        |
|  | Confusión                                     | -               | Raras                  | -                      | -                      |
| Trastornos del sistema nervioso              | Coordinación anormal                          | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Mareo   | Frecuentes      | Frecuentes             | -                      | Raras                  |
|  | Mareo postural, mareo al esfuerzo             | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Disgeusia                                     | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | -                      | -                      |
|  | Síndrome extrapiramidal                       | -               | Frecuencia no conocida | -                      | -                      |
|  | Dolor de cabeza                               | Frecuentes      | Frecuentes             | -                      | Raras                  |
|  | Hipertonía                                    | -               | Muy raras              | -                      | -                      |
|  | Letargia                                      | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Parestesia                                    | Poco frecuentes | Poco                   | -                      | Raras                  |

| Clasificación por                                   | Reacciones adversas  | Frecuencia      |                 |                        |                        |
|---|--|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|   |  |                 |                 |                        |                        |
|   |  |                 | frecuentes      |                        |                        |
|   | Neuropatía periférica, neuropatía  | Poco frecuentes | Muy raras       | -                      | -                      |
|   | Somnolencia  | Poco frecuentes | Frecuentes      | -                      | -                      |
|   | Síncope  | Poco frecuentes | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Temblor  | -               | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Hipoestesia  | -               | Poco frecuentes | -                      | -                      |
| Trastornos oculares                                 | Glaucoma agudo de ángulo cerrado   | -               | -               | -                      | Frecuencia no conocida |
|   | Derrame coroideo   | -               | -               | -                      | Frecuencia no conocida |
|   | Alteración visual  | -               | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Deterioro visual   | Poco frecuentes | Poco frecuentes | -                      | Raras                  |
| Trastornos del oído y del laberinto                 | Tinnitus   | -               | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Vértigo  | Poco frecuentes | -               | Poco frecuentes        | -                      |
| Trastornos cardíacos                                | Palpitaciones  | -               | Frecuentes      | -                      | -                      |
|   | Taquicardia  | Poco frecuentes | -               | -                      | -                      |
|   | Arritmias (incluyendo bradicardia, taquicardia ventricular, y fibrilación auricular) | -               | Muy raras       | -                      | Raras                  |
|   | Infarto de miocardio   | -               | Muy raras       | -                      | -                      |
| Trastornos vasculares                               | Rubor  | -               | Frecuentes      | -                      | -                      |
|   | Hipotensión  | Frecuentes      | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Hipotensión ortostática  | Poco frecuentes | -               | -                      | Frecuentes             |
|   | Flebitis, tromboflebitis   | Poco frecuentes | -               | -                      | -                      |
|   | Vasculitis   | -               | Muy raras       | Frecuencia no conocida | -                      |
| Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | Tos  | Poco frecuentes | Muy raras       | Poco frecuentes        | -                      |
|   | Disnea   | Poco frecuentes | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Distrés respiratorio, edema pulmonar, neumonitis                                     | -               | -               | -                      | Muy raras              |
|   | Rinitis  | -               | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Irritación de garganta   | Poco frecuentes | -               | -                      | -                      |

| <b>Clasificación por</b>                      | <b>Reacciones adversas</b>  | <b>Frecuencia</b> |                 |                        |                        |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Trastornos gastrointestinales                 | Malestar abdominal, dolor en la parte superior del abdomen                                    | Poco frecuentes   | Frecuentes      | Poco frecuentes        | Raras                  |
|   | Halitosis   | Poco frecuentes   | -               | -                      | -                      |
|   | Alteración de los hábitos intestinales  | -                 | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Estreñimiento   | -                 | -               | -                      | Raras                  |
|   | Disminución del apetito   | -                 | -               | -                      | Frecuentes             |
|   | Diarrea   | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | Raras                  |
|   | Sequedad de boca  | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Dispepsia   | Frecuentes        | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Gastritis   | -                 | Muy raras       | -                      | -                      |
|   | Hiperplasia gingival  | -                 | Muy raras       | -                      | -                      |
|   | Náuseas   | Poco frecuentes   | Frecuentes      | -                      | Frecuentes             |
|   | Pancreatitis  | -                 | Muy raras       | -                      | Muy raras              |
|   | Vómitos   | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | Frecuentes             |
| Trastornos hepato biliares                    | Pruebas de función hepática anormales, incluyendo bilirrubina sanguínea elevada               | -                 | Muy raras**     | Frecuencia no conocida | -                      |
|   | Hepatitis   | -                 | Muy raras       | -                      | -                      |
|   | Colestasis intrahepática, ictericia   | -                 | Muy raras       | -                      | Raras                  |
| Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | Alopecia  | -                 | Poco frecuentes | -                      |                        |
|   | Angioedema  | -                 | Muy raras       | Frecuencia no conocida | -                      |
|   | Dermatitis bullosa  | -                 | -               | Frecuencia no conocida | -                      |
|   | Reacciones similares al lupus eritematoso cutáneo, reactivación del lupus eritematoso cutáneo | -                 | -               | -                      | Muy raras              |
|   | Eritema multiforme  | -                 | Muy raras       | -                      | Frecuencia no conocida |
|   | Exantema  | -                 | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Hiperhidrosis   | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Reacciones de fotosensibilidad*   | -                 | Muy raras       | -                      | Raras                  |
|   | Prurito   | Poco frecuentes   | Poco            | Frecuencia             | -                      |



| Clasificación por                                      | Reacciones adversas                                  | Frecuencia      |                        |                        |                        |
|--|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                 |                        |                        |                        |
|  |  |                 | frecuentes             | no conocida            |                        |
|  | Púrpura  | -               | Poco frecuentes        | -                      | Raras                  |
|  | Erupción   | -               | Poco frecuentes        | Frecuencia no conocida | Frecuentes             |
|  | Decoloración de la piel                              | -               | Poco frecuentes        | -                      | -                      |
|  | Urticaria y otras formas de erupción                 | -               | Muy raras              | -                      | Frecuentes             |
|  | Vasculitis necrotizante y necrosis epidérmica tóxica | -               | Frecuencia no conocida | -                      | Muy raras              |
|  | Dermatitis exfoliativa                               | -               | Muy raras              | -                      | -                      |
|  | Síndrome de Stevens-Johnson                          | -               | Muy raras              | -                      | -                      |
|  | Edema de Quincke                                     | -               | Muy raras              | -                      | -                      |
| Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo | Artralgia  | -               | Poco frecuentes        | -                      | -                      |
|  | Dolor de espalda                                     | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | -                      | -                      |
|  | Inflamación de las articulaciones                    | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Espasmos musculares                                  | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | -                      | Frecuencia no conocida |
|  | Debilidad muscular                                   | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Mialgia  | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | Frecuencia no conocida | -                      |
|  | Dolor en las extremidades                            | Poco frecuentes | -                      | -                      | -                      |
|  | Hinchazón de tobillos                                | -               | Frecuentes             | -                      | -                      |
| Trastornos renales y urinarios                         | Aumento de la creatinina en sangre                   | Poco frecuentes | -                      | Frecuencia no conocida | -                      |
|  | Trastorno de la micción                              |                 | Poco frecuentes        |                        |                        |
|  | Nicturia   | -               | Poco frecuentes        | -                      | -                      |
|  | Polaquiuria  | Frecuentes      | Poco frecuentes        |                        |                        |
|  | Disfunción renal                                     | -               | -                      | -                      | Frecuencia no conocida |
|  | Insuficiencia renal aguda                            | Poco frecuentes | -                      | -                      | Frecuencia no conocida |
|  | Insuficiencia renal y deterioro de la función renal  | -               | -                      | Frecuencia no conocida | Raras                  |
| Trastornos del aparato reproductor                     | Impotencia   | Poco frecuentes | Poco frecuentes        | -                      | Frecuentes             |

| <b>Clasificación por y de la mama</b>                             | <b>Reacciones adversas</b>             | <b>Frecuencia</b> |                 |                        |                        |
|---|--|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|   | Ginecomastia                           |                   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
| Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | Abasia, alteraciones de la marcha      | Poco frecuentes   | -               | -                      | -                      |
|   | Astenia                                | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | Frecuencia no conocida |
|   | Molestia, malestar general             | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Fatiga                                 | Frecuentes        | Frecuentes      | Poco frecuentes        | -                      |
|   | Dolor en el pecho no cardíaco          | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Edema                                  | Frecuentes        | Frecuentes      | -                      | -                      |
|   | Dolor                                  | -                 | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Pirexia                                | -                 | -               | -                      | Frecuencia no conocida |
| Exploraciones complementarias                                     | Aumento de los lípidos                 |                   | -               |                        | Muy frecuentes         |
|   | Aumento del nitrógeno ureico en sangre | Poco frecuentes   | -               | -                      | -                      |
|   | Aumento del ácido úrico en sangre      | Poco frecuentes   | -               | -                      |                        |
|   | Glucosuria                             |                   |                 |                        | Raras                  |
|   | Disminución del potasio sanguíneo      | Poco frecuentes   | -               | -                      | -                      |
|   | Aumento del potasio sanguíneo          | -                 | -               | Frecuencia no conocida | -                      |
|   | Aumento de peso                        | Poco frecuentes   | Poco frecuentes | -                      | -                      |
|   | Pérdida de peso                        | -                 | Poco frecuentes | -                      | -                      |

\* Ver sección 4.4 Fotosensibilidad

\*\* Concuerta mayormente con colestasis

#### Descripción de ciertas reacciones adversas

Cáncer de piel no melanoma: con base en los datos disponibles de estudios epidemiológicos, se ha observado una asociación dependiente de la dosis acumulada entre hidroclorotiazida y el CPNM (ver también las secciones 4.4 y 5.1).

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.

## 4.9 Sobredosis

### Síntomas

No hay experiencia de sobredosis con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. El principal síntoma de sobredosis con valsartán es posiblemente hipotensión pronunciada con mareo. La sobredosis con amlodipino puede dar lugar a una vasodilatación periférica excesiva y, posiblemente, taquicardia refleja. Con amlodipino se ha observado hipotensión sistémica marcada, y, probablemente, prolongada, incluyendo shock con un resultado fatal.

### Tratamiento

#### Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida

La hipotensión clínicamente significativa debida a una sobredosis de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida exige apoyo cardiovascular activo, incluyendo controles frecuentes de las funciones cardíaca y respiratoria, elevación de las extremidades, y atención al volumen de líquido circulante y a la eliminación de orina. Puede ser útil un vasoconstrictor para restaurar el tono vascular y la presión arterial, en el caso que no hubiera contraindicación de uso.

El gluconato de calcio intravenoso puede ser beneficioso para revertir los efectos del bloqueo de los canales de calcio.

#### Amlodipino

Si la ingestión es reciente, puede plantearse la inducción del vómito o la realización de un lavado gástrico. La administración de carbón activado a voluntarios sanos inmediatamente o hasta dos horas después de la ingestión de amlodipino ha mostrado disminuir de forma significativa la absorción de amlodipino. Es poco probable que amlodipino se elimine mediante hemodiálisis.

#### Valsartán

Es poco probable que valsartán se elimine mediante hemodiálisis.

#### Hidroclorotiazida

La sobredosis con hidroclorotiazida se asocia a depleción de electrolitos (hipopotasemia, hipocloremia) e hipovolemia como resultado de una diuresis excesiva. Los signos y síntomas más habituales de una sobredosis son náuseas y somnolencia. La hipopotasemia puede dar lugar a espasmos musculares y/o arritmia cardíaca acentuada asociada con el uso concomitante de glucósidos digitálicos o determinados medicamentos antiarrítmicos.

No se ha establecido el grado de eliminación por hemodiálisis de la hidroclorotiazida.

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, antagonistas de la angiotensina II, otras combinaciones, código ATC: C09DX01.

#### Mecanismo de acción

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan combina tres compuestos antihipertensivos con mecanismos complementarios para controlar la presión arterial en pacientes con hipertensión esencial: amlodipino pertenece al grupo de los antagonistas del calcio y valsartán al grupo de los antagonistas de la angiotensina II e hidroclorotiazida al grupo de los diuréticos tiazídicos. La combinación de estas sustancias presenta un efecto antihipertensivo aditivo.

#### Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida

##### Eficacia clínica y seguridad

Amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida fue estudiado en un ensayo clínico doble ciego, con control activo, en pacientes hipertensos. Un total de 2.271 pacientes con hipertensión de moderada a grave (presión arterial sistólica/diastólica media inicial de 170/107 mmHg) recibieron tratamiento con

amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida 10 mg/320 mg/25 mg, valsartán/hidroclorotiazida 320 mg/25 mg, amlodipino/valsartán 10 mg/320 mg o hidroclorotiazida/amlodipino 25 mg/10 mg. Al inicio del estudio, se asignaron dosis más bajas del tratamiento combinado a los pacientes, que aumentaron hasta la dosis completa de tratamiento en la semana 2.

En la semana 8, las reducciones medias de la presión arterial sistólica/diastólica fueron 39,7/24,7 mmHg con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida, 32,0/19,7 mmHg con valsartán/hidroclorotiazida, 33,5/21,5 mmHg con amlodipino/valsartán, y 31,5/19,5 mmHg con amlodipino/hidroclorotiazida. El tratamiento de combinación triple fue estadísticamente superior en la reducción de la presión arterial diastólica y sistólica a cada una de los tres tratamientos de combinación dual. Las reducciones con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida en la presión arterial sistólica/diastólica fueron 7,6/5,0 mmHg mayores que con valsartán/hidroclorotiazida, 6,2/3,3 mmHg mayores que con amlodipino/valsartán, y 8,2/5,3 mmHg mayores que con amlodipino/hidroclorotiazida. El efecto completo en la reducción de la presión arterial se alcanzó 2 semanas después de iniciar el tratamiento con la dosis máxima de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. La proporción de pacientes que alcanzaron el control de la presión arterial (<140/90 mmHg) con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida fue estadísticamente mayor (71%) en comparación con cada uno de los tres tratamientos de combinación dual (45-54%) ( $p < 0,0001$ ).

En un subgrupo de 283 pacientes en los que se realizó monitorización ambulatoria de la presión arterial, se observaron reducciones clínica y estadísticamente superiores de la presión arterial sistólica y diastólica en 24 horas con la combinación triple en comparación con valsartán/hidroclorotiazida, valsartán/amlodipino, e hidroclorotiazida/amlodipino.

### Amlodipino

#### Mecanismo de acción

El componente amlodipino de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida inhibe la entrada transmembrana de los iones de calcio en el músculo cardíaco y en el músculo liso vascular. El mecanismo de la acción antihipertensiva de amlodipino se debe al efecto relajante directo sobre el músculo liso vascular, causando reducciones de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial.

#### Efectos farmacodinámicos

Los datos experimentales sugieren que amlodipino se une a los lugares de unión tanto dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos. Los procesos de contracción del músculo cardíaco y del músculo liso vascular son dependientes del movimiento de los iones de calcio extracelulares hacia el interior de estas células a través de canales iónicos específicos.

Tras la administración de dosis terapéuticas a pacientes con hipertensión, amlodipino produce una vasodilatación, resultando en una reducción de las presiones arteriales en decúbito supino y bipedestación. Estas reducciones de la presión arterial no se acompañan en el tratamiento crónico de un cambio significativo de la frecuencia cardíaca o de los niveles de catecolamina plasmáticos.

Las concentraciones plasmáticas se correlacionan con el efecto tanto en pacientes jóvenes como de edad avanzada.

En pacientes hipertensos con la función renal normal, las dosis terapéuticas de amlodipino dieron lugar a un descenso de la resistencia vascular renal y a un aumento de la tasa de filtración glomerular y un flujo plasmático renal eficiente, sin modificar la tasa de filtración o la proteinuria.

Al igual que con otros antagonistas de los canales de calcio, las mediciones hemodinámicas de la función cardíaca en reposo y durante el ejercicio (o marcha) en pacientes con la función ventricular normal tratados con amlodipino ha demostrado generalmente un pequeño aumento del índice cardíaco sin influencia significativa sobre la  $dP/dt$  o sobre la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo o el volumen. En estudios hemodinámicos, amlodipino no se ha asociado con un efecto inotrópico negativo cuando se administró en el rango de dosis terapéutico a animales intactos y en humanos, incluso cuando se administró conjuntamente con betabloqueantes en humanos.

Amlodipino no modifica la función del nódulo sinoauricular o la conducción auriculoventricular en animales intactos o humanos. En ensayos clínicos en los que amlodipino se administró en combinación con betabloqueantes a pacientes con hipertensión o angina, no se observaron efectos adversos sobre los parámetros electrocardiográficos.

Se ha estudiado amlodipino en pacientes con angina estable crónica, angina vasoespástica y enfermedad arterial coronaria documentada angiográficamente.

### Eficacia clínica y seguridad

#### Uso en pacientes con hipertensión

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado doble ciego de mortalidad-morbilidad denominado Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) para comparar nuevos tratamientos: 2,5-10 mg/día de amlodipino (antagonistas de los canales del calcio) o 10-40 mg/día de lisinopril (inhibidor de la ECA) como tratamientos de primera línea frente al diurético tiazídico clortalidona a dosis de 12,5-25 mg/día en hipertensión leve a moderada.

Se aleatorizaron un total de 33.357 pacientes hipertensos de 55 años de edad o mayores y se siguieron durante una media de 4,9 años. Los pacientes presentaban al menos un factor de riesgo para enfermedad coronaria, incluyendo: infarto de miocardio o ictus previo (>6 meses antes del reclutamiento) u otra enfermedad cardiovascular aterosclerosa documentada (tasa global 51,5%), diabetes tipo 2 (36,1%), lipoproteínas de alta densidad - colesterol <35 mg/dl o <0,906 mmol/l (11,6%) o, hipertrofia ventricular izquierda diagnosticada mediante un electrocardiograma o ecocardiografía (20,9%), hábito tabáquico (21,9%).

La variable primaria fue una combinación de enfermedad coronaria mortal o infarto de miocardio no mortal. No hubo diferencias significativas en la variable primaria entre el tratamiento basado en amlodipino y el tratamiento basado en clortalidona: tasa de riesgo (TR) 0,98 IC del 95% (0,90-1,07) p=0,65. Entre las variables secundarias, la incidencia de insuficiencia cardíaca (componente de un compuesto combinado de la variable cardiovascular) fue significativamente mayor en el grupo con amlodipino en comparación con el grupo con clortalidona (10,2% frente a 7,7%, TR 1,38, IC del 95% [1,25-1,52] p<0,001). Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas entre el tratamiento basado en amlodipino y el tratamiento basado en clortalidona TR 0,96 IC del 95% [0,89-1,02] p=0,20.

### Valsartán

#### Mecanismo de acción

Valsartán es un antagonista del receptor de la angiotensina II potente y específico activo por vía oral. Actúa selectivamente sobre el receptor subtipo AT<sub>1</sub>, responsable de las acciones conocidas de la angiotensina II.

### Eficacia clínica y seguridad

La administración de valsartán en pacientes con hipertensión da lugar a una disminución de la presión arterial sin afectar a la frecuencia cardíaca.

En la mayoría de pacientes, después de la administración de una dosis oral única, se inicia la actividad antihipertensiva hacia las 2 horas, y la reducción máxima de la presión arterial se alcanza a las 4-6 horas. El efecto antihipertensivo persiste durante 24 horas después de la administración. Cuando se administran dosis repetidas, la reducción máxima de la presión arterial a cualquier dosis suele alcanzarse en 2-4 semanas.

### Hidroclorotiazida

#### Mecanismo de acción

El lugar de acción de los diuréticos tiazídicos es principalmente el túbulo contorneado distal renal. Se ha demostrado que en la corteza renal existe un receptor con una afinidad elevada que es el lugar de unión principal para la acción del diurético tiazídico y la inhibición del transporte de NaCl en el túbulo contorneado distal. El mecanismo de acción de las tiazidas consiste en la inhibición del sistema de cotransporte Na<sup>+</sup>Cl<sup>-</sup>, tal vez compitiendo por el lugar del Cl<sup>-</sup>, por lo que se afectan los mecanismos de reabsorción de los electrolitos: de manera directa aumentando la excreción de sodio y de cloruro en una magnitud aproximadamente igual, e indirectamente, por esta acción diurética, reduciendo el volumen

plasmático y con aumentos consecuentes de la actividad de la renina plasmática, la secreción de aldosterona, la pérdida urinaria de potasio y una disminución del potasio sérico.

### Cáncer de piel no-melanoma

Con base en los datos disponibles de estudios epidemiológicos, se ha observado una asociación dependiente de la dosis acumulada entre hidroclorotiazida y el CPNM. En un estudio se incluyó a una población formada por 71.533 casos de CBC y 8.629 casos de CCE emparejados con 1.430.833 y 172.462 controles de la población, respectivamente. El uso de dosis altas de hidroclorotiazida ( $\geq 50.000$  mg acumulados) se asoció a una odds ratio (OR) ajustada de 1,29 (IC del 95%: 1,23-1,35) para el CBC y de 3,98 (IC del 95%: 3,68-4,31) para el CCE. Se observó una clara relación entre la dosis acumulada y la respuesta tanto en el CBC como en el CCE. Otro estudio mostró una posible asociación entre el cáncer de labio (CCE) y la exposición a hidroclorotiazida: 633 casos de cáncer de labios se emparejaron con 63.067 controles de la población, utilizando una estrategia de muestreo basada en el riesgo. Se demostró una relación entre la dosis acumulada y la respuesta con una OR ajustada de 2,1 (IC del 95%: 1,7-2,6) que aumentó hasta una OR de 3,9 (3,0-4,9) con el uso de dosis altas ( $\sim 25.000$  mg) y una OR de 7,7 (5,7-10,5) con la dosis acumulada más alta ( $\sim 100.000$  mg) (ver también sección 4.4).

### Población pediátrica

La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida en los diferentes grupos de la población pediátrica en hipertensión arterial esencial (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en población pediátrica).

### Otros: bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA)

Dos grandes estudios aleatorizados y controlados (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] y VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes]) han estudiado el uso de la combinación de un inhibidor de la ECA con un ARAII.

ONTARGET fue un estudio realizado en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular o diabetes mellitus tipo 2, acompañada con evidencia de daño a los órganos diana. VA NEPHRON-D fue un estudio en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y nefropatía diabética.

Estos estudios no mostraron ningún beneficio significativo sobre la mortalidad y los resultados renales y/o cardiovasculares, en tanto en cuanto se observó un aumento del riesgo de hiperpotasemia, lesión renal aguda y/o hipotensión, comparado con la monoterapia. Dada la similitud de sus propiedades farmacológicas, estos resultados también resultan apropiados para otros inhibidores de la ECA y ARAII.

En consecuencia, los inhibidores de ECA y ARAII no deben utilizarse en forma concomitante en pacientes con nefropatía diabética (ver sección 4.4).

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) fue un estudio diseñado para evaluar el beneficio de añadir Aliskiren a una terapia estándar con un inhibidor de la ECA o un ARAII en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular, o ambas. El estudio se dió por finalizado prematuramente a raíz de un aumento en el riesgo de resultados adversos. La muerte por causas cardiovasculares y los ictus fueron ambos numéricamente más frecuentes en el grupo de Aliskiren que en el grupo de placebo, y se notificaron acontecimientos adversos y acontecimientos adversos graves de interés (hiperpotasemia, hipotensión y disfunción renal) con más frecuencia en el grupo de Aliskiren que en el de placebo.

## **5.2 Propiedades farmacocinéticas**

### Linealidad

Amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida muestran una farmacocinética lineal.

### Amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida

Tras la administración oral de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida en adultos normales sanos, las concentraciones plasmáticas máximas de amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida se alcanzan en 6-8 horas, 3 horas, y 2 horas, respectivamente. La velocidad y extensión de la absorción de amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida a partir de amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida es la misma que cuando se administran como dosis individuales.

### Amlodipino

#### Absorción

Después de la administración oral de dosis terapéuticas de amlodipino solo, las concentraciones plasmáticas máximas de amlodipino se alcanzan a las 6-12 horas. La biodisponibilidad absoluta se ha calculado entre el 64% y el 80%. La biodisponibilidad de amlodipino no se ve afectada por la ingestión de alimentos.

#### Distribución

El volumen de distribución es aproximadamente 21 l/kg. Los estudios *in vitro* con amlodipino han mostrado que aproximadamente el 97,5% del fármaco circulante está unido a las proteínas plasmáticas.

#### Biotransformación

Amlodipino se metaboliza extensamente (aproximadamente un 90%) en el hígado a metabolitos inactivos.

#### Eliminación

La eliminación de amlodipino del plasma es bifásica, con una semivida de eliminación terminal de aproximadamente 30 a 50 horas. Los niveles plasmáticos en el estado estacionario se alcanzan después de la administración continua durante 7-8 días. El diez por ciento del amlodipino original y el 60% de los metabolitos de amlodipino se excretan en la orina.

### Valsartán

#### Absorción

Después de la administración oral de valsartán solo, las concentraciones plasmáticas máximas de valsartán se alcanzan a las 2-4 horas. La biodisponibilidad media absoluta es del 23%. Los alimentos disminuyen la exposición (medida como AUC) a valsartán en aproximadamente un 40% y la concentración plasmática máxima (C<sub>max</sub>) en aproximadamente un 50%, a pesar de que desde unas 8 h después de la dosificación las concentraciones plasmáticas de valsartán son similares para los grupos que han tomado alimento y los que están en ayunas. No obstante, la reducción del AUC no se acompaña de una reducción clínicamente significativa del efecto terapéutico, y por ello valsartán puede administrarse tanto con o sin alimentos.

#### Distribución

El volumen de distribución de valsartán en el estado estacionario tras una administración intravenosa es aproximadamente 17 litros, lo que indica que valsartán no se distribuye extensamente en los tejidos. Valsartán se une en una elevada proporción a las proteínas séricas (94-97%), principalmente a la albúmina sérica.

#### Biotransformación

Valsartán no se transforma extensamente ya que solo se recupera en forma de metabolitos aproximadamente un 20% de la dosis. Se ha identificado en el plasma un hidroximetabolito a concentraciones bajas (menos del 10% del AUC de valsartán). Este metabolito es farmacológicamente inactivo.

#### Eliminación

Valsartán muestra una cinética de eliminación multiexponencial ( $t_{1/2\alpha} < 1$  h y  $t_{1/2\beta}$  aproximadamente 9 h). Valsartán se elimina primariamente por las heces (aproximadamente un 83% de la dosis) y por la orina (aproximadamente un 13% de la dosis), principalmente como fármaco inalterado. Después de una administración intravenosa, el aclaramiento plasmático de valsartán es aproximadamente de 2 l/h y su aclaramiento renal es de 0,62 l/h (aproximadamente un 30% del aclaramiento total). La semivida de valsartán es de 6 horas

## Hidroclorotiazida

### Absorción

La absorción de la hidroclorotiazida es rápida ( $t_{\max}$  de aprox. 2 horas) después de una dosis oral. El aumento de la AUC media es lineal y proporcional a la dosis dentro del rango terapéutico.

El efecto de la comida sobre la absorción de hidroclorotiazida, si lo hay, tiene poca importancia clínica. Después de la administración oral, la biodisponibilidad absoluta de la hidroclorotiazida es del 70%.

### Distribución

El volumen aparente de distribución es de 4-8 l/kg. La hidroclorotiazida circulante se une a proteínas séricas (40-70%), principalmente a la albúmina sérica. La hidroclorotiazida también se acumula en los eritrocitos en aproximadamente 3 veces el nivel plasmático.

### Biotransformación

Hidroclorotiazida se elimina predominantemente como compuesto inalterado.

### Eliminación

La hidroclorotiazida se elimina del plasma con una vida media promedio de 6 a 15 horas en la fase de eliminación terminal. No hay cambios en la cinética de hidroclorotiazida con la administración repetida, y la acumulación es mínima cuando se administra una vez al día. Más del 95% de la dosis absorbida se excreta como compuesto inalterado con la orina. El aclaramiento renal consta de filtración pasiva y de secreción activa en el túbulo renal.

### Poblaciones especiales

#### Pacientes pediátricos (menores de 18 años)

No se dispone de datos farmacocinéticos en población pediátrica.

#### Pacientes de edad avanzada (65 años o mayores)

El tiempo hasta las concentraciones plasmáticas máximas de amlodipino es similar en los pacientes jóvenes y en los de edad avanzada. En pacientes de edad avanzada, el aclaramiento de amlodipino tiende a declinar, causando aumentos en el área bajo la curva (AUC) y en la semivida de eliminación. El AUC sistémico medio de valsartán es superior en un 70% en los pacientes de edad avanzada en comparación con los jóvenes, por ello se requiere precaución al aumentar la dosis.

La exposición sistémica a valsartán es ligeramente más elevada en personas de edad avanzada en comparación con los jóvenes, pero no ha demostrado tener ninguna significancia clínica.

Los limitados resultados de que se dispone sugieren que el aclaramiento sistémico de la hidroclorotiazida disminuye en personas de edad avanzada tanto sanas como hipertensas, cuando se compara con voluntarios sanos jóvenes.

Dado que los tres componentes son igualmente bien tolerados en pacientes jóvenes y de edad avanzada, se recomiendan regímenes posológicos normales (ver sección 4.2).

### Insuficiencia renal

La farmacocinética de amlodipino no se afecta significativamente por una insuficiencia renal. Como se espera de un compuesto cuyo aclaramiento renal es solamente del 30% del aclaramiento plasmático total, no se ha observado ninguna correlación entre la función renal y la exposición sistémica a valsartán.

Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada pueden recibir la dosis de inicio habitual (ver secciones 4.2 y 4.4).

En presencia de una insuficiencia renal, las concentraciones plasmáticas máximas promedio y los valores del AUC de hidroclorotiazida aumentan y la tasa de excreción de orina se reduce. En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada, se ha observado un aumento de 3 veces del AUC de hidroclorotiazida.



En pacientes con insuficiencia renal grave se ha observado un aumento de 8 veces del AUC. Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave, anuria o sometidos a diálisis (ver sección 4.3).

#### Insuficiencia hepática

En pacientes con insuficiencia hepática, los datos clínicos disponibles son muy limitados en relación con la administración de amlodipino. Los pacientes con deterioro de la función hepática presentan una disminución del aclaramiento de amlodipino, lo que resulta en un aumento de aproximadamente un 40-60% del AUC. En promedio, la exposición a valsartán en pacientes con enfermedad hepática crónica de leve a moderada (medida mediante los valores de AUC) es el doble que la hallada en voluntarios sanos (comparados por edad, sexo y peso). Debido al componente valsartán, Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática (ver secciones 4.2 y 4.3).

### **5.3 Datos preclínicos sobre seguridad**

#### Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida

En distintos estudios de seguridad preclínicos realizados en varias especies animales con amlodipino, valsartán, hidroclorotiazida, valsartán/hidroclorotiazida, amlodipino/valsartán y amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida, no hubo evidencia de toxicidad sistémica o en los órganos diana que afectase de forma adversa el desarrollo de Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan para uso clínico en humanos.

En ratas se realizaron estudios de seguridad preclínica de hasta 13 semanas de duración con amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida. La combinación dió lugar a una esperada reducción de la serie roja (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, y reticulocitos), aumento en las concentraciones de urea en suero, aumento de las concentraciones de potasio en suero, hiperplasia juxtaglomerular (JG) del riñón y erosiones focales en estómago glandular en ratas. Todos estos cambios fueron reversibles tras 4 semanas del periodo de recuperación y se consideró que eran efectos farmacológicos exagerados.

La combinación amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida no se ensayó para genotoxicidad o carcinogénesis ya que no hubo evidencia de ninguna interacción entre estas sustancias, que están comercializadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida han sido ensayados de forma individual para genotoxicidad y carcinogénesis con resultados negativos.

#### Amlodipino

##### Toxicología reproductiva

Los estudios de reproducción en ratas y ratones han demostrado retraso en el parto, prolongación del parto y disminución de la supervivencia de las crías a dosis aproximadamente 50 veces mayores que la dosis máxima recomendada para humanos en base a mg/kg.

##### Alteraciones de la fertilidad

No hubo ningún efecto sobre la fertilidad de las ratas tratadas con amlodipino (machos y hembras tratados 64 y 14 días antes del apareamiento, respectivamente) con dosis hasta 10 mg/kg/día (8 veces\* la dosis máxima recomendada en humanos de 10 mg en base a mg/m<sup>2</sup>). En otro estudio con ratas en el que ratas macho fueron tratadas con amlodipino besilato durante 30 días a una dosis comparable con la dosis humana basada en mg/kg, se encontró un descenso en plasma de la hormona folículo estimulante y la testosterona, así como la disminución de la densidad de espermatozoides y en número de células espermáticas y de Sertoli.

##### Carcinogénesis, mutagénesis

Las ratas y los ratones tratados con amlodipino en la dieta durante dos años, a una concentración calculada para proporcionar los niveles de dosis diaria de 0,5; 1,25, and 2,5 mg/kg/día no mostraron evidencia de carcinogenicidad. La dosis más alta (similar para ratones y el doble\* para las ratas de la dosis máxima recomendada en clínica de 10 mg en base a mg/m<sup>2</sup>) estuvo cerca de la dosis máxima tolerada para los ratones pero no para las ratas.

Los estudios de mutagenicidad no revelaron efectos relacionados con el medicamento ni a nivel genético ni cromosómico.

\* Basado en un paciente de 50 kg de peso

### Valsartán

Los datos no clínicos basados en estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetida, genotoxicidad, potencial carcinogénico, toxicidad para la reproducción y el desarrollo, no revelan ningún riesgo específico para el hombre.

En ratas, a dosis maternas tóxicas (600 mg/kg/día) durante los últimos días de gestación y durante la lactancia provocaron menor supervivencia, menor aumento de peso y retraso en el desarrollo (desprendimiento del pabellón auditivo y apertura del canal auditivo) de la descendencia (ver sección 4.6). Estas dosis en ratas (600 mg/kg/día) son aproximadamente 18 veces la dosis máxima recomendada en el hombre sobre la base de  $\text{mg}/\text{m}^2$  (los cálculos asumen una dosis oral de 320 mg/día y un paciente de 60 kg).

En estudios no clínicos de seguridad, dosis elevadas de valsartán (200 a 600 mg/kg de peso) causaron en ratas una disminución de los parámetros hematológicos (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito) e indicios de cambios en la hemodinámica renal (ligero aumento del nitrógeno uréico en sangre e hiperplasia tubular renal y basofilia en los machos). Estas dosis en ratas (200 a 600 mg/kg/día) son aproximadamente 6 y 18 veces la dosis máxima recomendada en el hombre sobre la base de  $\text{mg}/\text{m}^2$  (los cálculos asumen una dosis oral de 320 mg/día y un paciente de 60 kg).

En títis, a dosis comparables, los cambios fueron semejantes, aunque más graves, particularmente en el riñón, donde evolucionaron a nefropatía incluyendo un aumento del nitrógeno uréico en sangre y de la creatinina.

También se observó en ambas especies, una hipertrofia de las células yuxtaglomerulares renales. Se consideró que estos cambios eran debidos al efecto farmacológico de valsartán, que produce una hipotensión prolongada, especialmente en títis. A las dosis terapéuticas de valsartán en humanos, la hipertrofia de las células yuxtaglomerulares renales no parece tener ninguna relevancia.

## **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

### **6.1 Lista de excipientes**

#### Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos EFG

##### *Núcleo del comprimido*

Celulosa microcristalina

Crospovidona (Tipo A)

Sílice coloidal anhidra

Estearato de magnesio (E 470b)

##### *Recubrimiento*

Hipromelosa

Macrogol

Talco

Dióxido de titanio (E171)

#### Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 5 mg/160 mg/25 mg comprimidos EFG

##### *Núcleo del comprimido*

Celulosa microcristalina

Crospovidona (Tipo A)

Sílice coloidal anhidra

Estearato de magnesio (E 470b)

*Recubrimiento*

Hipromelosa

Macrogol

Talco

Dióxido de titanio (E171)

Oxido de hierro amarillo (E172)

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/12,5 mg comprimidos EFG

*Núcleo del comprimido*

Celulosa microcristalina

Crospovidona (Tipo A)

Sílice coloidal anhidra

Estearato de magnesio (E 470b)

*Recubrimiento*

Hipromelosa

Macrogol

Talco

Dióxido de titanio (E171)

Oxido de hierro amarillo (E172)

Óxido de hierro rojo (E172)

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/160 mg/25 mg comprimidos EFG

*Núcleo del comprimido*

Celulosa microcristalina

Crospovidona (Tipo A)

Sílice coloidal anhidra

Estearato de magnesio (E 470b)

*Recubrimiento*

Hipromelosa

Macrogol

Talco

Dióxido de titanio (E171)

Oxido de hierro amarillo (E172)

Amlodipino/Valsartán/Hidroclorotiazida Mylan 10 mg/320 mg/25 mg comprimidos EFG

*Núcleo del comprimido*

Celulosa microcristalina

Crospovidona (Tipo A)

Sílice coloidal anhidra

Estearato de magnesio (E 470b)

*Recubrimiento*

Hipromelosa

Macrogol

Talco

Dióxido de titanio (E171)

Oxido de hierro amarillo (E172)

## 6.2 Incompatibilidades

No procede.

### **6.3 Periodo de validez**

2 años.

### **6.4 Precauciones especiales de conservación**

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Conservar el blíster en el embalaje exterior para protegerlo de la luz y de la humedad.

### **6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Blíster de aluminio de PVC/PVDC de color blanco

Tamaños de envase: 14, 28, 30, 90 o 98 comprimidos recubiertos con película.

Blíster de aluminio de PVC/PCTFE de color blanco

Tamaños de envase: 14, 28, 30, 90 o 98 comprimidos recubiertos con película.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### **6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

## **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

C/ Plom 2-4, 5ª planta

08038 – Barcelona

España

## **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

<[Para completar a nivel nacional]>

## **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Enero 2021

## **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Septiembre 2020

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>