

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Carbetocina Farmak 100 microgramos/ml solución inyectable EFG

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Carbetocina 100 microgramos/ml.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Solución para inyección.

Solución clara incolora.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1. Indicaciones terapéuticas

Prevención de la hemorragia posparto por atonía uterina.

4.2. Posología y forma de administración

Posología

Cesárea bajo anestesia epidural o espinal:

Extraer 1 ml de solución que contiene 100 microgramos de carbetocina y administrarlo sólo mediante inyección intravenosa, bajo una supervisión médica adecuada en un hospital.

Parto vaginal:

Extraer 1 ml de solución que contiene 100 microgramos de carbetocina y administrarlo mediante inyección intravenosa o intramuscular, bajo una supervisión médica adecuada en un hospital.

Población pediátrica

No existe un uso relevante de carbetocina en niñas menores de 12 años.

La seguridad y eficacia de carbetocina en adolescentes aún no se ha establecido. Los datos disponibles actualmente se describen en la sección 5.1, pero no se puede recomendar ninguna posología.

Forma de administración

Para administración intravenosa o intramuscular.

Carbetocina solo debe administrarse tras el nacimiento del bebé y lo antes posible después del parto, preferiblemente antes de la expulsión de la placenta.

Para la administración intravenosa, carbetocina se debe administrar lentamente, durante al menos un minuto.

Carbetocina Farmak está destinado únicamente para un solo uso. No se debe administrar más dosis de carbetocina.

4.3. Contraindicaciones

- Durante el embarazo y parto antes del nacimiento del niño.
- Carbetocina no debe usarse para la inducción del parto.
- Hipersensibilidad a carbetocina, oxitocina o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.
- Insuficiencia hepática o renal.
- Trastornos cardiovasculares graves.
- Epilepsia.

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Carbetocina está destinada para su uso únicamente en unidades de obstetricia especializadas bien equipadas con personal con experiencia y cualificados, que estén disponibles en todo momento.

No se debe utilizar carbetocina en cualquier fase anterior al nacimiento del niño ya que su actividad uterotónica persiste durante varias horas. Este aspecto es el que marca la diferencia con la oxitocina ya que después de la interrupción de una perfusión de oxitocina se observa una rápida reducción del efecto observado.

Se debe determinar la causa en el caso de sangrado vaginal y uterino persistente tras la administración de carbetocina. Se deben tener en cuenta causas como fragmentos de placenta retenidos, laceraciones perineales, vaginales y de cérvix, inadecuada reparación del útero o problemas en la coagulación.

Carbetocina se debe administrar en dosis única, intramuscular o intravenosa. En caso de administración intravenosa, se debe administrar lentamente durante al menos un minuto. En caso de hipotonía o atonía uterina persistente y el consecuente sangrado excesivo, se debe considerar la terapia adicional con otro uterotónico. No hay datos de dosis adicionales de carbetocina o del uso de carbetocina tras la atonía uterina persistente después de la administración de oxitocina.

Estudios en animales han demostrado que carbetocina posee cierta actividad antidiurética (actividad vasopresina: $< 0,025$ UI/vial) y por lo tanto no puede descartarse una posible hiponatremia, concretamente en pacientes que además hayan recibido grandes volúmenes de fluidos intravenosos. Se debe observar la aparición de los primeros signos de somnolencia, apatía y dolor de cabeza para prevenir convulsiones y coma.

En general, carbetocina debe usarse con precaución cuando exista migraña, asma y enfermedades cardiovasculares o algún estado en el cual una adición rápida de agua extracelular pueda producir riesgo para un sistema ya sobrecargado. La decisión de administrar carbetocina puede ser tomada por el médico después de sopesar cuidadosamente el beneficio potencial que carbetocina puede aportar en estos casos particulares.

No hay datos disponibles sobre el uso de carbetocina en pacientes con eclampsia. Las pacientes con eclampsia y preeclampsia deben ser cuidadosamente monitorizadas.

No se han realizado estudios específicos en diabetes mellitus gestacional.

Excipientes

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis (en base a la cantidad promedio administrada a una persona de 70 kg); esto es, esencialmente “exento de sodio”.

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Durante los ensayos clínicos, se ha administrado carbetocina en asociación con analgésicos, espasmolíticos y agentes usados para anestesia epidural o espinal y no se ha identificado interacción entre estos fármacos.

No se han realizado estudios específicos de interacción.

Ya que carbetocina está relacionada estructuralmente con la oxitocina, no puede excluirse la existencia de interacciones conocidas que se asocian con oxitocina:

Se han comunicado casos de hipertensión grave cuando se administró oxitocina 3 a 4 horas tras la administración profiláctica de un vasoconstrictor junto con anestesia de bloqueo caudal.

Cuando se combina con alcaloides ergóticos, tales como metilergometrina, oxitocina y carbetocina pueden mejorar la presión sanguínea reforzando el efecto de estos agentes. Si se administran oxitocina o metilergometrina tras carbetocina puede haber un riesgo de exposición acumulativa.

Se ha demostrado que las prostaglandinas potencian el efecto de la oxitocina, por lo tanto, es posible que pueda ocurrir también con carbetocina. Por tanto, no se recomienda la administración conjunta de prostaglandinas y carbetocina. Si son administrados concomitantemente, la paciente debe ser cuidadosamente monitorizada.

Algunos anestésicos inhalados, tales como halotano y ciclopropano, pueden reforzar el efecto hipotensor y debilitar el efecto de carbetocina en el útero. Se han comunicado arritmias durante el uso concomitante con oxitocina.

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia

Embarazo

Carbetocina está contraindicada durante el embarazo y no debe utilizarse para la inducción del parto (ver sección 4.3).

Lactancia

No se han observado efectos significativos en la subida de la leche durante los ensayos clínicos. Se ha demostrado que pequeñas cantidades de carbetocina pasan del plasma a la leche materna de mujeres en periodo de lactancia (ver sección 5.2).

Se asume que las pequeñas cantidades transferidas al calostro o a la leche materna tras una inyección única de carbetocina y posteriormente ingeridas por el niño serán degradadas por las enzimas en el intestino.

No es necesario restringir la lactancia después del uso de carbetocina.

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No relevante.

4.8. Reacciones adversas

Las reacciones adversas observadas con carbetocina durante los ensayos clínicos fueron del mismo tipo y frecuencia que las observadas con oxitocina.

Administración intravenosa* - Resumen tabulado de reacciones adversas

Clasificación por órganos	Muy frecuentes ≥ 1/10	Frecuentes ≥ 1/100 y < 1/10	No conocida (No puede estimarse en base a los datos disponibles)
Trastornos de la sangre y sistema linfático		Anemia	
Trastornos del sistema inmunológico			Hipersensibilidad (incluyendo reacción anafiláctica)
Trastornos del sistema nervioso	Dolor de cabeza, temblor	Vértigo	
Trastornos cardíacos			Taquicardia, bradicardia que puede provocar un paro cardíaco, arritmia***, isquemia de miocardio*** y prolongación QT***
Trastornos vasculares	Hipotensión, rubor		
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		Dolor de pecho, disnea	
Trastornos gastrointestinales	Náusea, dolor abdominal	Sabor metálico, vómitos	
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Prurito		
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo		Dolor de espalda	
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Sensación de calor	Escalofríos, dolor	

* Basados en los estudios de parto por cesárea.

*** Notificado con oxitocina (estrechamente relacionada en estructura a carbetocina).

Se han notificado casos aislados de sudoración en los ensayos clínicos.

Administración intramuscular* - Resumen tabulado de reacciones adversas

Clasificación por órganos	Poco frecuente ≥ 1/1 000 and < 1/100	Raro ≥ 1/10 000 y < 1/1 000	No conocida (No puede estimarse en base a los datos disponibles)
---------------------------	---	--------------------------------	--

Trastornos de la sangre y sistema linfático	Anemia		
Trastornos del sistema inmunológico			Hipersensibilidad (incluyendo reacción anafiláctica)
Trastornos del sistema nervioso	Dolor de cabeza, vértigo	Temblor	
Trastornos cardíacos			Bradicardia***, arritmia***, isquemia de miocardio*** y prolongación QT***
Trastornos vasculares	Hipotensión	Rubor	
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Dolor de pecho	Disnea	
Trastornos gastrointestinales	Náusea, dolor abdominal, vómitos		
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Prurito	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Dolor de espalda, debilidad muscular		
Trastornos renales y urinarios		Retención urinaria	
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Escalofrío, pirexia, dolor		

* Basados en los estudios de parto vaginal.

*** Notificado con oxitocina (estrechamente relacionada en estructura a carbetocina).

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es.

4.9. Sobredosis

La sobredosis con carbetocina puede producir hiperactividad uterina siendo o no debida a hipersensibilidad a este agente.

La hiperestimulación con contracciones fuertes (hipertónicas) o prolongadas (tetánicas) resultantes de una sobredosis de oxitocina puede llevar a la rotura uterina o hemorragia posparto.

En casos graves la sobredosis de oxitocina puede llevar a hiponatremia e intoxicación hídrica, especialmente cuando se asocia con una ingesta excesiva de líquido concomitante. Como carbetocina es un análogo de oxitocina, no se puede descartar la posibilidad de un efecto similar.

El tratamiento de la sobredosis de carbetocina consiste en terapia sintomática y de soporte. Cuando aparezcan signos o síntomas de sobredosis se debe dar oxígeno a la madre. En casos de intoxicación hídrica

es esencial restringir la ingesta de líquido, promover diuresis, corregir el equilibrio electrolítico y controlar las convulsiones que eventualmente puedan ocurrir.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Oxitocina y análogos.

Código ATC: H01BB03.

Las propiedades farmacológicas y clínicas de carbetocina son las de un agonista de oxitocina de acción prolongada.

Como oxitocina, carbetocina se une selectivamente a receptores de oxitocina en el músculo liso del útero, estimula las contracciones rítmicas del útero, aumenta la frecuencia de las contracciones existentes y aumenta el tono de la musculatura del útero.

En el útero posparto, carbetocina es capaz de incrementar la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas espontáneas. El inicio de la contracción uterina después de la administración intravenosa o intramuscular de carbetocina es rápido, obteniéndose una contracción firme a los 2 minutos.

Una dosis única intravenosa o intramuscular de 100 microgramos de carbetocina administrada tras el nacimiento del niño es suficiente para mantener la contracción uterina adecuada que previene la atonía uterina y el sangrado excesivo, comparable con una infusión de oxitocina durante varias horas.

Eficacia y seguridad clínica

La eficacia de carbetocina en la prevención de la hemorragia posparto por atonía uterina tras una cesárea se estableció en un ensayo aleatorizado, controlado con control activo, doble ciego, doble simulación, de grupos paralelos diseñado para establecer la eficacia y seguridad de carbetocina en comparación con la oxitocina 25 UI. Seiscientas cincuenta y nueve mujeres embarazadas sanas sometidas a cesárea electiva bajo anestesia epidural recibieron carbetocina 100 microgramos/ml como una dosis en bolo IV u oxitocina 25 UI como una perfusión intravenosa de 8 h.

Los resultados del análisis de la variable principal, necesidad de una intervención oxitócica adicional, mostraron que se requería una intervención oxitócica adicional en 15 (5 %) de las mujeres que recibieron carbetocina 100 microgramos IV en comparación con 32 (10 %) de las que recibieron oxitocina 25 UI ($p = 0,031$).

La eficacia de carbetocina en la prevención de la hemorragia posparto después del parto vaginal se estableció en un ensayo aleatorizado, controlado con control activo, doble ciego. En total, 29 645 mujeres fueron aleatorizadas para recibir una dosis intramuscular única de carbetocina 100 microgramos u oxitocina 10 UI. Para la variable principal de pérdida de sangre de ≥ 500 ml o el uso de uterotónicos adicionales, se obtuvieron tasas similares en ambos grupos de tratamiento (carbetocina: 2 135 mujeres, 14,47 %; oxitocina: 2 122 mujeres, 14,38 %; riesgo relativo [RR] 1,01; 95 % CI: 0,95 a 1,06), lo que demuestra la no inferioridad de carbetocina en comparación con la oxitocina con respecto a la variable principal.

Población pediátrica

En el desarrollo clínico de carbetocina para la prevención de la hemorragia posparto después del parto vaginal, 151 mujeres entre 12 y 18 años recibieron carbetocina a la dosis recomendada de 100 microgramos

y 162 recibieron oxitocina 10 UI. La eficacia y la seguridad fueron similares en ambos grupos de tratamiento en estas pacientes.

5.2. Propiedades farmacocinéticas

La farmacocinética de carbetocina se ha investigado en mujeres sanas. Carbetocina muestra una eliminación bifásica después de la administración intravenosa con farmacocinéticas lineales en el intervalo de dosis de 400 a 800 microgramos. La semivida de eliminación terminal media es 33 minutos después de la administración intravenosa y 55 minutos después de la administración intramuscular. Después de la administración intramuscular, las concentraciones máximas se alcanzan después de 30 minutos y la biodisponibilidad media es de 77 %. El volumen medio de distribución en el pseudoequilibrio (V_z) es de 22 l. El aclaramiento renal de la molécula sin modificar es bajo, < 1 % de la dosis inyectada se excreta sin cambios por el riñón.

Después de la administración intramuscular de 70 microgramos de carbetocina a 5 madres lactantes sanas, se detectaron concentraciones de carbetocina en muestras de leche materna. Los picos de concentración media en la leche fueron inferiores a 20 pg/ml, que eran aproximadamente 56 veces menores que en plasma a los 120 min.

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos no clínicos no revelan ningún riesgo especial para los seres humanos basados en estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad y tolerancia local. En un estudio de toxicidad reproductiva en ratas, con una administración diaria desde el parto hasta el día 21 de lactancia, se observó una reducción de la ganancia de peso corporal en la descendencia. No se observó ningún otro efecto tóxico. Debido a la indicación no se requieren estudios en fertilidad o embriotoxicidad.

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con carbetocina debido a que la indicación contempla una única administración..

6 . DATOS FARMACÉUTICOS

6.1. Lista de excipientes

L-metionina
Ácido succínico
Manitol
Hidróxido de sodio
Agua para preparaciones inyectables.

6.2. Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros.

6.3. Periodo de validez

2 años.

Caducidad tras la primera apertura del vial: la solución debe ser utilizada inmediatamente.

Desde un punto de vista microbiológico, a menos que el método de apertura / reconstitución / dilución excluya el riesgo de contaminación microbiana, el medicamento debe usarse inmediatamente.

Si no se usa inmediatamente, los tiempos y condiciones de almacenamiento en uso son responsabilidad del usuario.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar las ampollas o viales en el embalaje original para protegerlos de la luz. No congelar.

6.5. Naturaleza y contenido del envase

1 ml de solución en una ampolla de vidrio tipo I; 5 ampollas en un envase de cartón.

1 ml de solución en un vial de vidrio tipo I, cerrado con un tapón de goma y sellado con una cápsula de aluminio con una cubierta de plástico; 1 o 5 viales en un envase de cartón.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

Sólo para uso intravenoso e intramuscular.

Sólo se deben utilizar soluciones claras prácticamente libres de partículas.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

ICM Farmak S.L.
Av. Arraona, 119-123
08210 Barberá del Vallés, Barcelona
España

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

91.181

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Abril 2026

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

03/2026

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es>)

