



TERRAMICINA

Oxitetraciclina, polimixina

POMADA TOPICA
(Vía tópica)

COMPOSICION

Cada gramo de pomada contiene:
Oxitetraciclina (hidrocloruro) 30 mg
Polimixina B (sulfato) 10.000 U.
Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina filante, c.s.

TITULAR

FARMASIERRA LABORATORIOS S.L. Ctra. de Irún, km. 26,200 - 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

RESPONSABLE DE FABRICACION

FARMASIERRA MANUFACTURING S.L. Ctra. de Irún, km. 26,200 - 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

INDICACIONES

La TERRAMICINA ® POMADA TOPICA está indicada en el tratamiento de las infecciones piógenas superficiales, dermatitis pustular, y las infecciones asociadas a las quemaduras y heridas.

DOSIFICACION Y ADMINISTRACION

Después de efectuar una minuciosa limpieza de la zona cutánea afectada, se aplicará suavemente una pequeña cantidad de la pomada. Las aplicaciones deben repetirse 2 ó 3 veces al día. También puede aplicarse la pomada sobre una gasa estéril que luego se coloca sobre la zona afectada.

CONTRAINDICACIONES

La TERRAMICINA ® POMADA TOPICA no debe administrarse a sujetos que hayan mostrado sensibilidad a las tetraciclinas.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Se han comunicado reacciones alérgicas debidas a hipersensibilidad individual. No se han descrito otros efectos secundarios. Únicamente existe la posibilidad de sobreinfecciones por gérmenes y/u hongos resistentes. En cualquiera de los casos citados se suspenderá su administración y se aplicará la terapia adecuada en cada caso.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

No se han descrito cuadros tóxicos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

**PRESENTACIONES**

Tubo que contiene 4,7 g de pomada.

Tubo que contiene 14,2 g de pomada.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C**CON RECETA MEDICA****LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

Bajo licencia de PFIZER

FARMASIERRA LABORATORIOS S.L.

Carretera de Irún, km 26,200

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)