

Prospecto: información para el usuario

COLIRCUSÍ ANESTÉSICO 5 mg/ml + 0,5 mg/ml colirio en solución Hidrocloruro de tetracaína / Hidrocloruro de nafazolina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es COLIRCUSÍ ANESTÉSICO y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar COLIRCUSÍ ANESTÉSICO
3. Cómo usar COLIRCUSÍ ANESTÉSICO
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de COLIRCUSÍ ANESTÉSICO
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es COLIRCUSÍ ANESTÉSICO y para qué se utiliza

Colircusí Anestésico es un colirio que contiene dos componentes activos, la tetracaína que es un anestésico local y la nafazolina que tiene una acción vasoconstrictora que prolonga la actividad anestésica.

Este medicamento se utiliza para tratar afecciones dolorosas del ojo, extracción de cuerpos extraños, exploración ocular, tonometría, gonioscopia y examen de fondo de ojo con lente de contacto.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar COLIRCUSÍ ANESTÉSICO

No use COLIRCUSÍ ANESTÉSICO:

- Si es alérgico a nafazolina, tetracaína o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si tiene glaucoma de ángulo estrecho.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Colircusí Anestésico.

- Utilice este medicamento sólo en el ojo(s).
- Si está siendo tratado con inhibidores de la monoaminooxidasa.

- En niños, ya que pueden ser más susceptibles a los efectos secundarios de la medicación
- En pacientes de edad avanzada, con enfermedades del corazón o con diabetes insulino dependiente, presión sanguínea disminuida relacionada con cambios posturales, presión sanguínea aumentada, problemas de la glándula tiroides.
- El uso repetido de este medicamento puede causar heridas en la córnea.
- Por efecto del anestésico sus ojos perderán sensibilidad y, por tanto, se deberá tener cuidado para evitar lesiones accidentales en los ojos.
- Si padece enfermedad del corazón o hiperactividad tiroidea.
- No utilice este medicamento sin la supervisión de un médico.
- Si está utilizando otros medicamentos, consulte la sección “Otros medicamentos y COLIRCUSÍ ANESTÉSICO”.
- Este medicamento contiene un componente que puede dar lugar a un resultado analítico positivo en las pruebas de control de dopaje.

Otros medicamentos y COLIRCUSÍ ANESTÉSICO

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Especialmente consulte a su médico si está utilizando:

- Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs).
- Sulfamidas en colirio o pomada para los ojos.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No debe utilizar este medicamento durante el embarazo ni la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Puede notar que su visión se vuelve borrosa durante un rato después de aplicarse el colirio. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto.

COLIRCUSÍ ANESTÉSICO contiene fosfatos

Este medicamento contiene 5,8 mg de fosfatos en cada ml.

Si sufre de daño grave de la córnea (la capa transparente de la parte frontal del ojo) el tratamiento con fosfatos, en casos muy raros, puede provocar visión borrosa por acumulación de calcio.

3. Cómo usar COLIRCUSÍ ANESTÉSICO

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:


Adultos (incluidos pacientes de edad avanzada)

En general instilar 1 ó 2 gotas en el ojo afectado según se precise.

Uso en niños

No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños.


Recomendaciones de uso



1



2



3

1. Lávese las manos.
2. Coja el frasco (envase cuentagotas).
3. Después de abrir el frasco por primera vez, debe retirar el anillo de plástico del precinto si está suelto.
4. Sostenga el frasco, boca abajo, entre los dedos.
5. Incline la cabeza hacia atrás. Separe suavemente el párpado del ojo con un dedo hasta que se forme una bolsa entre el párpado y su ojo, en la que deberá caer la gota (figura 1).
6. Acerque la punta del frasco al ojo. Puede serle útil un espejo.
7. No toque el ojo o el párpado, zonas próximas ni otras superficies con el cuentagotas. Las gotas podrían contaminarse.
8. Apriete suavemente la base del frasco para que caiga una gota cada vez (figura 2).
9. Después de utilizar este colirio, presione con el dedo el borde del ojo junto a la nariz. Esto ayuda a evitar que este medicamento pase al resto del cuerpo (figura 3).
10. Si se aplica gotas en ambos ojos, repita todos los pasos anteriores con el otro ojo.
11. Cierre bien el frasco inmediatamente después de utilizar el medicamento.

Si una gota cae fuera del ojo, inténtelo de nuevo.

Si está utilizando otros medicamentos oftálmicos, espere al menos 5 minutos entre la administración de este colirio y los otros medicamentos oftálmicos. Las pomadas oftálmicas deben administrarse en último lugar.

Si usa más COLIRCUSÍ ANESTÉSICO del que debe, puede eliminarlo lavando los ojos con agua templada. No se aplique más gotas hasta la siguiente dosis.

En caso de sobredosis grave o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad utilizada. Se pueden producir reacciones graves tales como una bajada de la temperatura del cuerpo, somnolencia u otros síntomas de depresión del sistema nervioso central (especialmente en niños). También se pueden producir reacciones graves que afectan al sistema cardiovascular.

Si olvidó usar COLIRCUSÍ ANESTÉSICO, aplíquese una única dosis tan pronto como se dé cuenta. Sin embargo, si ya es casi la hora de la siguiente dosis, no se aplique la dosis olvidada y continúe con la siguiente dosis de su régimen habitual. No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Debido al anestésico, puede sufrir lesiones en la córnea o daño en el ojo, y en raras ocasiones, reacciones alérgicas.

Por la presencia de nafazolina en el medicamento, puede sufrir aumento del tamaño de la pupila y aumento de la presión en el ojo. Se pueden producir efectos secundarios generales tales como dolor de cabeza, aumento de la presión sanguínea, ritmo cardíaco y latidos irregulares, frecuencia cardíaca aumentada, desmayos y accidente cerebrovascular.

El uso excesivo de nafazolina en lactantes y niños pequeños puede causar depresión del sistema nervioso central y una reducción significativa de la temperatura del cuerpo.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de COLIRCUSÍ ANESTÉSICO

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el frasco y en la caja después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Antes de la primera apertura, conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Una vez abierto, no conservar a temperatura superior a 25°C.

Para evitar infecciones, debe desechar el frasco 4 semanas después de haberlo abierto por primera vez. Anote la fecha de apertura del frasco en el recuadro reservado para esta finalidad en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de COLIRCUSÍ ANESTÉSICO

- Los principios activos son hidrocloreuro de tetracaína e hidrocloreuro de nafazolina. Cada ml de solución contiene 5 mg de hidrocloreuro de tetracaína y 0,5 mg de hidrocloreuro de nafazolina.
- Los demás componentes son clorobutanol, fosfato sódico monobásico monohidrato, hidrogenofosfato de disodio dodecahidrato, cloruro de sodio y agua purificada.

Aspecto del producto y contenido del envase

Colircusí Anestésico es un líquido (transparente e incoloro) que se presenta en una caja que contiene un frasco de plástico de 10 ml con un tapón.

Titular de la autorización de comercialización

Alcon Healthcare S.A.

World Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 6, planta 3,
08940 - Cornellà de Llobregat (Barcelona). Spain

Responsable de la fabricación

Alcon Laboratories Belgium,

Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium

Fecha de la última revisión de este prospecto: diciembre 2018.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>