



# **TERRAMICINA**

## **Oxitetraciclina**

### **POMADA OFTALMICA ESTERIL** **(Para uso externo)**

#### **COMPOSICION**

Cada gramo de pomada contiene:

Oxitetraciclina (hidrocloruro) ..... 10 mg

Excipientes: Vaselina líquida; Vaselina filante ..... c.s.

#### **PROPIEDADES**

La TERRAMICINA ® (oxitetraciclina) es un antibiótico de amplio espectro. Su acción es bacteriostática, ya que actúa inhibiendo la síntesis proteica.

#### **TITULAR**

Farmasierra Laboratorios S.L.-Ctra. Irún, km 26,200 -28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

#### **RESPONSABLE DE FABRICACION**

Farmasierra Manufacturing S.L.-Ctra. Irún, km 26,200 -28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

#### **INDICACIONES**

La TERRAMICINA ® POMADA OFTALMICA ESTERIL está indicada en las infecciones oculares superficiales causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

En infecciones oculares graves, la aplicación tópica deberá ser completada con la administración sistémica de un antibiótico adecuado.

#### **POSOLOGIA Y ADMINISTRACION**

De 3 a 6 aplicaciones en el ojo afectado.

#### **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION**

TERRAMICINA ® POMADA OFTALMICA ESTERIL se aplicará depositando una pequeña cantidad de la pomada en el saco conjuntival del ojo afectado, hasta la completa curación del proceso, la cual puede tener lugar entre un día o varias semanas dependiendo de la naturaleza y gravedad de la infección. En los casos de blefaritis, las escamas y costras serán retiradas antes de proceder a la aplicación de la pomada. Para la aplicación de la pomada con fines profilácticos, se seguirá el mismo procedimiento el día antes de la operación y subsecuentemente durante varios días.

Se instruirá al enfermo para que evite contaminar la punta del tubo en el momento de la aplicación.

#### **CORREO ELECTRÓNICO**

[sugerencias\\_ft@aemps.es](mailto:sugerencias_ft@aemps.es)

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID

### **CONTRAINDICACIONES**

La TERRAMICINA ® POMADA OFTALMICA ESTERIL está contraindicada en pacientes con alergias a las tetraciclinas.

### **INTERACCIONES**

Esta pomada no debe administrarse conjuntamente con antibióticos bactericidas por la posibilidad de producirse un antagonismo.

### **EFECTOS SECUNDARIOS**

Con el uso de este preparado pueden producirse reacciones de alergia, en cuyo caso debe interrumpirse su administración e instaurarse la terapéutica adecuada.

En tratamientos prolongados pueden aparecer sobreinfecciones producidas por microorganismos resistentes, en cuyo caso debe interrumpirse el tratamiento y aplicar la terapéutica adecuada.

### **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

Debido a las características de este preparado destinado para uso tópico, no es previsible la posibilidad de producirse una intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **PRESENTACION**

TERRAMICINA ® POMADA OFTALMICA ESTERIL; Se presenta en tubo de punta roma especial para aplicación oftálmica que contiene 3,5 g de pomada.

### **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **MANTENER PREFERENTEMENTE ENTRE 15 Y 30 °C**

### **CON RECETA MEDICA**

### **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

Bajo licencia de PFIZER

FARMASIERRA LABORATORIOS, S.L.  
Carretera de Irún, km 26,200  
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)