

## Prospecto: información para el usuario

### **SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS LACTANTES**

#### **GLICEROL**

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados debe utilizarse adecuadamente.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información adicional, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a su médico.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es Supositorios de Glicerina Dr. Torrents Lactantes y para qué se utiliza
2. Antes de usar Supositorios de Glicerina Dr. Torrents Lactantes
3. Cómo usar Supositorios de Glicerina Dr. Torrents Lactantes
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Supositorios de Glicerina Dr. Torrents Lactantes
6. Información adicional

#### **1. Qué es SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS LACTANTES y para qué se utiliza**

El glicerol, principio activo de este medicamento es un laxante, que se administra por vía rectal.

El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que, junto a una ligera acción irritante local, consigue estimular los movimientos del intestino.

Está indicado para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional para lactantes y niños menores de 2 años.

#### **2. ANTES DE USAR SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS LACTANTES**

##### **No use Supositorios Glicerina Dr. Torrents Lactantes:**

- Si es alérgico (hipersensible) al glicerol o a cualquiera de los demás componentes (excipientes) del medicamento.
- Si padece alguna enfermedad anorectal, rectocolitis hemorrágica (un tipo de inflamación crónica del intestino) y hemorroides inflamadas.
- Si tiene retortijones, cólicos, náuseas, vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, enfermedades intestinales inflamatorias agudas o, en general, cualquier situación de dolor abdominal, sin conocer la causa que lo produce.

##### **Tenga especial cuidado con Supositorios Glicerina Dr. Torrents Lactantes:**

- En caso de la aparición de sangre en heces, irritación, dolor o que no mejora debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico.
- No use este medicamento más de 7 días seguidos, salvo que su médico se lo indique.

- Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico, en pacientes con cuadros patológicos graves, especialmente cardiovasculares (relativas al corazón o a los vasos sanguíneos).

### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

### **3. Cómo USAR SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS LACTANTES**

Siga exactamente las instrucciones de administración de Supositorios de Glicerina Dr. Torrents Lactantes indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es:

#### **Lactantes menores de 2 años**

Administrar 1 supositorio al día, cuando sea necesario, o según la prescripción del médico.

Forma de administración:

El supositorio se administra por vía rectal.

Tras sacar el supositorio del frasco, introduzca el supositorio profundamente en el recto. Reprima la evacuación lo máximo posible con el fin de que el medicamento pueda ejercer su acción.

Si en el momento de la administración nota resistencia, debe interrumpir la misma, ya que puede resultar perjudicial y dañina.

No se debe utilizar el medicamento durante más de 7 días seguidos. Si los síntomas no mejoran debe suspender el tratamiento y consultar al médico.

Si estima que la acción de Supositorios Glicerina Dr. Torrents Lactantes es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **Si usted usa más Supositorios Glicerina Dr. Torrents Lactantes del que debiera:**

No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación, debido a su uso.

El uso abusivo y prolongado de este medicamento puede dar lugar a un síndrome de “colon irritable” (síntomas o molestias como alternancia del estreñimiento y de la diarrea, espasmos intestinales, hinchazón, náuseas y gases)

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Supositorios Glicerina Dr Torrents Lactantes puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Durante el período de utilización de Glicerol solución rectal como laxante, se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: picor, dolor e irritación del ano.


Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **5. Conservación de SUPOSITORIOS DE GLICERINA DR. TORRENTS LACTANTES**

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto sigre  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

#### **6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

##### **Composición de Supositorios Glicerina Dr. Torrents lactantes**

Cada supositorio contiene 1,25 g de Glicerol como principio activo

Los demás componentes (excipientes) son: ácido esteárico e hidróxido de sodio

##### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Supositorios Glicerina Dr. Torrents Lactantes son supositorios

Se presentan en Frascos que contienen 12 supositorios

##### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

###### **Titular de la autorización de comercialización:**

FLEER ESPAÑOLA S.L.

Rambla Catalunya nº 53 atico

08007,Barcelona-España

###### **Responsable de la fabricación:**

Dr. Torrents S.A.

Avda. Hospital s/n

08795 Olesa de Bonesvalls (Barcelona) España

Teléfono: 93 898 40 11 Telefax: 93 898 41 76

**Este prospecto ha sido aprobado en MES/AÑO.**

Abril de 2011

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>