



**nani predental
(Benzocaína)**

NUEVA FÓRMULA

COMPOSICIÓN

Cada 100 g del gel contienen:

Benzocaína (D.C.I.) 5 g
Excipientes (propilenglicol, hidroxietilcelulosa, ciclamato sódico, manitol, esencia de anís verde y esencia de fresa) C.S.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Gel gingival. Envase con un tubo de 10 g con sabor a fresa-anís.

ACTIVIDAD

nani predental contiene Benzocaína, un anestésico local útil para combatir de forma inmediata el dolor cuando se aplica externamente sobre la mucosa oral.

TITULAR Y FABRICANTE

LABORATORIOS ALTER, S.A. - Mateo Inurria, 30 - 28036 MADRID.

INDICACIONES

Alivio local sintomático de las molestias de las encías originadas por la aparición de los primeros dientes.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en caso de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos locales, o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

No utilizar en niños menores de 4 meses.

PRECAUCIONES

Aplicar este producto exclusivamente sobre las encías.

En caso de que los síntomas empeoren o continúen tras 7 días de tratamiento, interrúmpalo y consulte a su médico.

INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

La Benzocaína no debe utilizarse conjuntamente con medicamentos como las sulfamidas e inhibidores de la colinesterasa.

Si está utilizando algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

No se puede utilizar este medicamento en estos casos.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

Uso en niños

Contraindicado en niños menores de 4 meses.

Deportistas

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico del control del dopaje como positivo.

POSOLOGÍA

La aplicación es exclusivamente sobre las encías.

Niños mayores de 4 meses:

Aplíquese 3-4 veces al día siguiendo las “Instrucciones para la correcta administración del preparado”.

No aplicar este medicamento más veces de las recomendadas ni más de 7 días seguidos.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Para exclusiva aplicación sobre las encías.

Lavarse las manos antes de aplicar el preparado. Poner sobre el dedo o una gasa limpios una pequeña cantidad de gel, equivalente a un grano de arroz y aplicar sobre la encía del niño, en los puntos de erupción o dolor, hasta 3-4 veces al día.

SOBREDOSIS



En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562 0420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En casos de reacciones alérgicas al preparado, pueden aparecer erupciones en la piel. Suspenda su utilización y acuda a su médico.

Si se observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: Noviembre 1999.



2359911

NOTA: Las palabras "NUEVA FÓRMULA" figurarán durante un año a partir de la autorización.

El tamaño de la letra tendrá un cuerpo 7, como mínimo