



## PROSPECTO

### ALGI-MABO CÁPSULAS Metamizol magnésico

#### COMPOSICIÓN

Composición por cápsula:

Metamizol (D.C.I.) magnésico.....500 mg

Excipientes: Estearato de magnesio.

Componentes de la cápsula: Gelatina, óxido de hierro rojo, eritrosina, dióxido de titanio.

#### FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Envases con 12 ó 20 cápsulas.

#### ACTIVIDAD

Metamizol magnésico (noramidopirinometansulfonato de magnesio) es un derivado pirazolónico que posee una acción analgésica completa, seguida de tranquilización sin hipnosis. Asimismo, tiene un efecto antiinflamatorio y antitérmico. Por su componente magnésico, tiene una acción espasmolítica, disminuyendo el tono muscular, sin alteración sensible del ritmo de los órganos correspondientes.

#### TITULAR Y FABRICANTE

TITULAR: MABO-FARMA, S.A.  
Grupo TEDEC-MEIJ  
Carretera M-300 Km 30,500  
28802 Alcalá de Henares. Madrid.

FABRICANTE: TEDEC-MEIJ FARMA, S.A.  
Carretera M-300 Km 30,500  
28802 Alcalá de Henares. Madrid.  
o  
Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A.  
C/ Laguna 66-70. Polígono Industrial Urtinsa II.  
28923 Alcorcón. Madrid.

#### INDICACIONES

- Dolor agudo postoperatorio o post-traumático.
- Dolor de tipo cólico.
- Dolor oncológico.
- Dolor ginecológico: dismenorrea.
- Dolor odontológico: gingivitis.
- Fiebre alta que no responde a otros antitérmicos.

#### CORREO ELECTRÓNICO

[sugerencias\\_ft@aemps.es](mailto:sugerencias_ft@aemps.es)

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID



#### CONTRAINDICACIONES

Algi-Mabo cápsulas está contraindicado en pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, anafilaxis o agranulocitosis) al metamizol u otros derivados pirazolónicos.

## **PRECAUCIONES**

El tratamiento será interrumpido de forma inmediata si aparece algún signo o síntoma sugestivo de anafilaxis/shock anafiláctico (dificultad para respirar, asma, rinitis, edema angioneurótico o de glotis, hipotensión, urticaria, erupción) o agranulocitosis (fiebre alta, escalofríos, dolor de garganta, inflamación en boca, nariz o garganta, lesiones en mucosa oral o genital). Deberá informarse a los pacientes sobre este particular antes de comenzar el tratamiento, advirtiéndoles que suspendan el mismo y consulten a su médico inmediatamente si presentan alguno de los síntomas anteriormente mencionados.

Dados los riesgos asociados al tratamiento con metamizol, deberá valorarse cuidadosamente el balance beneficio-riesgo del tratamiento en comparación con otras alternativas terapéuticas.

Los pacientes que hayan experimentado una reacción de hipersensibilidad al metamizol, no deben volver a ser reexpuestos al mismo.

## **INTERACCIONES**

Potencia y se potencia con otros derivados pirazolónicos. Potencia, a dosis altas, los efectos de algunos depresores del S.N.C. Potencia la acción de los anticoagulantes cumarínicos. Es potenciado por el PAS. Con la fenilbutazona y los barbitúricos hay una reducción mutua de sus acciones.

## **INCOMPATIBILIDADES**

No procede.

## **ADVERTENCIAS**

Ante la aparición de fiebre, ulceración bucal o alteración cutánea debe suspenderse el tratamiento y consultar a su médico.

Los pacientes con historia de alergias múltiples a medicamentos, especialmente a salicilatos, deben consultar a su médico.

## **POSOLOGÍA**

Adultos: de 2 a 5 cápsulas al día (una cada 4-5 horas).

## **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**

Ingerir con un poco de agua.

## **SOBREDOSIS**

Dada la escasa toxicidad de ALGI-MABO, no se prevé la intoxicación por el preparado. Solo se presenta a dosis masivas.

En caso de sobredosis o ingesta accidental masiva, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 5620420.

#### REACCIONES ADVERSAS

El tratamiento con Algi-Mabo conlleva un riesgo aumentado de reacciones anafilácticas y agranulocitosis. Ambas reacciones pueden aparecer en cualquier momento después de iniciado el tratamiento y no muestran relación con la dosis diaria administrada. El riesgo de aparición de un shock anafiláctico parece ser mayor con las formas parenterales.

#### CONSERVACIÓN

Manténgase al abrigo del calor y la humedad.

#### CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

#### OTRAS PRESENTACIONES

ALGI-MABO Ampollas: Envases 2 ó 6 ampollas de 2 g de metamizol magnésico.

ALGI-MABO Supositorios adultos: Envases con 6 supositorios de 1 g de metamizol magnésico.

ALGI-MABO Supositorios infantil: Envases con 6 supositorios de 500 mg de metamizol magnésico.

#### **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

#### TEXTO REVISADO

Junio 2000