



FARMAPROINA 600.000 U.I.
PENICILINA G PROCAINA
INYECTABLE INTRAMUSCULAR

COMPOSICION

Por vial:

Penicilina G Procaína 600.000 U.I.

Por ampolla de disolvente:

Agua para inyección.. 4 ml

PROPIEDADES

La penicilina G Procaína es un compuesto equimolecular de procaína y penicilina G que, en forma de suspensión, se administra por vía intramuscular. Se disuelve lentamente en el punto inyectado y al cabo de unas cuatro horas proporciona niveles hemáticos en meseta que van disminuyendo lentamente durante las siguientes 15-20 horas.

INDICACIONES

Procesos infecciosos producidos por gérmenes sensibles a la penicilina, tales como: Infecciones del aparato respiratorio, infecciones del aparato urinario, infecciones otorrinolaringológicas y odontológicas, infecciones ginecológicas, infecciones digestivas, infecciones dermatológicas y venéreas, infecciones vasculares centrales y periféricas y profilaxis infecciosa, en relación con intervenciones quirúrgicas.

POSOLOGIA

Habitualmente:

ADULTOS: 600.000 unidades al día

NIÑOS: 300.000 unidades al día

La dosis de 1.200.000 se utiliza habitualmente para el tratamiento de la sífilis en inyección diaria durante un mínimo de diez días.

NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACION

Deberá inyectarse exclusivamente por vía intramuscular profunda con aguja de 8 décimas, tirando previamente del émbolo de la jeringuilla para tener seguridad de que la aguja no está en la luz de un vaso sanguíneo.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de sensibilización alérgica a la penicilina o a la procaína.

PRECAUCIONES

Las penicilinas se deben administrar con precaución en los enfermos de alergia y/o asma. Se debe poner atención en evitar la inyección intravascular accidental. Algunos enfermos pueden ser alérgicos a la procaína.

ADVERTENCIAS

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID



En ocasiones se han comunicado reacciones graves de hipersensibilidad (anafilácticas) en enfermos tratados con penicilinas, incluso por vía oral, que son más probables en individuos con hipersensibilidad a múltiples alérgenos. Si se presentase una reacción alérgica se tratará adecuadamente (antihistamínicos y/o corticosteroides) y se considerará la suspensión de la administración. Las reacciones anafilácticas graves requieren tratamiento de urgencia inmediato con adrenalina. También podrá estar indicado el tratamiento con oxígeno, esteroides intravenosos e intubación respiratoria si es proceso.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTERACCIONES

En general, no se recomienda la administración simultánea de antibióticos bacteriostáticos.

EFECTOS SECUNDARIOS

Reacciones de hipersensibilidad: rash cutáneo, urticaria, enfermedad del suero. Reacciones anafilácticas.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

La Penicilina G Procaína es un producto virtualmente atóxico. El tratamiento de las reacciones anafilácticas se hará como se indica en ADVERTENCIAS.

PRESENTACION

FARMAPROINA 600.000 UI, envase con 1 vial y una ampolla con agua para inyección.

OTRAS PRESENTACIONES

FARMAPROINA 1.200.000 UI, envase con 1 vial y una ampolla con agua para inyección.

Laboratorio REIG JOFRÉ

Avda. Gran Capità, 10
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

CON RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS