

SERMION 5 mg

Nicergolina

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene: Nicergolina (D.C.I.) 5 mg.

Excipientes: Sacarosa, calcio fosfato, sodio carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina, magnesio estearato, goma arábica, titanio dióxido, resina de colofonia, resina de sandaraca, magnesio carbonato, cera carnauba, talco y naranja Pal Super.

PROPIEDADES

- Sermion (nicergolina) es un fármaco vasoactivo, dotado de acción alfa-adrenolítica y activadora del metabolismo cerebral. La acción de Sermion (nicergolina) se desarrolla en distintos lugares:

- a nivel cerebral determina una reducción de las resistencias vasculares, un aumento del flujo arterial y de la utilización de oxígeno y de glucosa; - a nivel de la circulación pulmonar, disminuye las resistencias vasculares; - sobre la circulación de los miembros, induce a un aumento del flujo, que es particularmente evidente en los pacientes con una irrigación insuficiente debida a arteriopatías funcionales.

Los estudios realizados in vitro e in vivo, tanto experimentales como en el hombre, han demostrado que Sermion (nicergolina) inhibe la agregación plaquetaria. En clínica, Sermion (nicergolina) ha demostrado ser eficaz, regulando y mejorando los trastornos cerebrales por insuficiencia metabólico-vascular, así como en las alteraciones derivadas de una irrigación arterial insuficiente de los miembros. En general, a las dosis terapéuticas, Sermion (nicergolina) no modifica la presión arterial; en los pacientes hipertensos puede inducir una disminución gradual de las cifras tensionales.

El fármaco está desprovisto de acción emética.

INDICACIONES

- Trastornos metabólico-vasculares cerebrales, agudos y crónicos (arterioesclerosis cerebral, trombosis y embolia cerebral, isquemia cerebral transitoria).
-
- Cefaleas de etiología vascular.
- Terapia coadyuvante en las situaciones clínicas que se acompañan de hiperagregabilidad plaquetaria, en la hipertensión arterial.
-
- Trastornos oto-vestibulares de origen vascular: vértigos, acúfenos, hipoacusias.

POSOLOGÍA

- Por vía oral: 5-10 mg (1-2 comprimidos) 3 veces al día a intervalos regulares durante períodos prolongados. Para facilitar la absorción es preferible la ingestión del fármaco fuera de las comidas.

La posología y la duración del tratamiento están condicionadas a la forma clínica. El efecto terapéutico de Sermion (nicergolina), subjetivo y objetivo, puede a veces no manifestarse inmediatamente, sino hacerlo solamente tras un cierto período de tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

Si bien en los estudios toxicológicos no se ha demostrado que nicergolina posea actividad teratógena, se recomienda limitar el uso del medicamento durante el embarazo a los casos de absoluta necesidad.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTERACCIONES

La acción vasoactiva de Sermion (nicergolina) puede potenciar el efecto de los fármacos hipotensores.

EFECTOS SECUNDARIOS

Aunque muy raramente, es posible en algunos casos, observar la aparición de rubeosis, sensación de calor y ligeros trastornos gástricos, hipotensión y vértigos.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

La posibilidad de intoxicación a causa del fármaco es muy remota. Sólo en algunos casos de sobredosificación, pueden aparecer los síntomas descritos como efectos secundarios, los cuales ceden fácilmente al suprimir la administración del fármaco.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIONES

Envase conteniendo 45 comprimidos recubiertos.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños

Pfizer GEP, S.L.
Avda. de Europa 20-B
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Alcobendas (Madrid).

Fabricado por: Pfizer Italia S.r.L - Ascoli Piceno – Italia

Septiembre 2013