

## Prospecto: información para el usuario

### Neocare 4 mg/g crema

Tretinoína

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas de enfermedad que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Neocare crema y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Neocare crema
3. Cómo usar Neocare crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Neocare crema
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. Qué es Neocare crema y para qué se utiliza

Neocare es un medicamento que pertenece al grupo de medicamentos denominados antiacnéicos tópicos. Neocare es una crema que está indicada en el tratamiento tópico del acné vulgar de leve a moderado.

### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Neocare crema

#### No use Neocare crema:

- si es alérgico (hipersensible) al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si está embarazada.
- si planea quedarse embarazada.
- si tiene antecedentes familiares o personales con epiteloma cutáneo (un tipo de cáncer de piel).
- en zonas de la piel con heridas, abrasión y eczema (enfermedad de la piel con inflamación, enrojecimiento y exudación), ya que puede producir irritación cutánea.

### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Neocare crema.

La irritación que produce este medicamento, está ligada directamente a la eficacia del producto y desaparece al espaciar las aplicaciones. En las primeras semanas de tratamiento, se puede observar un aparente aumento de los síntomas y signos de irritación. Esta reacción es normal, ya que se trata de la eliminación acelerada de los microquistes que estaban en formación en la parte más profunda de la piel.

En caso de irritación persistente o grave, su médico valorará la posible interrupción del tratamiento.

La aplicación excesiva de Neocare crema no mejora los resultados del tratamiento, pudiendo incluso inducir a una marcada irritación con enrojecimiento, descamación, picor etc...

Durante el tratamiento con Neocare crema se debe tener cuidado con los tratamientos concomitantes con otros medicamentos que puedan producir irritaciones locales, especialmente aquellos que tengan un efecto abrasivo, desecante o descamante.

Las zonas tratadas no deben exponerse al sol (aún estando nublado) ni a lámparas de rayos ultravioleta (UVA) durante el tratamiento con Neocare crema. A los pacientes con quemaduras solares se les debe advertir que no usen el producto hasta su recuperación total.

Cuando no pueda evitarse la exposición al sol, se recomienda utilizar productos con filtros solares y ropas protectoras sobre las zonas tratadas.

Durante el tratamiento con Neocare crema se pueden utilizar conjuntamente cosméticos, pero no se deben aplicar en la piel al mismo tiempo.

Evitar el contacto con los ojos, párpados, ángulos de la nariz, boca y membranas mucosas.

Debe evitarse su administración en caso de infección de la zona afectada. Deberá tener la precaución de no dejar crema acumulada entre los pliegues de la piel.

En zonas como cuello y antebrazos existe un mayor riesgo de irritación por lo que se recomienda reducir la frecuencia de aplicación.

En caso de que la piel esté irritada es conveniente esperar la recuperación total de la piel antes de iniciar el tratamiento con Neocare crema.

### **Interacción de Neocare crema con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está utilizando o ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

No usar Neocare crema si está tomando medicamentos fotosensibilizantes (medicamentos que aumentan la sensibilidad de la piel a la luz solar) como tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenitiazidas y sulfonamidas.

Utilizar este medicamento con precaución en presencia de:

- medicamentos empleados en tratamientos cutáneos que se utilicen para el acné.
- productos con efecto desecante o descamante incluyendo jabones, champús, cosméticos y astringentes (especialmente aquellos que contienen alcohol o aromas, por ejemplo: colonias, lociones para antes y después del afeitado, etc...), champús o jabones de tratamiento, líquidos de permanente, electrólisis, cremas y ceras depilatorias o preparados o procesos que puedan irritar la piel, a menos que el tratamiento se realice bajo supervisión médica.

### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

No use Neocare crema si está embarazada o tiene intención de quedarse embarazada. Su médico puede darle más información.

No se sabe si tretinoína se excreta por la leche materna, por lo que se tomarán las precauciones necesarias cuando lo utilicen madres en período de lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir o utilizar máquinas.

**Neocare crema contiene alcohol cetílico, propilenglicol, butilhidroxitolueno, sal de sodio del parahidroxibenzoato de propilo y sal de sodio del parahidroxibenzoato de metilo.**

Este medicamento puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetílico.

Este medicamento contiene 50 mg de propilenglicol en cada gramo. El propilenglicol puede provocar irritación en la piel.

Este medicamento puede provocar reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxitolueno.

Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene la sal de sodio del parahidroxibenzoato de propilo y la sal de sodio del parahidroxibenzoato de metilo.

### **3. Cómo usar Neocare crema**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico  
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Neocare crema.

Su médico, le recomendará la dosis adecuada para su tratamiento. Según el tipo de piel y la gravedad de la afección, el médico le recetará la concentración adecuada. Las siguientes presentaciones se encuentran disponibles en el mercado: 4 mg/g, 0,5 mg/g, 0,25 mg/g y 0,1 mg/g.

Normalmente se comenzará el tratamiento con la concentración más baja (0,1 mg/g) y posteriormente, de acuerdo a la respuesta se incrementará paulatinamente a concentraciones superiores, 0,25 y 0,5 mg/g, para finalmente terminar con la concentración de 4 mg/g.

Antes de la aplicación, se lavará la piel con agua y un jabón suave, dejándola secar sin frotar al menos durante 20-30 minutos. Posteriormente, se extenderá una cantidad de crema que cubra exclusivamente la zona afectada, 2 veces al día, aunque deben ajustarse dicha cantidad y aplicaciones a los requerimientos de cada persona. Evitar el contacto con los ojos, párpados, ángulos de la nariz y boca, y demás mucosas del cuerpo.

En cualquier caso, su médico deberá indicarle la duración del tratamiento con Neocare crema.

#### Precauciones generales de empleo

Para información más detallada sobre precauciones generales de empleo consultar con la sección 2 , “Advertencias y precauciones”.

#### **Uso en niños**

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Neocare crema en niños.

#### **Si usa más Neocare crema del que debe**

La ingestión oral accidental de Neocare crema puede conducir a efectos similares a los asociados por una ingestión oral excesiva de vitamina A, por ejemplo: sequedad de piel, dolor en las articulaciones, falta de apetito, vómitos etc...

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**Si olvidó usar Neocare crema**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Si interrumpe el tratamiento con Neocare crema**

No interrumpa el tratamiento a menos que su médico se lo aconseje.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Neocare crema puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

La aplicación cutánea de Neocare crema puede producir picores transitorios, sensación de calor, ligero enrojecimiento y descamación similar al de una quemadura solar leve, sequedad, eritema local grave y aparición de edemas en el lugar de aplicación.

La eficacia del producto a base de tretinoína va casi siempre acompañada de fenómenos de irritación cutánea que desaparecen al espaciar las aplicaciones.

Por el momento, todos los efectos adversos de Neocare crema han sido reversibles al interrumpir el tratamiento.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

**5. Conservación de Neocare crema**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

Cerrar bien el envase después de su uso.

No utilice Neocare crema después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el PUNTO SIGRE<sup>+</sup> de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**6. Contenido del envase e información adicional****Composición de Neocare crema:**

- El principio activo es tretinoína. Cada gramo de crema contiene 4 mg de tretinoína.
- Los demás componentes (excipientes) son: Xalifin-15 (PEG-8-C12-C18 Alquil eter), alcohol cetílico, glicerol, propilenglicol, Oxydex 2004 (propilenglicol, butilhidroxitolueno (E-321), palmitato de ascorbilo, estearato de glicerilo, ácido cítrico), sal de sodio del parahidroxibenzoato de metilo (E-219), sal de sodio del parahidroxibenzoato de propilo (E-217) y agua desionizada.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Crema viscosa y homogénea de color amarillo.  
Tubo de aluminio de 20 g.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.  
Ctra. Cazoña-Adarzo s/n  
39011 Santander (España)

**Este prospecto ha sido aprobado en Noviembre 2020**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>