



FUNSIX 50 CÁPSULAS DURAS

NUEVA FÓRMULA

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

DL-Metionina (DCI) 200 mg; L(+)-Cisteína (DCI) HCl 80 mg; L-Cistina 25 mg; Extracto seco de mijo 20 mg; Pantotenato calcio (DCI) 2,5 mg; Riboflavina (DCI) (sodio fosfato) (Vitamina B₂) 0,5 mg; Piridoxina (DCI) (clorhidrato) (Vitamina B₆) 0,7 mg; Biotina (DCI) (Vitamina H) 0,05 mg; Alfa-Tocoferol Acetato (Vitamina E) 3 mg. Excipientes: Estearato magnésico c.s, sílice coloidal anhidra c.s., óxido de hierro sintético (E-172); Eritrosina (E-127); Amarillo de quinoleína (E-104); Dióxido de titanio (E-171).

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Caja con 50 cápsulas duras.

ACTIVIDAD

FUNSIX proporciona al organismo, elementos necesarios para la formación del cabello y de las uñas.

TITULAR Y FABRICANTE

Lab. SERRA PAMIES S.A.
Ctra. Castellvell núm. 24
43206 REUS (TARRAGONA)

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la caída del cabello y de la fragilidad de las uñas, relacionado con un aporte inadecuado de vitaminas y aminoácidos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar FUNSIK en personas con hipersensibilidad o alergia a alguna de sus componentes y en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES

FUNSIX no debe tomarse de forma continuada. En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

No sobrepasar la dosis indicada en posología.

INTERACCIONES

FUNSIX, por su contenido en piridoxina, interfiere en tratamientos con levo-dopa, en pacientes con Parkinson, por lo que deberá consultar al médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento.

ADVERTENCIAS

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID



Embarazo y lactancia

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

Uso en niños

No administrar este medicamento a niños.

POSOLOGÍA

VÍA ORAL

La dosis recomendada es de 3 a 6 cápsulas al día (con una dosis inicial de 2 cápsulas tres veces al día durante 14 días, y una dosis de mantenimiento de 1 cápsula tres veces al día). Las cápsulas deben tomarse enteras, durante las comidas, con líquido (agua, zumos de frutas, etc.).

En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

No tomar este medicamento durante largos períodos de tiempo.

SOBREDOSIS

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis de FUNSIX puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos), dolores de cabeza o articulares.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a un centro médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

Alergia o hipersensibilidad a alguno de sus componentes. En raras ocasiones se produce una ganancia de peso.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Debido a la avidez por la humedad del polvo de la especialidad FUNSIX, debe conservarse el envase original protegido de la humedad. En ocasiones al romper la tira de aluminio para tomar una cápsula, se nota un olor característico debido a que durante el envasado puede quedar algo de polvo de FUNSIX en la superficie de la cápsula y al entrar en contacto con la humedad atmosférica los aminoácidos de la fórmula producen este olor típico; esto no significa que la especialidad esté en mal estado, ni influye en su eficacia terapéutica

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: MARZO 2000

 Laboratorios Serra Pamies S.A.