

Prospecto: información para el usuario

ANTIVERRUGAS ISDIN colodión

Ácido salicílico/ Ácido láctico

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 15 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es ANTIVERRUGAS ISDIN y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar ANTIVERRUGAS ISDIN
3. Cómo usar ANTIVERRUGAS ISDIN
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ANTIVERRUGAS ISDIN
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es ANTIVERRUGAS ISDIN y para qué se utiliza

Contiene como principios activos ácido salicílico y ácido láctico y pertenece al grupo de los medicamentos *anti-verrugas*. Cuando se aplica sobre la piel produce un ablandamiento y posterior destrucción del estrato córneo, permitiendo la eliminación de las verrugas.

Antiverrugas Isdin está indicado para el tratamiento de las verrugas cutáneas.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar ANTIVERRUGAS ISDIN

No use Antiverrugas Isdin:

- si es alérgico al ácido salicílico, al ácido láctico o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- en zonas de piel irritada, inflamada o herida.
- en lunares o marcas de nacimiento
- en niños menores de 2 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Antiverrugas Isdin.

Sólo para uso externo. No ingerir.

Evitar el contacto con los ojos, mucosas y piel sana. Aclarar con agua durante 15 minutos si el líquido entra en contacto con los ojos u otras mucosas o la piel que no ha de ser tratada.

Muy inflamable. Evitar fumar durante su aplicación y debe mantener el frasco alejado de llamas o calor.

Se requiere tener precaución con el uso de este medicamento en los siguientes casos:

- si tiene diabetes mellitus.
- si sufre problemas de circulación periférica (en piernas sobre todo).

Los pacientes con insuficiencia renal y/o hepática, si usan el producto durante mucho tiempo o extensamente podrían padecer efectos adversos.

Personas de edad avanzada

Las personas mayores pueden tener más probablemente problemas de los vasos sanguíneos, lo que se debe tener en cuenta por la posibilidad de aparición de efectos adversos.

Niños y adolescentes

Antiverrugas ISDIN está contraindicado en niños menores de 2 años.

En niños entre 2 y 12 años solo se utilizará bajo control médico.

Uso de Antiverrugas Isdin con otros medicamentos

Antiverrugas Isdin no debe usarse conjuntamente con otros productos similares (queratolíticos) en la misma zona ya que podrían potenciarse el efecto de sus componentes.

Embarazo y lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se dispone de información sobre el uso de este medicamento en mujeres embarazadas. Como medida de precaución es preferible evitar el uso de Antiverrugas Isdin durante el embarazo.

Las formas orales (p. ej., comprimidos) de esta clase de medicamento pueden causar efectos adversos en el feto. Se desconoce si los mismos riesgos son aplicables a Antiverrugas Isdin cuando se utiliza en verrugas.

No debe utilizar Antiverrugas Isdin durante la lactancia excepto si fuese claramente necesario, valorando los posibles beneficios frente a los potenciales riesgos para el niño/bebé.

Conducción y uso de máquinas

El uso de este medicamento no afecta a la capacidad de conducir o manejar máquinas.

3. Cómo usar ANTIVERRUGAS ISDIN

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.


Uso cutáneo (en la piel).

La dosis recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 2 años (en niños mayores de 2 años y menores de 12, bajo control médico):

Aplicar sobre la verruga o verrugas una vez al día.

Antes de la aplicación de Antiverrugas Isdin, se aconseja frotar la superficie de la verruga con una lima.



Aplicar con la espátula una gota de Antiverrugas Isdin sobre la verruga a tratar, evitando tocar la zona de la piel sana que la rodea ya que puede provocar enrojecimiento y/o quemaduras. Proteger esta zona con una pomada o crema oleosa (vaselina).



Dejar secar y recubrir con un esparadrapo durante 12 horas. Repetir la operación hasta la total desaparición de la verruga.



Consulte a su médico si las verrugas son abundantes o si se produce infección o inflamación. Aunque pueden ser necesarias 12 semanas de tratamiento, consulte a su médico si no se nota mejoría después de 2 semanas.

Si usa más Antiverrugas Isdin del que debe

Debido a la vía de administración de este medicamento (uso cutáneo), la intoxicación es poco probable. En caso de aplicación accidental en los ojos o mucosas, enjuáguese con abundante agua.

En el caso de ingestión accidental por vía oral se podrían producir síntomas de toxicidad sistémica por salicilatos. Se administrarán líquidos, como agua.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, o acuda a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Se puede producir en las zonas de piel sana que rodean la verruga, enrojecimiento, inflamación e incluso ulceración o quemazón. Si se producen algunos de estos síntomas se debe suspender el tratamiento hasta

que la irritación desaparezca y al continuar tener cuidado de que el medicamento esté en contacto solo con la/s verruga/s.

Podría producirse reacción alérgica al medicamento.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:
www.notificaRAM.es.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de ANTIVERRUGAS ISDIN

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

Por ser muy inflamable, mantener el frasco bien cerrado y alejado de llamas o calor.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD.
La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Antiverrugas Isdin colodión

- Los principios activos son Ácido salicílico y Ácido láctico. Cada ml de solución contiene 167 mg de ácido salicílico (16,7%) y 167 mg de ácido láctico (16,7%).
- Los demás componentes son: colodión (elástico).

Aspecto del producto y contenido del envase

Antiverrugas Isdin es un colodión, líquido incoloro o ligeramente amarillento viscoso y con olor a éter. Se presenta en frasco de vidrio con 20 ml de colodión.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular

ISDIN, S.A.

Provençals, 33

08019 Barcelona

Responsable de la fabricación

Meribel Pharma Parets, S.L.U.

Ramon y Cajal, 2

08150 Parets del Vallés

Barcelona

España



am

Fecha de la última revisión de este prospecto: Noviembre 2024.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.es/>.