

## Prospecto: información para el usuario

### darstin 10 mg/g gel progesterona

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es Darstin y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de usar Darstin
3. Cómo usar Darstin
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Darstin
6. Contenido del envase e información adicional

### **1. Qué es Darstin y para qué se utiliza**

Este medicamento contiene progesterona, hormona natural sexual femenina.

Darstin corrige localmente el desequilibrio entre estrógenos y progesterona (dos tipos de hormonas sexuales femeninas), tratando de forma local el dolor de los pechos y de otras enfermedades benignas de los mismos.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Darstin**

#### **No use Darstin**

Si es alérgico a progesterona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

#### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Darstin.

Al ser una solución hidroalcohólica no debe aplicarse directamente sobre mucosas. Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

#### **Uso de Darstin con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

#### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

El uso de este medicamento no tiene influencia durante el embarazo, ni durante la lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

Su uso no afecta a la capacidad de conducción de vehículos y el manejo de maquinaria.

### **3. Cómo usar Darstin**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Aplicar sobre la piel de los senos 5 g de gel, todos los días por la mañana o por la noche, incluso durante las reglas. Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Darstin. No suspenda el tratamiento antes de lo indicado.

Coger la espátula por su extremo. Con la otra mano tomar el tubo y extender el gel a lo largo de la ranura. Esta cantidad es la dosis justa para un pecho (2,5 g). Repita la operación para el otro pecho. Dejar secar antes de vestirse.

Darstin no huele y no mancha.

#### **Si usa más Darstin del que debiera**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono (91) 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **Si ol vidó usar Darstin**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Darstin puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Aunque por lo general no se producen efectos adversos, se podrían presentar los que se describen a continuación según la frecuencia de presentación:

#### Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): irritación y sequedad de la piel.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **5. Conservación de Darstin**

Conservar por debajo de 25°C y mantener el envase perfectamente cerrado después de cada aplicación.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice Darstin después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su

farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Darstin**

- El principio activo es progesterona. Cada gramo de gel contiene 10 mg de progesterona.
- Los demás componentes (excipientes) son: carbómeros, trolamina, etanol al 96% y agua purificada.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Darstin se presenta en forma de gel en un tubo con 80 g y con espátula dosificadora.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

SEID, S.A.

Carretera de Sabadell a Granollers, Km. 15

08185 - Lliçà de Vall (Barcelona)

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Julio de 2003**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.