



sanoyodo povidona iodada

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante debe usted, utilizar con cuidado **sanoyodo** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días debe consultar a su médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **sanoyodo** y para qué se utiliza.
2. Antes de usar **sanoyodo**.
3. Cómo usar **sanoyodo**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **sanoyodo**.

sanoyodo

Povidona iodada

Cada 100 ml de **sanoyodo** contienen:

Povidona iodada 10 g

Los demás componentes (excipientes) son: ácido cítrico monohidrato, hidrogenofosfato de disodio dodecahidrato, glicerol (E-422) y agua purificada.

Titular y Fabricante:

Laboratorios Cinfa, S.A.

C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.

31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

1. QUÉ ES sanoyodo Y PARA QUÉ SE UTILIZA

sanoyodo es una solución para uso cutáneo. Cada frasco contiene 50 ó 100 ml de **sanoyodo**, con tapón cuentagotas y precinto de seguridad.

La povidona iodada es un antiséptico.

Este medicamento se utiliza como desinfectante de la piel de uso general en: pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

2. ANTES DE USAR sanoyodo

No use sanoyodo:

No se debe administrar el producto en los siguientes casos:

- Pacientes con alergia al yodo o a medicamentos yodados
- Pacientes recién nacidos (0 a 1 mes)

Tenga especial cuidado con sanoyodo:

No se debe utilizar este producto durante tiempo prolongado o en áreas muy grandes de la piel sin consultar al médico, especialmente en personas con enfermedades renales.

No caliente el producto antes de aplicarlo.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días, consulte a su médico.

Uso externo, exclusivamente sobre la piel.

Evite el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas.

Embarazo

Las mujeres embarazadas y en período de lactancia deben evitar la aplicación de **povidona yodada** en áreas extensas de la piel y en la zona vaginal, así como su uso prolongado, sin antes consultar al médico.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

Lactancia

Las mujeres embarazadas y en período de lactancia deben evitar la aplicación de **povidona yodada** en áreas extensas de la piel y en la zona vaginal, así como su uso prolongado, sin antes consultar al médico.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

Uso en niños

No administrar a niños menores de 30 meses sin consultar al médico.

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito efectos del producto en la conducción y el uso de máquinas.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está usando o ha usado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No aplique **povidona yodada** al mismo tiempo que otros productos que contengan derivados mercuriales, ya que éstos reaccionan con el yodo formando compuestos que son irritantes.

Los pacientes en tratamiento con litio deben evitar el uso continuado de este producto sin antes consultar al médico.

Interferencias con pruebas de diagnóstico:

Este medicamento podría interferir en los resultados de pruebas de la función tiroidea y en las de detección de sangre oculta en heces u orina, por lo que debe avisar a su médico antes de que le hagan estas pruebas.

3. CÓMO USAR sanoyodo

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

Si estima que la acción de **sanoyodo** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico

Uso cutáneo.

Después de lavar y secar, aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada, de 2 a 3 veces al día.

Este producto puede manchar la piel y la ropa. Aplicar agua para eliminar la mancha en la piel. Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón.

Si usted usa más sanoyodo del que debiera:

En caso de que se aplique una cantidad excesiva de producto y se produzca irritación en la piel, lavar la zona lesionada con abundante agua y, si la irritación continúa, acudir al médico.

En caso de sobredosis o ingestión, acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91.5620420), indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, **sanoyodo** puede tener efectos adversos.

Aunque la povidona iodada es menos irritante que el yodo, en raras ocasiones se pueden producir reacciones cutáneas locales, como irritación local, picor o escozor. En estos casos, se debe suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua.

Sin embargo, las reacciones adversas pueden llegar a ser más graves si el producto se utiliza durante mucho tiempo, o bien se aplica sobre heridas grandes o sobre quemaduras extensas.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE sanoyodo

MANTENGA **sanoyodo** FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Caducidad

No utilizar **sanoyodo** después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

SIN RECETA MEDICA



Este prospecto ha sido aprobado en Julio de 2002. (Logo del laboratorio) Laboratorios cinfa, s.a

Olaz-Chipi, 10
HUARTE- PAMPLONA
Navarra. ESPAÑA

MINISTERIO DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

Agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios