



## POVIDONA IODADA CUVE<sup>®</sup>

PROSPECTO DE POVIDONA IODADA CUVE

**Lea toda la información del prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado POVIDONA IODADA CUVE para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días debe consultar a su médico.

**En este prospecto se explica:**

1. Qué es POVIDONA IODADA CUVE y para qué se utiliza
2. Antes de usar POVIDONA IODADA CUVE
3. Cómo usar POVIDONA IODADA CUVE
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de POVIDONA IODADA CUVE

### **POVIDONA IODADA CUVE**

#### **COMPOSICIÓN POR 100 ml**

Cada 100 ml de solución contienen 10 g de povidona iodada como principio activo

Los demás componentes (excipientes) son: lauril éter sulfato de sodio, hidrogenofosfato de disodio y agua purificada

#### **TITULAR Y RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN**

LABORATORIOS PEREZ GIMENEZ  
GTA. FARMACÉUTICO. PÉREZ GIMÉNEZ 1  
14007- CÓRDOBA

#### **1. QUÉ ES POVIDONA IODADA CUVE Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Es una solución para uso cutáneo, se presenta en frascos provistos de cuentagotas, conteniendo 50, 100, 500 ml y E.C. con 20 frascos de 500 ml.

La povidona iodada es eficaz como antiséptico.

Este medicamento está indicado como desinfectante de la piel de uso general en: pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves o rozaduras.

#### **2. ANTES DE USAR POVIDONA IODADA CUVE**

**No use Povidona iodada CUVE:** no se debe administrar el producto en los siguientes casos:

- Pacientes con alergia al yodo o a medicamentos iodados.
- Pacientes con alergia a cualquier otro componente de este medicamento.
- Pacientes recién nacidos de 0 a 1 mes.

#### **Tenga especial cuidado:**

No se debe utilizar el producto durante tiempo prolongado o en áreas muy grandes de la piel sin consultar al médico, especialmente en personas con enfermedades renales.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 5 días consulte a su médico.

Uso externo, exclusivamente sobre la piel.

Evitar el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas.

#### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

Las mujeres embarazadas y en período de lactancia, deben evitar la aplicación de povidona iodada en áreas extensas de la piel y en la zona vaginal, así como su uso prolongado, sin antes consultar al médico.

CORREO ELECTRÓNICO

[sugerencias\\_ft@aemps.es](mailto:sugerencias_ft@aemps.es)

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID



**Uso en niños:**

No administrar a niños menores de 30 meses sin consultar a su médico.

**Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito.

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No aplicar povidona yodada al mismo tiempo que otros productos que contengan derivados mercuriales, ya que éstos reaccionan con el yodo formando compuestos que son irritantes. Los pacientes en tratamiento con litio deben evitar el uso continuado de este producto sin antes consultar al médico.

**Interferencias con pruebas de diagnóstico:** este medicamento podría interferir en los resultados de pruebas de la función tiroidea y en las de detección de sangre oculta en heces u orina, por lo que debe avisar a su médico antes de que le hagan estas pruebas.

**3. COMO USAR POVIDONA IODADA CUVE**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Si estima que la acción de Povidona Iodada Cuve es demasiado fuerte o débil comuníquesele a su médico o farmacéutico.

Uso cutáneo.

Después de lavar y secar la piel, aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la zona afectada de 2 a 3 veces al día.

Este producto puede manchar la piel y la ropa. Aplicar agua para eliminar la mancha en la piel. Para quitar las manchas en la ropa, lavar la prenda con agua y jabón.

**Si usted usa más POVIDONA IODADA CUVE de la que debiera:**

En caso de que se aplique una cantidad excesiva de producto y se produzca irritación en la piel, lavar la zona lesionada en abundante agua y si la irritación continúa acudir al médico.

En caso de sobredosis o ingestión, acuda inmediatamente a un Centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica telf: 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, POVIDONA IODADA CUVE puede tener efectos adversos.

Aunque la povidona yodada es menos irritante que el yodo, en raras ocasiones se pueden producir reacciones cutáneas locales, como irritación local, picor o escozor. En estos casos, se debe suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua. Sin embargo, las reacciones adversas pueden llegar a ser más graves si el producto se utiliza durante mucho tiempo, o bien se aplica sobre heridas grandes o sobre quemaduras externas.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte con su médico o farmacéutico.

**5. CONSERVACIÓN DE POVIDONA IODADA CUVE**

MANTENGA POVIDONA IODADA CUVE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

No se precisan condiciones especiales de conservación.

**Caducidad**

No utilizar POVIDONA IODADA CUVE después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**Este texto ha sido aprobado en enero de 2003**

Logo del laboratorio LABORATORIOS

MINISTERIO DE SANIDAD,  
POLÍTICA SOCIAL  
E IGUALDAD  
Agencia española de  
medicamentos y  
productos sanitarios



**Pérez giménez**