

## Prospecto: información para el usuario

### Clinwas 10 mg/ml solución para pulverización cutánea clindamicina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto

1. Qué es Clinwas solución para pulverización cutánea y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Clinwas solución para pulverización cutánea
3. Cómo usar Clinwas solución para pulverización cutánea
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Clinwas solución para pulverización cutánea
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Clinwas solución para pulverización cutánea y para qué se utiliza

Clinwas solución para pulverización cutánea es un medicamento antibiótico que pertenece a un grupo de fármacos denominados preparados antiacné de uso tópico. Actúa frenando el crecimiento de bacterias causantes del acné.

**Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.**

**Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.**

**No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.**

Clinwas solución para pulverización cutánea está indicado en el tratamiento del acné vulgar de intensidad leve a moderada, en adultos y adolescentes mayores de 12 años.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar

##### No use Clinwas solución para pulverización cutánea

- Si es alérgico a la clindamicina o a alguno de los demás componentes de este medicamento incluidos en la sección 6.
- Si presenta sensibilidad demostrada a la lincomicina (antibiótico).
- Si está embarazada o amamantando.

### **Advertencias y precauciones**

- Si sufre dermatitis atópica (piel especialmente sensible y seca).
- Si tiene historial de enfermedades gastrointestinales inflamatorias (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa).
- Si aparece diarrea asociada con el antibiótico.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Clinwas solución para pulverización cutánea.

### **Niños y adolescentes**

Este medicamento está indicado en adolescentes mayores de 12 años.

### **Otros medicamentos y Clinwas solución para pulverización cutánea**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Debido a su administración tópica Clinwas Solución para pulverización cutánea tópico no suele presentar interacciones con otros medicamentos.

Informe a su médico si toma o usa alguno de los siguientes medicamentos:

- Medicamentos antibióticos: lincomicina, metronidazol, gentamicina, aminoglucósidos, eritromicina, cloranfenicol.
- Medicamentos antiinflamatorios: ácido acetilsalicílico.
- Azufre.
- Medicamentos para tratar el acné: tretinoína, peróxido de benzoilo.
- Medicamentos bloqueadores neuromusculares que se utilizan como relajantes musculares.
- Jabones y cosméticos con un fuerte efecto secante, o productos cosméticos con altas concentraciones de alcohol (por ejemplo, lociones after-shave).

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se ha establecido su inocuidad por lo que Clinwas solución para pulverización cutánea no debe usarse si está embarazada o cree que puede estarlo, si tiene previsto quedarse embarazada o si se encuentra en período de lactancia.

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de Clinwas solución para pulverización cutánea sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria es nula o insignificante.

### **Clinwas solución para pulverización cutánea contiene propilenglicol**

Clinwas solución para pulverización cutánea contiene 50 mg de propilenglicol en cada mililitro de solución.

## **3. Cómo usar Clinwas solución para pulverización cutánea**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Aplicar dos veces al día sobre la zona afectada una ligera capa de solución friccionando ligeramente para favorecer la absorción. Presionar el envase nebulizador a una distancia aproximada de 10 cm sobre la superficie de la piel a tratar, estando esta piel limpia y seca.

La duración del tratamiento no debe sobrepasar las 12 semanas.

#### **Si usa más Clinwas solución para pulverización cutánea del que debe**

Si se aplican cantidades excesivas de Clinwas puede producirse irritación de la piel. En estos casos puede ser beneficioso el uso de una crema hidratante.

Si de forma accidental se pone en contacto con los ojos y/o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua fría.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91 562 04 20).

#### **Si olvidó usar Clinwas solución para pulverización cutánea**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Entre dichos efectos adversos se incluyen en orden de mayor a menor frecuencia:

#### **Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)**

- Sequedad cutánea, irritación de la piel, enrojecimiento de la piel, descamación, sensación de quemazón, irritación de la piel de alrededor del ojo.

#### **Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)**

- Sensación anormal de hormigueo, dolor cutáneo, erupción, piel grasa, dolor abdominal, molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas y vómitos).

#### **Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)**

- Inflamación de folículos pilosos, ardor, exacerbación del acné.

#### **Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)**

- Inflamación del colon.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>


Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Clinwas solución para pulverización cutánea**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6.

**Composición de Clinwas solución para pulverización cutánea**

- El principio activo es clindamicina. Cada mililitro de solución contiene 10 mg de clindamicina.
- Los demás componentes son alcohol isopropílico, propilenglicol, hidróxido de sodio y agua purificada.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Clinwas solución para pulverización cutánea se presenta en un frasco de vidrio con válvula nebulizadora conteniendo 30 mililitros o 50 mililitros de solución transparente.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

**Titular de la autorización de comercialización**

CHIESI ESPAÑA, S.A.U.  
Plaça d'Europa, 41-43, Planta 10  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona (España)

**Responsable de la fabricación**

ITALFÁRMACO, S.A.  
San Rafael, 3  
Alcobendas  
28108 Madrid

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** Diciembre 2024.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es>).

PR\_02\_04a