

**Lea todo el prospecto antes de empezar a usar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

- 1. Qué es YATROX 4 mg solución inyectable y para qué se utiliza**
- 2. Antes de usar YATROX 4 mg solución inyectable**
- 3. Cómo usar YATROX 4 mg solución inyectable**
- 4. Posibles efectos adversos**
- 5. Conservación de YATROX 4 mg solución inyectable**

**YATROX 4 mg solución inyectable**  
Ondansetrón (hidrocloruro, dihidrato)

El principio activo es ondansetrón (hidrocloruro, dihidrato), cada ampolla contiene:

Ondansetrón (hidrocloruro, dihidrato).....4,0 mg

Los demás componentes (excipientes) son ácido cítrico monohidrato, citrato de sodio, cloruro de sodio y agua para preparaciones inyectables, c.s.p. 2 ml.

**Titular:**

Qualigen, S.L.  
Avda. Barcelona, 69  
08970 Sant Joan Despí  
(Barcelona)

**Responsable de Fabricación:**

Laboratorios Lesvi, S.L.  
Avda. Barcelona, 69  
08970 Sant Joan Despí  
(Barcelona)

**1. QUÉ ES YATROX 4 mg solución inyectable Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

YATROX 4 mg solución inyectable es una solución inyectable que se presenta en ampollas estériles de 2 ml.

YATROX 4 mg solución inyectable se presenta en envases que contienen 5 ampollas.

Pertenece al grupo de medicamentos denominados antieméticos.

Se utiliza para prevenir los vómitos y náuseas causados por determinados tratamientos médicos.

## **2. ANTES DE USAR YATROX 4 mg solución inyectable**

### **No use YATROX 4 mg solución inyectable:**

Si es alérgico a ondansetrón o a cualquiera de los componentes de YATROX 4 mg solución inyectable.

### **Tenga especial cuidado con YATROX 4 mg solución inyectable:**

En caso de no mejorar durante el tratamiento con YATROX 4 mg solución inyectable, avisar al médico.

Comunique a su médico si es alérgico a otros medicamentos antieméticos, si tiene obstrucción intestinal, padece de estreñimiento severo, ha padecido o padece trastornos del ritmo del corazón o tiene alguna enfermedad en el hígado.

### **Embarazo**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Al igual que con otros fármacos, no deberá utilizarse ondansetrón durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, a menos que el beneficio esperado para la paciente supere cualquier riesgo para el feto.

### **Lactancia**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar un medicamento.

Probablemente el ondansetrón de las ampollas puede pasar a la leche. Se recomienda, por tanto, que las madres en periodo de lactancia no amamenten a los niños, si están usando este medicamento.

### **Información importante sobre alguno de los componentes de YATROX 4 mg solución inyectable:**

YATROX 4 mg solución inyectable contiene menos de 23 mg de sodio por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos.

## **3. CÓMO USAR YATROX 4 mg solución inyectable**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con YATROX 4 mg solución inyectable. No suspenda el tratamiento antes.

YATROX 4 mg solución inyectable debe ser administrado siempre por un profesional sanitario cualificado y nunca por uno mismo.

La dosis a recibir de YATROX 4 mg solución inyectable dependerá del tratamiento que se indique.

Si estima que la acción de YATROX 4 mg solución inyectable es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

*Si tiene más Yatrox del que debe*

Su médico o enfermero le administrará Yatrox a usted o a su hijo, por lo que es improbable que usted o su hijo reciba más cantidad. Si cree que a usted o a su hijo le han administrado más cantidad o no le han dado una dosis, informe al médico o enfermero.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, YATROX 4 mg solución inyectable puede tener efectos adversos.

La mayoría de las personas que utilizan este medicamento no tienen problema alguno. No obstante, al igual que sucede con la mayor parte de los medicamentos, algunas personas pueden notar efectos secundarios.

Algunas personas pueden ser alérgicas a los medicamentos, aunque ocurre en raras ocasiones (más de 1 de cada 10.000 y menos de 1 de cada 1.000 personas). En caso que apareciera alguno de los síntomas siguientes poco después de utilizar YATROX avise a su médico inmediatamente.

- aparición súbita de “pitos” y dolor u opresión en el pecho
- hinchazón de párpados, cara, labios, boca o lengua
- erupción en la piel o urticaria en cualquier parte del cuerpo.

Los siguientes efectos son poco frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 1.000 y menos de 1 de cada 100 personas que utilizan YATROX, pero en caso de que apareciera alguno de ellos, comunicarlo al médico inmediatamente:

- movimientos giratorios ascendentes de los ojos, rigidez muscular anormal/ movimientos del cuerpo/ temblor
- convulsiones
- latidos lentos o irregulares del corazón
- mareo o aturdimiento
- hipo.

También puede experimentar raramente visión borrosa y muy raramente ceguera transitoria, que normalmente se resuelve en 20 minutos.

Comuníquelo al médico tan pronto como pueda si ha tenido alguno de los siguientes síntomas:

Los siguientes efectos adversos son frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 100 y menos de 1 de cada 10 personas que utilizan YATROX:

- sensación de calor o rubor
- irritación en el lugar donde se administró la inyección, así como dolor, sensación de ardor, hinchazón, enrojecimiento o picor
- estreñimiento

Los siguientes efectos adversos son muy frecuentes y pueden producirse en más de 1 de cada 10 personas que utilizan YATROX:

- dolor de cabeza

Esta medicina puede afectar los resultados de las pruebas sanguíneas de comprobación de funcionamiento del hígado.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## **5. CONSERVACIÓN DE YATROX 4 mg solución inyectable**

Mantenga YATROX 4 mg solución inyectable fuera del alcance y de la vista de los niños.

Conservar protegido de la luz.

### **Caducidad:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **Otras presentaciones:**

YATROX 8 mg solución inyectable: Envase con 5 ampollas.

YATROX 4 mg comprimidos: Envase con 6 y 15 comprimidos.

YATROX 8 mg comprimidos: Envase con 6 y 15 comprimidos.

*Este prospecto ha sido aprobado en marzo 2007*