

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Aciclovir Vir Pharma 50 mg/g crema EFG**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Aciclovir Vir Pharma crema y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Aciclovir Vir Pharma crema
3. Cómo usar Aciclovir Vir Pharma crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Aciclovir Vir Pharma crema
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Aciclovir Vir Pharma crema y para qué se utiliza**

Aciclovir Vir Pharma contiene aciclovir, un principio activo que pertenece al grupo de medicamentos llamados antivirales.

Está indicado para el tratamiento de infecciones de la piel producidas por el virus del herpes simplex incluyendo herpes genital inicial y sus recaídas y herpes labial.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Aciclovir Vir Pharma crema**

##### **No use Aciclovir Vir Pharma crema**

- si es alérgico al aciclovir, valaciclovir o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

##### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento.

No se recomienda la aplicación de aciclovir en mucosas como en caso de la boca, los ojos o la vagina ya que puede ser irritante. Se debe tener especial cuidado para evitar la introducción accidental en los ojos. Si accidentalmente se produjese contacto con los ojos, lavar con agua abundante y consultar con un oftalmólogo si fuese necesario.

Si las recaídas son frecuentes, o está usted gravemente inmunodeprimido (infección por VIH), consulte con su médico para que decida si debe cambiar a una presentación de administración oral.

El herpes genital puede transmitirse por contacto sexual, incluso si la pareja no presenta síntomas. Debe evitarse el contacto sexual si un miembro de la pareja presenta signos o síntomas de herpes genital. Aciclovir no evita la transmisión del herpes.

No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

### **Niños y adolescentes**

Se debe aplicar cinco veces al día aproximadamente cada cuatro horas omitiendo la aplicación de la noche.

Se debe continuar el tratamiento durante 5 días, ver más adelante.

La administración en niños debe realizarse siempre bajo supervisión médica.

### **Uso de Aciclovir Vir Pharma crema con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

#### Embarazo

No existe información suficiente sobre los efectos de la administración de la crema durante el embarazo. La administración sistémica de aciclovir a ratas y conejos no ha producido efectos teratogénicos ni embriotóxicos.

#### Lactancia

No se dispone de información sobre los niveles de aciclovir que aparecen en la leche materna tras su administración tópica.

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia para conducir o usar máquinas es nula o insignificante.

### **Aciclovir Vir Pharma crema contiene alcohol cetosteárico, parahidroxibenzoato de propilo y parahidroxibenzoato de metilo**

Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetosteárico.

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de propilo y parahidroxibenzoato de metilo.

## **3. Cómo usar Aciclovir Vir Pharma crema**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

Recuerde usar su medicamento.

Debe aplicarse en las lesiones o en las lesiones inminentes lo antes posible tras el comienzo de la infección.

Es importante comenzar el tratamiento de los episodios recurrentes durante el periodo durante el cual todavía no han aparecido las lesiones o cuando las lesiones aparecen por primera vez.

Su médico le indicará la duración del tratamiento. No suspenda el tratamiento antes ya que podría volver a aparecer la infección producida por el virus.

#### *Adultos y niños*

Se debe aplicar cinco veces al día aproximadamente cada cuatro horas omitiendo la aplicación de la noche.

Se debe continuar el tratamiento durante 5 días. Si no se ha producido la curación en 5 días, el tratamiento puede prolongarse durante 5 días más hasta un total de 10 días.

En caso de que los síntomas empeoren o no se observe mejoría en los 10 días de tratamiento, deberá acudir a su médico.

Tras la aplicación se deben lavar las manos para evitar la diseminación a otras zonas del cuerpo o el contagio de otras personas.

Si estima que la acción de Aciclovir Vir Pharma crema es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

#### **Si usa más Aciclovir Vir Pharma crema del que debe**

No es probable que se produzcan cuadros de intoxicación debido a su uso externo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **Si olvidó usar Aciclovir Vir Pharma crema**

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento habitual tan pronto como sea posible.

No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

##### **Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):**

- Quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación.
- Leve sequedad o descamación de la piel.
- Sensación de picor.

##### **Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):**

- Erupción de la piel.
- Dermatitis de contacto tras la aplicación.

##### **Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):**

- Reacciones de hipersensibilidad inmediata incluyendo hinchazón (de párpados, cara, labios, boca o lengua).

## Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Aciclovir Vir Pharma crema

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Aciclovir Vir Pharma crema

- El principio activo es aciclovir. Cada gramo de crema contiene 50 mg de aciclovir.
- Los demás componentes son: alcohol cetosteárico, parafina líquida, parafina, para hidroxibenzoato de metilo (E 218), parahidroxibenzoato de propilo (E 216) y agua purificada.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Este medicamento consiste en una crema de color blanco o casi blanco que se envasa en tubos de aluminio provistos de un tapón de plástico. Los tubos se acondicionan en cajas de cartón.

Presentaciones en tubos de 2 y 15 gramos.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

#### Titular de la autorización de comercialización:

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A.  
Laguna, 66-68-70. Polígono Industrial Urtinsa II  
28923 Alcorcón (Madrid)  
España

#### Responsable de la fabricación:

Pharmex Advanced Laboratories, S.L.  
Ctra. A-431 Km 19  
14720 Almodovar del Río (Córdoba)  
España

o

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A.  
Laguna, 66-68-70. Poligono Industrial Urtinsa II  
28923 Alcorcón (Madrid)  
España

**Fecha de la última revisión de este prospecto: febrero 2020**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>