

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Tip pastillas para chupar sabor miel-limón

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico

Contenido del prospecto:

- 1. Qué es Tip pastillas para chupar sabor miel-limón y para qué se utiliza**
- 2. Antes de tomar Tip pastillas para chupar sabor miel-limón**
- 3. Cómo tomar Tip pastillas para chupar sabor miel-limón**
- 4. Posibles efectos adversos**
- 5. Conservación de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón**
- 6. Información adicional**

1. Qué es Tip pastillas para chupar sabor miel-limón y para qué se utiliza

Tip pastillas para chupar sabor miel-limón son pastillas redondeadas de color amarillento con olor y sabor medicamentoso a miel-limón. Se presenta en envases de 12 y 24 pastillas para chupar.

El dextrometorfano es un antitusivo (medicamento para la tos) que está indicado en el tratamiento sintomático de todas las formas de tos que no vayan acompañadas de expectoración (tos irritativa, tos nerviosa).

2. ANTES DE TOMAR Tip pastillas para chupar sabor miel-limón

No tome Tip pastillas para chupar sabor miel-limón:

- si presenta alergia o hipersensibilidad al dextrometorfano o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.
- si tiene insuficiencia respiratoria.
- si tiene tos asmática o acompañada de expectoración.
- Si se encuentra en tratamiento con ciertos medicamentos antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) (Ver apartado “Toma de otros medicamentos”).
- Si usted está tomando otros medicamentos como antidepresivos o antipsicóticos, Tip pastillas puede interactuar con estos medicamentos y es posible que experimente cambios en su estado mental (p. ej. agitación, alucinaciones, coma) y otros efectos como temperatura corporal superior a los 38° C, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial y exageración de los reflejos, rigidez muscular, falta de coordinación y/o síntomas gastrointestinales (p. ej., náuseas, vómitos y diarrea).

Este medicamento puede provocar dependencia. Por lo tanto el tratamiento debe ser de corta duración.

Tenga especial cuidado con Tip pastillas para chupar sabor miel-limón:

- si usted tiene tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones.
- Si usted tiene alguna enfermedad hepática consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Se han descrito casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, por lo tanto deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, debido a que pueden ocasionarse efectos adversos graves (ver epígrafe “Si toma más Tip pastillas del que debiera”)

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Tip pastillas para chupar sabor miel-limón no debe administrarse junto con ciertos medicamentos antidepresivos (IMAO), ni con furazolidona, y procarbazina, ya que pueden producir reacciones tóxicas graves caracterizadas por excitación, hipertensión e hiperpirexia.

Toma de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón con los alimentos y bebidas

No deben consumirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

Durante el tratamiento con Tip pastillas para chupar sabor miel-limón puede aparecer, en raras ocasiones una disminución de la capacidad de reacción o somnolencia que habrá de tenerse en cuenta en caso de conducir automóviles o manejar maquinaria peligrosa.

Información importante sobre algunos de los componentes de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón:

Este medicamento lleva como excipiente 1161,7 mg de sacarosa y 1188 mg de glucosa por pastilla, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y los pacientes diabéticos.

3. Cómo TOMAR Tip pastillas para chupar sabor miel-limón

Siga exactamente las instrucciones de administración de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón indicadas por su médico o farmacéutico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es:

Adultos y niños mayores de 12 años

Disolver una pastilla en la boca cuando aparezca la tos, hasta un máximo de 2 pastillas cada 4-6 horas. No sobrepasar las 12 pastillas al día.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.

Si toma más pastillas de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón de las que debiera:

Si ha tomado más Tip pastillas para chupar sabor miel-limón de las que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si toma más Tip pastillas de lo indicado, puede experimentar los siguientes síntomas: náuseas y vómitos, contracciones musculares involuntarias, agitación, confusión, somnolencia, trastornos de la consciencia, movimientos oculares involuntarios y rápidos, trastornos cardíacos (aceleración del ritmo cardíaco), trastornos de coordinación, psicosis con alucinaciones visuales e hiperexcitabilidad.

Otros síntomas en caso de sobredosis masiva pueden ser: coma, problemas respiratorios graves y convulsiones.

Póngase en contacto con su médico u hospital inmediatamente si experimenta cualquiera de los síntomas mencionados. La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar.

Se han producido casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, pudiendo aparecer efectos adversos graves, como taquicardia (aceleración de los latidos del corazón), letargo, hipertensión o hipotensión (tensión alta o baja), midriasis (dilatación de la pupila del ojo), agitación, vértigo, molestias gastrointestinales, alucinaciones, habla farfullante, nistagmo (movimiento incontrolado e involuntario de los ojos), fiebre, taquipnea (respiración superficial y rápida), daño cerebral, ataxia (movimientos descoordinados), convulsiones, depresión respiratoria, pérdida de conciencia, arritmias (latidos irregulares del corazón) y muerte

Si olvidó tomar Tip pastillas para chupar sabor miel-limón :

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, Tip pastillas para chupar sabor miel-limón puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Pueden producirse los siguientes efectos adversos:

Raros (al menos 1 de cada 10.000 pacientes): Somnolencia o molestias gastrointestinales. En ese caso es aconsejable reducir la posología.

El consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos secundarios. No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Si se observa estas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. Conservación de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón

Mantener Tip pastillas para chupar sabor miel-limón fuera del alcance y de la vista de los niños.

Mantener en el envase original.

No utilice Tip pastillas para chupar sabor miel-limón después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Tip pastillas para chupar sabor miel-limón

El principio activo es dextrometorfano hidrobromuro.

Los demás componentes son: sacarosa glucosa, sacarina sódica, ácido cítrico monohidrato y aromas de miel y limón.

Aspecto del producto y contenido del envase

Pastillas redondas de color amarillo con olor y sabor a miel y limón.

Las pastillas se presentan en envases de 12 y 24 unidades

Titular de la Autorización de Comercialización y Responsable de la Fabricación

Titular de la Autorización de Comercialización:

FARMALIDER S.A

C/Aragoneses 15,

28108- Alcobendas- (Madrid)

España

Responsable de la Fabricación:

FARMALIDER S.A

C/La Vega, nº 6

45532 Carriches (Toledo)

España

Este prospecto ha sido aprobado en Abril 2020