



ENCIMENAL[®]

Extracto de *Curcuma longa* L.

<Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **ENCIMENAL[®]** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 15 días, debe consultar a un médico.>

En este prospecto se explica:

1. Qué es **ENCIMENAL[®]** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **ENCIMENAL[®]**.
3. Cómo tomar **ENCIMENAL[®]**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **ENCIMENAL[®]**.

ENCIMENAL[®] 100 mg Comprimidos.

Extracto de *Curcuma longa* L.

Principio activo: 100 mg de extracto seco del rizoma de *Curcuma longa* L., equivalente a 10-15 mg de curcuminoides. Relación rizoma / extracto (5,5 – 6,5:1) p/p.

Los demás componentes son excipientes: Monohidrógeno fosfato cálcico, celulosa microcristalina, almidón de maíz, carboximetilalmidón sódico, estearato magnésico, dióxido de silicio y maltodextrinas.

Titular:

Laboratorios ALACAN, S.A.
De ASAC PHARMA
C/ Capricornio, 5
03006 ALICANTE (España)

Fabricante:

Laboratorios CENTRUM, S.A.
De ASAC PHARMA
C/ Sagitario 14
03006 ALICANTE (España)

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID

1. QUÉ ES ENCIMENAL[®] Y PARA QUÉ SE UTILIZA

ENCIMENAL[®] se presenta en la forma farmacéutica de comprimidos, conteniendo 100 mg de extracto seco de rizoma de *Curcuma longa* L., en envases de 30 y 60 comprimidos.

ENCIMENAL[®] es un fármaco que actúa facilitando la formación de bilis

ENCIMENAL[®] está indicado en el tratamiento de trastornos funcionales digestivos de origen hepaticobiliar, tales como digestiones pesadas y flatulencias.

2. ANTES DE TOMAR ENCIMENAL[®]

No tome ENCIMENAL[®] en los siguientes casos:

Hipersensibilidad o alergia conocida a alguno de los componentes de esta especialidad.

En caso de alteraciones graves de la función hepática, insuficiencia biliar de origen funcional, inflamación de la vesícula, obstrucción de conductos biliares o si usted tiene piedras en la vesícula.

Tenga especial cuidado

Si durante la utilización de **ENCIMENAL[®]** nota alguna reacción adversa, o sospecha de cambios en los efectos de otros medicamentos por una posible interacción con este preparado, comuníquelo a su médico o farmacéutico.

No existe experiencia de uso en niños, por lo que no se recomienda su uso en menores de 12 años.

Embarazo:

No existe experiencia en el uso de esta especialidad durante el embarazo y la lactancia. Su empleo en estas circunstancias sólo se realizará por prescripción facultativa.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico

Lactancia:

No existe información del paso de los componentes del extracto a la leche materna. Se recomienda que consulte al médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas:

ENCIMENAL[®] no presenta efectos sobre la capacidad de conducción o uso de máquinas.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si esta tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

3. CÓMO TOMAR ENCIMENAL[®]

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Este medicamento se utiliza por vía oral.

Adultos: 1 ó 2 comprimidos al día, antes de las principales comidas.

Mayores de 12 años: 1 comprimido antes de la comida.



Los comprimidos se deberán ingerir enteros, acompañados de la cantidad suficiente de agua u otro líquido.

Si usted estima que la acción de **ENCIMENAL**[®] es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted toma más **ENCIMENAL[®] del que debiera**

No se han descrito casos de intoxicación con este tratamiento, en el caso de que Usted haya tomado más **ENCIMENAL**[®] del que debiera, acuda inmediatamente a un centro médico o llame al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono 915620420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar **ENCIMENAL[®]:**

No tome dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, **ENCIMENAL**[®] puede tener efectos adversos.

5. CONSERVACIÓN DE **ENCIMENAL[®]**

Conservar este medicamento en su embalaje original, protegido de la humedad, a temperatura no superior a 30°C.

Mantenga **ENCIMENAL[®] fuera del alcance y de la vista de los niños.**

Caducidad

No utilizar **ENCIMENAL**[®] después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Este prospecto ha sido aprobado en Febrero de 2002