

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto:**

1. Qué es *Macil 600 mg polvo efervescente* y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar *Macil 600 mg polvo efervescente*.
3. Cómo tomar *Macil 600 mg polvo efervescente*.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de *Macil 600 mg polvo efervescente*.

**MACIL 600 mg polvo efervescente EFG**

El principio activo de este medicamento es acetilcisteína.

Cada sobre monodosis contiene acetilcisteína 600 mg.

Los demás componentes son: manitol, granulado efervescente (conteniendo bicarbonato sódico, ácido cítrico y maltodextrina), sílice coloidal anhidra y aroma de naranja.

**Titular**

Farmasierra Laboratorios, S.L.  
Carretera de Irún km 26,200  
San Sebastián de los Reyes,  
28709 - Madrid - España

**Responsable de la Fabricación**

Farmasierra Manufacturing, S.L.  
Carretera de Irún km 26,200  
San Sebastián de los Reyes,  
28700 - Madrid España

**1. QUÉ ES *Macil 600 mg polvo efervescente* Y PARA QUÉ SE UTILIZA:**

Este medicamento es un polvo efervescente para administración oral.

Se presenta en envases con 20 sobres monodosis.

Acetilcisteína pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos, es decir, que rompe químicamente el moco haciéndolo más líquido para que pueda ser expectorado.

Esta medicina está indicada como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades donde exista mucho moco o moco espeso, tales como bronquitis aguda y crónica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfisema, atelectasia debida a

obstrucción mucosa: complicaciones pulmonares de la fibrosis quística y otras patologías relacionadas.

## **2. ANTES DE TOMAR *Macil 600 mg polvo efervescente*:**

### ***No tome Macil 600 mg polvo efervescente si:***

- es usted alérgico a alguno de los componentes de este medicamento,
- tiene úlcera gastroduodenal,
- padece asma o insuficiencia respiratoria grave.

No administrar en niños menores de 2 años.

### ***Tenga especial cuidado con Macil 600 mg polvo efervescente :***

La eventual presencia de un leve olor sulfúreo no indica alteración del producto, sino que es propia del principio activo.

### ***Embarazo y lactancia:***

Durante el embarazo y el periodo de lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

### ***Conducción y uso de maquinaria:***

Durante el tratamiento con este medicamento usted podrá conducir y utilizar maquinaria de forma segura.

### ***Uso con otros medicamentos:***

Se recomienda no asociar la administración de acetilcisteína con antitusivos (medicamentos para la tos) o con medicamentos que disminuyan las secreciones bronquiales (atropina). Consulte a su médico si está siendo tratado con alguno de esos medicamentos.

Tenga en cuenta que estas instrucciones pueden ser también de aplicación a medicamentos que se hayan tomado o utilizado antes, y que puedan tomarse o utilizarse después.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando/tomando, o ha utilizado/tomado recientemente cualquier otro medicamento – incluso los adquiridos sin receta médica.

## **3. CÓMO TOMAR *Macil 600 mg polvo efervescente*:**

Recuerde tomar su medicamento.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Su médico le indicará la duración del tratamiento con Macil 600 mg polvo efervescente, y cuando y como deberá interrumpirlo. No suspenda el tratamiento antes.

Macil 600 mg polvo efervescente se administra por vía oral. Se recomienda administrar un sobre (600 mg de acetilcisteína) una vez al día. La dosis de 600 mg se puede administrar en tres tomas de 200 mg cada una, para los que se utilizará Macil 200 mg EFG.

Para su administración, reconstituir el polvo efervescente en agua hasta obtener una solución de sabor agradable que se bebe directamente del vaso.

Adultos y niños mayores de 7 años: La posología media recomendada es de 600 mg de acetilcisteína por vía oral al día administrada en una sola toma, o en tres tomas de 200 mg cada una.

***Si Usted toma más Macil 600 mg polvo efervescente de lo que debiera:***

Si Usted ha tomado más Macil 600 mg polvo efervescente de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: (91) 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

***Si se olvidó de tomar Macil 600 mg polvo efervescente:***

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

**4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:**

Como todos los medicamentos, Macil 600 mg polvo efervescente puede tener efectos adversos.

En algún caso aislado pueden aparecer náuseas, vómitos y diarreas.

En raras ocasiones pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad, con urticaria y broncoespasmo. En estos casos, interrumpir el tratamiento e inmediatamente consultar con su médico.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

**5. CONSERVACIÓN DE Macil 600 mg polvo efervescente:**

Mantenga Macil 600 mg polvo efervescente fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

### **Caducidad**

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el sobre y en el envase.

Este prospecto ha sido revisado en abril de 2012.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>