



**LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**  
*Lactobacillus acidophilus*

**Lea todo el prospecto detenidamente  
porque contiene información importante  
para Usted.**

*Este medicamento puede obtenerse sin receta*

**En este prospecto encontrará información sobre:**

1. Qué es LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, y para que se utiliza
2. Antes de tomar LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL
3. Como tomar LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL

**LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**  
*Lactobacillus acidophilus*

Cada sobre contiene:

- Como principio activo:

Lactobacillus acidophilus \*(muertos) .....10.000 millones de bacterias  
(como 340 mg de polvo liofilizado de cuerpos bacterianos de *Lactobacillus acidophilus* cepa  
Lacteol (LB), muertos en su medio de cultivo, fermentado y neutralizado), excipiente c.s

\* Lactobacillus fermentum y Lactobacillus delbrueckii

- Los demás componentes (excipientes) son:

Sacarosa, lactosa, ácido silícico, aroma de plátano naranja, carbonato de calcio (E-170).

**LABORATORIO TITULAR**

Laboratorio Reig Jofré, S.A.

C/Gran Capitán 10

08970 Sant Joan Despí

Barcelona -España

**RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN**

ADARE PHARMACEUTICALS S.A.S

Route de Bû

78550 Houdan

Francia

**CORREO ELECTRÓNICO**

[sugerencias\\_ft@aemps.es](mailto:sugerencias_ft@aemps.es)

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8  
28022 MADRID



## **1. QUE ES LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL Y PARA QUE SE UTILIZA.**

Este medicamento es un polvo para suspensión oral , se presenta en un envase conteniendo 10 sobres.

Pertenece al grupo de medicamentos denominados antidiarreicos de origen microbiano.

Está indicado en el tratamiento sintomático de las diarreas inespecíficas y en la prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos causados por la destrucción de la flora intestinal, debido a la administración de antibióticos.

## **2. ANTES DE TOMAR LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL.**

### **No tome LACTEOL**

- Si tiene alergia a alguno de los componentes de este medicamento
- Si tiene alergia a la lactosa o a la leche

### **Tenga especial cuidado con LACTEOL :**

En los casos siguientes consulte a su médico para que evalúe la idoneidad del tratamiento:

- Si la diarrea va acompañada de fiebre o vómito
- En caso de presencia de sangre en las deposiciones
- En caso de sed muy intensa o sensación de lengua seca ya que son síntomas de deshidratación
- En niños menores de 6 años, en caso de diarrea con más de 6 deposiciones al día, con una duración de más de 24 horas y/o acompañada de pérdida de peso
- En adultos y niños mayores de 6 años, si no se produce mejora al cabo de 2 días de tratamiento

### **Toma de Lacteol con alimentos y bebidas**

El tratamiento con LACTEOL debe ir asociado a una pauta dietética:

- Toma de bebidas abundantes, durante el día, para compensar la pérdida de líquido
- Dieta astringente adecuada como por ejemplo pescados y carnes asados y arroz, excluyendo grasas, verduras frescas, frutas, platos picantes y alimentos o bebidas heladas.

### **Embarazo:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento

Por carecer de suficientes datos, es preferible no utilizar este medicamento durante el embarazo.

<b>I</b>	<b>m</b>	<b>p</b>	<b>o</b>	<b>r</b>	<b>t</b>
<b>a</b>	<b>n</b>	<b>t</b>	<b>e</b>		

**Lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento

**Uso en niños**

Para niños menores de 6 años consulte al médico

**Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito

**Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica homeopáticos, plantas medicinales y otros productos relacionados con la salud.

No se han descrito interacciones con otros medicamentos.

**3. COMO TOMAR LACTEOL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.  
Este medicamento se administra vía oral

Vierta el polvo en medio vaso de agua, agite hasta completa dispersión e ingiéralo rápidamente. En niños pequeños el polvo puede mezclarse con algún alimento.

Adultos y niños:

La dosis usual es de 1 a 2 sobres al día en función de la gravedad del trastorno. En caso de tomar 2 sobres se repartirán en dos tomas

En diarrea aguda, puede aumentarse la dosis a 3 sobres el primer día de tratamiento repartidas en tres tomas, para seguir con la misma dosis usual (1-2 sobres) durante los días siguientes.

Niños menores de 6 años : Consultar al médico

Si los trastornos no mejoran al cabo de 2 días, consultar con su médico.

Si estima que la acción de Lacteol es demasiado fuerte o débil, comuníquesele a su médico o farmacéutico.



**Si Usted toma más LACTEOL del que debiera:**

Si usted ha tomado más sobres de los debidos consulte inmediatamente al médico o al farmacéutico o llame al Servicio de Información de Toxicología, teléfono: 91 562 04 020, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**Si olvidó tomar LACTEOL:**

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.



#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamento, Lacteol puede tener efectos adversos.

Aunque no se han observado a las dosis recomendadas efectos adversos con Lacteol, en algunos casos se han descrito los siguientes efectos adversos respecto a los Lactobacillus : erupciones cutáneas, gases, eructos, hipo y estreñimiento.

Si se observa estos o cualquier otro efecto adverso no descrito en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE LACTEOL**

Mantenga Lacteol fuera del alcance y de la vista de los niños.  
No se precisan condiciones especiales de conservación

##### **Caducidad**

No utilizar LACTEOL después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

##### **Otras presentaciones**

LACTEOL CÁPSULAS DURAS

**Este prospecto ha sido aprobado:** Noviembre 2003