

**Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Usted.**

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe Usted utilizar con cuidado Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días o si van acompañados de fiebre alta, erupciones en la piel o dolor de cabeza persistente, debe consultar a un médico.

**En este prospecto:**

1. **Qué es Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar y para qué se utiliza**
2. **Antes de tomar Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar**
3. **Cómo tomar Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar**
4. **Posibles efectos adversos**
5. **Conservación de Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar**

## **Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar** Dextrometorfano hidrobromuro

- Cada pastilla contiene 10 mg de dextrometorfano hidrobromuro como principio activo.
- Los demás componentes (excipientes) son: Sacarosa (1161,7 mg), glucosa (jarabe) (1188 mg), sacarina de sodio, ácido cítrico monohidrato y aroma de anís-regaliz.

### **Titular**

GEISER PHARMA, S.L.  
Camino Labiano, 45-B  
31192, Mutilva alta (Navarra)  
España

### **Responsable de la Fabricación**

Pierre Fabre Medicament Production  
Zone Industrielle de la Coudette 32290 Aignan-Francia

LOZY'S PHARMACEUTICALS, S.L.

Campus Empresarial s/n 31795 Lekaroz (NAVARRA), España

### **1. QUE ES DEXTROMETORFANO GEISER 10 mg pastillas para chupar Y PARA QUE SE UTILIZA**

Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar son pastillas redondeadas de color amarillento con olor y sabor medicamentoso a anís-regaliz. Se presenta en envases de 12 y 24 pastillas para chupar.

El dextrometorfano es un antitusivo (medicamento para la tos) que está indicado en el tratamiento sintomático de todas las formas de tos que no vayan acompañadas de expectoración (tos irritativa, tos nerviosa).

### **2. ANTES DE TOMAR DEXTROMETORFANO GEISER 10 mg pastillas para chupar**

#### **No tome Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar:**

- Si presenta alergia o hipersensibilidad al dextrometorfano o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.
- Si tiene insuficiencia respiratoria.
- Si tiene tos asmática o acompañada de expectoración.

- Si se encuentra en tratamiento con ciertos medicamentos antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) (Ver apartado “Toma de otros medicamentos”).

#### **Tenga especial cuidado con Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar:**

- Si usted tiene tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones.
- Si usted tiene alguna enfermedad hepática consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Se han descrito casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, por lo tanto deberá tenerse en cuenta esta posibilidad, debido a que pueden ocasionarse efectos adversos graves (ver epígrafe "Si toma más Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar del que debiera").

#### **Embarazo:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

#### **Importante para la mujer:**

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico.

#### **Lactancia:**

Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

#### **Uso en niños:**

No administre Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar a niños menores de 12 años.

#### **Conducción y uso de máquinas:**

Durante el tratamiento con Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar puede aparecer, en raras ocasiones una disminución de la capacidad de reacción o somnolencia que habrá de tenerse en cuenta en caso de conducir automóviles o manejar maquinaria peligrosa.

#### **Información importante sobre algunos de los componentes de Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar:**

Este medicamento lleva como excipiente 1161,7 mg de sacarosa y 1188 mg de glucosa por pastilla, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y los pacientes diabéticos.

#### **Toma de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar no debe administrarse junto con ciertos medicamentos antidepresivos (IMAO), ni con furazolidona, y procarbazaina, ya que pueden producir reacciones tóxicas graves caracterizadas por excitación, hipertensión e hiperpirexia.

No deben consumirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

### **3. COMO TOMAR DEXTROMETORFANO GEISER pastillas para chupar**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

#### Adultos y niños mayores de 12 años

Disolver una pastilla en la boca cuando aparezca la tos, hasta un máximo de 2 pastillas cada 4-6 horas. No sobrepasar las 12 pastillas al día.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.

#### **Si usted toma más pastillas de Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar de las que debiera:**

Si Usted ha tomado más pastillas de Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar de las que debiera, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Los signos de sobredosificación se manifiestan con confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo e irritabilidad.

Se han producido casos de abuso con medicamentos que contienen dextrometorfano en adolescentes, pudiendo aparecer efectos adversos graves, como taquicardia (aceleración de los latidos del corazón), letargo, hipertensión o hipotensión (tensión alta o baja), midriasis (dilatación de la pupila del ojo), agitación, vértigo, molestias gastrointestinales, alucinaciones, habla farfullante, nistagmo (movimiento incontrolado e involuntario de los ojos), fiebre, taquipnea (respiración superficial y rápida), daño cerebral, ataxia (movimientos descoordinados), convulsiones, depresión respiratoria, pérdida de conciencia, arritmias (latidos irregulares del corazón) y muerte.

La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tel.: 91-5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

#### **Si olvidó tomar Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar:**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos, Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar puede tener efectos adversos.

Raramente puede aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales. En ese caso es aconsejable reducir la posología.

El consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos secundarios. No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Si se observa estas o cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACION DE DEXTROMETORFANO GEISER 10 mg pastillas para chupar**

Mantenga Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar fuera del alcance y de la vista de los niños. Mantener en el envase original.

#### **Caducidad:**

No utilizar Dextrometorfano Geiser 10 mg pastillas para chupar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

***Este prospecto ha sido aprobado en Mayo 2011***