

## Prospecto: información para el usuario

**Sildenafil Sandoz 25 mg comprimidos EFG**  
**Sildenafil Sandoz 50 mg comprimidos EFG**  
**Sildenafil Sandoz 100 mg comprimidos EFG**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Sildenafil Sandoz y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Sildenafil Sandoz
3. Cómo tomar Sildenafil Sandoz
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Sildenafil Sandoz
6. Contenido del envase e información adicional

### 1. Qué es Sildenafil Sandoz y para qué se utiliza

Sildenafil Sandoz contiene el principio activo sildenafil que pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Actúa dilatando los vasos sanguíneos del pene, permitiendo la afluencia de sangre cuando se está sexualmente estimulado. Sildenafil Sandoz sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado.

Sildenafil Sandoz está indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres adultos, a veces denominada impotencia. Esto sucede cuando un varón no puede obtener o mantener una erección firme, adecuada para una actividad sexual satisfactoria.

### 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Sildenafil Sandoz

#### No tome Sildenafil Sandoz

- si es alérgico a sildenafil o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6),
- si está tomando unos medicamentos llamados nitratos, ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa. Consulte con su médico si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se administran para aliviar el dolor de angina de pecho (o “dolor de pecho”). Si no está seguro, consulte con su médico o farmacéutico,
- si está utilizando cualquiera de los medicamentos denominados dadores de óxido nítrico tales como nitrato de amilo (“poppers”), ya que la combinación puede causar una disminución de su presión sanguínea potencialmente peligrosa,
- si está tomando riociguat. Este medicamento se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (es decir, tensión alta en los pulmones) y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (es decir, tensión alta en los pulmones provocada por coágulos). Los inhibidores de la PDE5, como

sildenafil, han mostrado que producen un incremento del efecto hipotensivo de este medicamento. Si está tomando riociguat o no está seguro consulte a su médico,

- si tiene un problema grave de corazón o hígado,
- si ha padecido recientemente un accidente isquémico cerebral o ataque al corazón, o si tiene la tensión arterial baja,
- si padece una rara enfermedad ocular hereditaria (tal como *retinitis pigmentosa*),
- si ha experimentado anteriormente una pérdida de la visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA-NA).

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar sildenafil:

- si padece anemia falciforme (una anomalía de los glóbulos rojos), leucemia (cáncer de las células sanguíneas), mieloma múltiple (cáncer de médula ósea),
- si padece una deformidad del pene o enfermedad de Peyronie,
- si padece problemas del corazón. En ese caso, su médico debe comprobar cuidadosamente si su corazón puede soportar el esfuerzo adicional de mantener relaciones sexuales,
- si padece actualmente úlcera de estómago o problemas hemorrágicos (tales como hemofilia),
- si experimenta una disminución o pérdida repentina de la visión, deje de tomar Sildenafil Sandoz y contacte con su médico inmediatamente.

No se aconseja utilizar sildenafil simultáneamente con ningún otro tratamiento oral o local para la disfunción eréctil.

No debe tomar sildenafil con tratamientos para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) que contengan sildenafil o cualquier otro inhibidor de la PDE5.

No debe tomar sildenafil si no tiene disfunción eréctil.

El uso de sildenafil no está indicado en mujeres.

### **Consideraciones especiales en pacientes con alteraciones renales o problemas hepáticos**

Debe comunicar a su médico si tiene problemas renales o hepáticos. Su médico puede decidir reducirle la dosis.

### **Niños y adolescentes**

El uso de sildenafil no está indicado en personas menores de 18 años.

### **Toma de Sildenafil Sandoz con otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Los comprimidos de sildenafil pueden interferir con algunos medicamentos, especialmente los utilizados para tratar el dolor de pecho. En caso de una urgencia médica, debe informar a cualquier profesional sanitario que está tomando sildenafil y cuando la tomó. No debe tomar sildenafil con otros medicamentos a menos que su médico se lo aconseje.

No debe tomar sildenafil si está tomando medicamentos denominados nitratos, ya que la combinación de estos productos puede causar un descenso potencialmente peligroso de su presión sanguínea. Siempre

informe a su médico o farmacéutico si está tomando cualquiera de estos medicamentos, que a menudo, se utilizan para aliviar el dolor de la angina de pecho (o “dolor de pecho”).

No debe tomar sildenafil si está tomando medicamentos denominados dadores de óxido nítrico, tales como nitrito de amilo (“poppers”), ya que la combinación de estos productos también puede dar lugar a un descenso de su presión sanguínea potencialmente peligroso.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando riociguat.

Si está tomando medicamentos conocidos como inhibidores de la proteasa, como los utilizados en el tratamiento del VIH, su médico puede recomendarle que comience el tratamiento con la dosis más baja (25 mg) de sildenafil.

Algunos pacientes que están recibiendo un alfabloqueante, medicamento utilizado para el tratamiento de la presión arterial alta o de la hipertrofia prostática, pueden experimentar mareos o sensación de vahído que pueden ser causados por una disminución de la tensión arterial al sentarse o levantarse rápidamente. Algunos pacientes han experimentado estos síntomas al tomar sildenafil con alfabloqueantes. Esto es más probable que ocurra en las 4 horas siguientes a la toma de sildenafil. Con el fin de disminuir la probabilidad de que ocurran estos síntomas, deberá estar recibiendo su dosis diaria del alfabloqueante de forma regular antes de comenzar con sildenafil. Su médico puede indicarle que comience el tratamiento con la dosis inferior (25 mg) de sildenafil.

#### **Toma de Sildenafil Sandoz con alimentos, bebidas y alcohol**

Sildenafil puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que sildenafil tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa.

La ingesta de alcohol puede dificultar, temporalmente, la capacidad para obtener una erección. Por lo tanto, para conseguir el máximo beneficio del medicamento, se aconseja no ingerir grandes cantidades de alcohol antes de tomar sildenafil.

#### **Embarazo, lactancia y fertilidad**

El uso de sildenafil no está indicado en mujeres.

#### **Conducción y uso de máquinas**

Sildenafil puede producir mareos y afectar a la visión. Debe saber cómo reacciona usted a sildenafil antes de conducir vehículos o utilizar maquinaria.

#### **Sildenafil Sandoz contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### **3. Cómo tomar Sildenafil Sandoz**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis de inicio recomendada es de 50 mg.

*No debe tomar sildenafil más de una vez al día.*

No tome sildenafil comprimidos recubiertos junto medicamentos que contengan sildenafil en comprimidos bucodispersables.

Debe tomar sildenafil aproximadamente una hora antes de que planeee tener relaciones sexuales. Trague el comprimido sin masticar con un vaso de agua.

*Sildenafil Sandoz 25 mg*

La ranura sirve únicamente para partir el comprimido si le resulta difícil tragarlo entero.

#### Rotura del comprimido

Coloque el comprimido sobre una superficie dura y lisa con la línea de rotura cara arriba. Presione con el pulgar en la mitad del comprimido y el comprimido se romperá en dos dosis iguales. Debe tomar las dos mitades para alcanzar la dosis mínima efectiva.

#### *Sildenafil Sandoz 50 mg*

El comprimido puede dividirse en cuatro dosis iguales. Debe tomar al menos dos cuartos (correspondientes a 25 mg) para alcanzar la dosis mínima efectiva.

#### Rotura del comprimido

Coloque el comprimido sobre una superficie dura y lisa con la línea de rotura cara arriba. Presione con el pulgar en la mitad del comprimido y el comprimido se romperá en cuatro dosis iguales.

#### *Sildenafil Sandoz 100 mg*

El comprimido puede dividirse en cuatro dosis iguales.

#### Rotura del comprimido

Coloque el comprimido sobre una superficie dura y lisa con la línea de rotura cara arriba. Presione con el pulgar en la mitad del comprimido y el comprimido se romperá en cuatro dosis iguales.

Si nota que la acción de sildenafil es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Sildenafil sólo le ayudará a conseguir una erección si se encuentra sexualmente estimulado. El tiempo que necesita sildenafil para hacer efecto varía de una persona a otra, generalmente oscila entre media y una hora. El efecto de sildenafil puede retrasarse si lo toma con una comida copiosa.

En el caso de que sildenafil no le ayude a conseguir una erección o si la erección no se mantiene el tiempo suficiente para completar el acto sexual, consulte a su médico.

#### **Si toma más Sildenafil Sandoz del que debe**

Puede experimentar un incremento en los efectos secundarios y su gravedad.

Dosis superiores a 100 mg no aumentan la eficacia.

#### ***No debe tomar más comprimidos de los recomendados por el médico.***

Si ha tomado más Sildenafil Sandoz del que debe, consulte inmediatamente a su médico, a su farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad utilizada.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Los efectos adversos notificados asociados al uso de sildenafil son por lo general de intensidad leve a moderada y de corta duración.

#### **Si experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos graves, deje de tomar sildenafil y busque atención médica inmediatamente:**

- Reacción alérgica, esta ocurre con **poca frecuencia** (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas). Los síntomas incluyen silbido repentino al respirar, dificultad para respirar o mareo, hinchazón de los párpados, cara, labios o garganta.

- Dolores en el pecho, esto ocurre con **poca frecuencia**:  
Si aparecen durante o después de mantener relaciones sexuales:
  - Sitúese en una posición semisentada e intente relajarse.
  - **No use nitratos** para tratar el dolor en el pecho.
- Erecciones prolongadas y a veces dolorosas, esto ocurre **raramente** (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas).  
Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, debe contactar a su médico inmediatamente.
- Disminución repentina o pérdida de la visión - esto ocurre **raramente**.
- Reacciones graves de la piel, esto ocurre **raramente**.  
Los síntomas pueden incluir descamación grave e hinchazón de la piel, vesiculación bucal, de los genitales y alrededor de los ojos, además de fiebre.
- Convulsiones o ataques, esto ocurre **raramente**.

### Otros efectos adversos

**Muy frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- dolor de cabeza.

**Frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- náuseas,
- enrojecimiento facial,
- acaloramiento (entre los síntomas se incluye la sensación de calor repentina en la parte superior del cuerpo),
- indigestión,
- percepción anormal del color, visión borrosa, deterioro visual,
- congestión nasal,
- mareos.

**Poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- vómitos,
- erupciones cutáneas,
- irritación ocular, derrame ocular/ojos rojos, dolor ocular, visión de luces parpadeantes, claridad visual, sensibilidad a la luz, ojos llorosos,
- palpitaciones, latido cardíaco rápido,
- presión arterial alta, presión arterial baja,
- dolor muscular,
- sensación de somnolencia,
- sensación al tacto reducido,
- vértigo,
- pitidos en los oídos,
- boca seca,
- bloqueo o congestión de los senos nasales, inflamación de la mucosa de la nariz (entre los síntomas se incluyen moqueo, estornudos y congestión nasal),
- dolor en la zona superior del abdomen, enfermedad por reflujo gastroesofágico (entre los síntomas se encuentra el ardor de estómago),
- sangre presente en orina,
- dolor en brazos o piernas,
- sangrado de la nariz,
- sensación de calor,
- sensación de cansancio.

**Raros** (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- desvanecimiento,
- accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, latido cardíaco irregular,

- disminución transitoria del flujo sanguíneo a algunas partes del cerebro,
- sensación de opresión en la garganta, adormecimiento de la boca,
- sangrado en la parte posterior del ojo, visión doble, disminución de la agudeza visual, sensación anormal en el ojo, hinchazón ocular o del párpado, pequeñas partículas o manchas en la vista, visión de halos alrededor de las luces, dilatación de la pupila del ojo, cambio de color de la parte blanca del ojo,
- sangrado del pene,
- presencia de sangre en el semen,
- nariz seca,
- hinchazón del interior de la nariz,
- sensación de irritabilidad,
- disminución o pérdida repentina de la audición.

Durante la experiencia postcomercialización se han comunicado raramente casos de angina inestable (enfermedad cardíaca) y muerte súbita. Cabe destacar que la mayoría de los hombres que experimentaron estos efectos adversos, aunque no todos ellos, tenía problemas cardíacos antes de tomar este medicamento. No es posible determinar si estos efectos adversos estuvieron relacionados directamente con sildenafil.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Sildenafil Sandoz**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.  
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre<sup>+</sup> de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Sildenafil Sandoz**

- El principio activo es sildenafil.  
Sildenafil Sandoz 25 mg: cada comprimido contiene 25 mg de sildenafil (como citrato).  
Sildenafil Sandoz 50 mg: cada comprimido contiene 50 mg de sildenafil (como citrato).  
Sildenafil Sandoz 100 mg: cada comprimido contiene 100 mg de sildenafil (como citrato).
- Los demás componentes son: hidrogenofosfato de calcio anhidro, celulosa microcristalina, copovidona, croscaramelosa sódica, estearato de magnesio, sacarina sódica y laca aluminio con carmín de índigo (E 132).

### **Aspecto del producto y tamaño del envase**

#### **Sildenafil Sandoz 25 mg**

Comprimidos de color azul claro, de forma redonda, ligeramente moteados, con ranura en una de las caras y grabado “25” en la otra.

**Sildenafil Sandoz 50 mg**

Comprimidos de color azul claro, de forma redonda, ligeramente moteados, con ranura en cruz en una de las caras y grabado “50” en la otra.

**Sildenafil Sandoz 100 mg**

Comprimidos de color azul claro, de forma redonda, ligeramente moteados, con ranura en cruz en ambas caras y grabado “100” en una de las caras.

Se presentan en envases de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 y 28 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

**Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación****Titular de la autorización de comercialización**

Sandoz Farmacéutica, S.A.  
Centro Empresarial Parque Norte  
Edificio Roble  
C/ Serrano Galvache, 56  
28033 Madrid  
España

**Responsable de la fabricación**

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Lendava Site, Trimlini 2d  
SI-9220 Lendava  
Eslovenia

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovska 57  
1526 Ljubljana,  
Eslovenia

LEK S.A.  
Ul. Domaniewska 50 C  
02-672 Warszawa  
Polonia

Salutas Pharma GmbH  
Ott-von-Guericke-allee 1,  
39179 Barleben,  
Alemania

S.C. Sandoz S.R.L.  
7A Livenzi Street  
540472 Targu Mures,  
Rumania

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

Austria

Sildenafil Sandoz 50 mg – Tabletten

Belgica	Sildenafil Sandoz 100 mg – Tabletten
	Sildenafil Sandoz 25 mg tabletten
	Sildenafil Sandoz 50 mg tabletten
	Sildenafil Sandoz 100 mg tabletten
Dinamarca	Sildenafil Sandoz
Estonia	Sildenafil Sandoz 50 mg
	Sildenafil Sandoz 100 mg
Finlandia	Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti
	Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti
Francia	Sildénafil Sandoz 25 mg, comprimé
	Sildénafil Sandoz 50 mg, comprimé
	Sildénafil Sandoz 100 mg, comprimé
Grecia	Sildenafil/Sandoz
Hungria	Sildenafil Sandoz 50 mg tableta
	Sildenafil Sandoz 100 mg tableta
Italia	SILDENAFIL SANDOZ 25 mg compresse
	SILDENAFIL SANDOZ 50 mg compresse
	SILDENAFIL SANDOZ 100 mg compresse
Letonia	Sildenafil Sandoz 100 mg tablets
Lituania	Sildenafil Sandoz 50 mg tabletès
	Sildenafil Sandoz 100 mg tabletès
Malta	Sildenafil Sandoz 25 mg Tablets
	Sildenafil Sandoz 50 mg Tablets
	Sildenafil Sandoz 100 mg Tablets
Holanda	Sildenafil Sandoz 25 mg, tabletten
	Sildenafil Sandoz 50 mg, tabletten
	Sildenafil Sandoz 100 mg, tabletten
Polonia	Sildenafil Sandoz
Portugal	Sildenafil Sandoz
Eslovaquia	Sildenafil Sandoz 100 mg tablety
España	Sildenafil Sandoz 25 mg comprimidos EFG
	Sildenafil Sandoz 50 mg comprimidos EFG
	Sildenafil Sandoz 100 mg comprimidos EFG
Suecia	Sildenafil Sandoz

**Este prospecto ha sido aprobado en marzo 2020**

*La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>*