

Prospecto: información para el paciente

Famciclovir Normon 125 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Famciclovir

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Famciclovir Normon y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Famciclovir Normon
3. Cómo tomar Famciclovir Normon
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Famciclovir Normon
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Famciclovir Normon y para qué se utiliza

Famciclovir Normon comprimidos recubiertos con película contiene el principio activo famciclovir. Famciclovir es un medicamento antiviral. Detiene la multiplicación del virus infectante. Dado que el virus se reproduce en una fase muy temprana de la infección, podrá beneficiarse más del tratamiento si empieza a tomar famciclovir tras la aparición de los primeros síntomas.

Famciclovir se utiliza para el tratamiento de dos tipos de infecciones virales en adultos:

- Herpes zoster, es una infección viral causada por un virus denominado varicela zoster (el mismo virus que causa la varicela). Famciclovir detiene la expansión del virus en el organismo por lo que la curación se produce más rápidamente.
- Famciclovir también se utiliza en el tratamiento del herpes zoster en la zona de alrededor del ojo o incluso en el propio ojo (zoster oftálmico).

Herpes genital. El herpes genital es una infección viral causada por virus herpes simple tipo 1 ó 2.

Normalmente se transmite por contacto sexual. Causa ampollas y sensación de quemazón o picor alrededor de los genitales, que puede ser doloroso. Famciclovir se utiliza para tratar infecciones de herpes genital en adultos. Las personas que tienen episodios frecuentes de herpes genital pueden también tomar famciclovir para ayudar a prevenir su reaparición.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Famciclovir Normon

No tome Famciclovir Normon

- si es alérgico a famciclovir, o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6), o a penciclovir (metabolito activo de famciclovir e ingrediente de algún otro medicamento).

Si cree que puede ser alérgico, **consulte con su médico.**

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Famciclovir Normon:

- Si padece alguna enfermedad del riñón (o la ha tenido anteriormente). Su médico puede decidir darle una dosis más baja de famciclovir.
 - Si tiene problemas con el sistema inmunológico de su organismo.
 - Si tiene problemas de hígado
- Si alguno de ellos le afecta a usted, consulte con su médico antes de tomar Famciclovir Normon.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

No se recomienda el uso de Famciclovir Normon en niños y adolescentes.

Prevención del contagio del herpes genital a otras personas

Si está tomando Famciclovir Normon para tratar o suprimir el herpes genital, o si tuvo herpes genital en el pasado, puede practicar sexo seguro, haciendo uso de los condones. Esto es importante para evitar que contagie la infección a otras personas. No debería tener sexo si tienen dolor o ampollas en los genitales.

• Toma de Famciclovir Normon con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Es especialmente importante que informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los medicamentos mencionados a continuación:

- Raloxifeno (utilizado para prevenir y tratar la osteoporosis).
- Probenecid (utilizado para tratar los niveles altos de ácido úrico asociados a la gota y para aumentar los niveles en sangre de antibióticos del tipo penicilina) u otros medicamentos que puedan afectar a sus riñones.

• Toma de Famciclovir Normon con alimentos y bebidas

Puede tomar Famciclovir Normon con o sin alimentos.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Embarazo

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Famciclovir Normon no debe utilizarse durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario. Su médico comentará con usted los riesgos potenciales de tomar Famciclovir Normon durante el embarazo.

Famciclovir Normon no debe utilizarse durante la lactancia a no ser que sea claramente necesario. Su médico comentará con usted los riesgos potenciales de tomar Famciclovir Normon durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

Famciclovir Normon puede causar mareos, somnolencia o confusión. Si experimenta alguno de estos síntomas durante el tratamiento con Famciclovir Normon **no conduzca o utilice máquinas.**

Famciclovir Normon contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”

3. Cómo tomar Famciclovir Normon

- Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.
- La dosis diaria y duración del tratamiento dependerá del tipo de infección viral que usted padezca- mire a continuación. Su médico le recetará la dosis correcta para usted.
- Para conseguir los mejores resultados comience a tomar el medicamento tan pronto como aparezcan los primeros signos y síntomas.
- No tenga relaciones sexuales con nadie si tiene síntomas de herpes genital – incluso si ha empezado el tratamiento con Famciclovir Normon. Esto se debe a que puede contagiar la infección del herpes a su pareja.
- Si tiene o ha tenido problemas de riñón, su médico puede decidir darle una dosis más baja de Famciclovir Normon.

Dosis recomendada para el herpes zoster

La dosis depende del estado del sistema inmunitario y de la fase de su infección.

Si tiene un sistema inmunológico normal, la dosis recomendada es

- 500 mg, tres veces al día, durante siete días

Si tiene un sistema inmunológico debilitado, la dosis recomendada es

- 500 mg, tres veces al día, durante diez días

Dosis recomendada para el zóster oftálmico:

Si tiene un sistema inmunológico normal, la dosis recomendada es

- 500 mg, tres veces al día, durante siete días

Dosis recomendada para el herpes genital

La dosis depende del estado del sistema inmunitario y de la fase de su infección.

Si tiene el sistema inmunológico normal, la dosis es la siguiente:

- Para el *primer episodio*, la dosis recomendada es de 250 mg tres veces al día, durante cinco días.
- Para tratar nuevos episodios la dosis recomendada es de 125 mg dos veces al día, durante cinco días.
- Para prevenir nuevos episodios la dosis recomendada es de 250 mg dos veces al día

Su médico le informará durante cuánto tiempo necesita continuar tomando sus comprimidos.

Si tiene el sistema inmunológico debilitado, la dosis es la siguiente:

- Para *tratar el episodio actual*, la dosis recomendada es de 500 mg dos veces al día, durante siete días.
- Para prevenir nuevos episodios la dosis es de 500 mg dos veces al día

Su médico le informará durante cuánto tiempo necesita continuar tomando sus comprimidos.

Si toma más Famciclovir Normon del que debiera

Si ha tomado más comprimidos de los que debiera, o si cualquier otra persona ha tomado su medicamento accidentalmente, acuda inmediatamente a su médico o centro hospitalario. Muéstrelas su envase de comprimidos. También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad tomada.

Tomar mucho Famciclovir Normon puede dañar sus riñones. Las personas con problemas de riñón pueden, raramente, padecer una insuficiencia renal si su dosis no se baja correctamente.

• **Si olvidó tomar Famciclovir Normon**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si olvidó tomar la dosis de Famciclovir Normon, debe tomarla tan pronto se acuerde. Después tome la siguiente dosis a la hora prevista. Sin embargo, no tome dos dosis en un periodo de tiempo menor a 1 hora, en ese caso sátese la dosis olvidada. Además no tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran.

Efectos adversos graves:

Muchos de estos efectos son poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes) o raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes)

- **Ampollas graves** en la piel y/o membranas mucosas de los labios, ojos, boca, orificios nasales o genitales (éstos podrían ser signos de reacciones cutáneas alérgicas graves).
- **Aparición inexplicable de hematomas**, enrojecimiento o áreas de color púrpura sobre la piel o **hemorragias nasales** (éstos pueden ser signos de un descenso en el número de plaquetas en la sangre).
- **Hinchazón** debajo de la superficie de la piel (por ejemplo hinchazón en la cara, alrededor del ojo, en los párpados y en la garganta).
- **Color amarillo en piel y/o ojos** (signos de ictericia).

La frecuencia de los siguientes efectos adversos es no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- Manchas moradas en la piel, picor, quemazón (signos de vasos sanguíneos inflamados).
- Convulsiones o ataques epilépticos.
- Dificultad para respirar o tragar. Erupción, picor, urticaria, sibilancia o tos, sensación de desmayo, mareos, cambios en los niveles de conciencia. Hipotensión, con o sin picor generalizado, enrojecimiento de la piel, hinchazón facial / de la garganta, decoloración azul de los labios, lengua o piel (signos de reacción alérgica grave).

Si nota cualquiera de estos efectos adversos **contacte con un médico inmediatamente o vaya al servicio de urgencia más cercano.**

Efectos adversos muy frecuentes (estos efectos adversos pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes)

- Dolor de cabeza

Efectos adversos frecuentes (estos efectos adversos pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes)

- Náuseas
- Vómitos
- Dolor en el abdomen
- Diarrea- Mareos
- Erupción

- Picor
- Resultados del análisis de la función hepática anormales

Efectos adversos poco frecuentes (estos efectos adversos pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes)

- Confusión
- Somnolencia (normalmente en personas mayores)
- Erupción con picor (urticaria)


Efectos adversos raros (estos efectos adversos pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes)

- Alucinaciones (ver u oír cosas que no son reales)
- Palpitaciones (signos de latidos del corazón anormales)

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Famciclovir Normon

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
- No utilice este medicamento si observa que el envase está dañado o muestra signos de deterioro.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Famciclovir Normon

El principio activo es famciclovir. Cada comprimido contiene 125 mg de famciclovir.

Los demás componentes son:

Núcleo: Almidón de maíz pregelatinizado, laurilsulfato de sodio, celulosa microcristalina (E-460), croscarmelosa de sodio, sílice coloidal anhidra, ácido esteárico.

Recubrimiento: Hipromelosa (E464), dióxido de titanio (E171), macrogol 4000, macrogol 6000.

Aspecto del producto y contenido del envase

Famciclovir Normon 125 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película blancos, redondos, biconvexos, con diámetro de 7,6 mm aproximadamente. Cada envase contiene 10 comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización:

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (España)

Responsable de la fabricación

PharmaPath S.A.

1,28 Octovriou str., Ag.Varvara, 12351 Atenas (Grecia)

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (España)

OTRAS PRESENTACIONES

Famciclovvi Normon 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Este prospecto ha sido aprobado en Septiembre 2021

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>