

Prospecto: información para el paciente

Laxido Orange 13,8 g polvo para solución oral EFG

Macrogol 3350, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Laxido Orange y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Laxido Orange
3. Cómo tomar Laxido Orange
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Laxido Orange
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Laxido Orange y para qué se utiliza

Laxido Orange contiene macrogol 3350 y los siguientes electrolitos: cloruro de sodio, hidrogenocarbonato de sodio y cloruro de potasio.

Macrogol 3350 es un laxante usado para el tratamiento del estreñimiento, especialmente si se ha estado estreñido durante mucho tiempo. También se usar para tratar la acumulación de heces duras en el intestino, que puede ser resultado del estreñimiento a largo plazo (esto se denomina impactación fecal). Macrogol 3350 ablanda las heces y facilita la evacuación, aliviando el estreñimiento. Los electrolitos ayudan a mantener los niveles normales de sodio, potasio y agua del cuerpo, mientras usted recibe tratamiento para el estreñimiento.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Laxido Orange

No tome Laxido Orange:

- si es alérgico (hipersensible) al macrogol 3350, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si tiene una perforación en la pared del intestino.
- si tiene una obstrucción en el intestino.
- si tiene parálisis del intestino (por ejemplo, sus intestinos dejan de funcionar debido a una intervención quirúrgica intestinal o a una infección grave).
- si tiene colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o megacolon tóxico.

Si algo de esto es aplicable a usted, hable con su médico, farmacéutico o enfermero para que le aconsejen.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de tomar Laxido Orange para tratar la impactación fecal, ya que antes de que tome este medicamento debe verificarse que padece dicho trastorno.

Cuando tome Laxido Orange debe seguir consumiendo fluidos en abundancia. El contenido en fluidos de Laxido Orange no debe reemplazar su consumo habitual de fluidos.

Toma de Laxido Orange con otros medicamentos

Ciertos medicamentos, por ejemplo, los antiepilépticos, pueden perder eficacia si se administran al mismo tiempo que Laxido Orange. Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. No debe tomar ningún otro medicamento por vía oral durante una hora antes y durante una hora después de tomar Laxido Orange.

Si necesita espesar los líquidos para poder tragarlos con seguridad, Laxido Orange puede contrarrestar el efecto del espesante.

Toma de Laxido Orange con alimentos y bebidas

Los alimentos y bebidas no influyen en el efecto de Laxido Orange.

Embarazo y lactancia

Se puede administrar Laxido Orange durante el embarazo y la lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Laxido Orange no tiene efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Laxido Orange contiene potasio y sodio

Los pacientes con insuficiencia renal o con dietas pobres en potasio deben tener en cuenta que este medicamento contiene 26 mg (0,68 mmol) de potasio por sobre.

Este medicamento contiene 187 mg de sodio (principal componente de la sal de mesa) en cada sobre. Ello equivale aproximadamente a un 9% del consumo diario máximo recomendado de sodio para un adulto.

Consulte con su médico o farmacéutico si necesita tomar tres o más sobres por día durante un período de tiempo prolongado, sobre todo si se le ha aconsejado que siga una dieta baja en sal (sodio).

3. Cómo tomar Laxido Orange

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero. En caso de duda, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero. Laxido Orange se debe tomar por vía oral.

Laxido Orange es un laxante para el tratamiento del estreñimiento y la impactación fecal en adultos, niños (mayores de 12 años) y ancianos.

Estreñimiento

La dosis normal es de un sobre, que se toma de una a tres veces al día, para el estreñimiento.

Impactación fecal

La dosis normal es de ocho sobres al día para la impactación fecal. Los ocho sobres se deben tomar en un período de seis horas. Si padece alguna enfermedad del corazón, no tome más de dos sobres (en 250 ml de agua) en cualquier período de una hora.

Cómo mezclar el producto

Laxido Orange se debe preparar disolviendo los contenidos de un sobre en medio vaso de agua (125 ml). Remover bien hasta disolver todo el polvo. Si está recibiendo tratamiento para la impactación fecal, puede disolver los contenidos de los ocho sobres juntos en un recipiente grande (en un litro de agua).

Duración del tratamiento

Estreñimiento

Por lo general, el ciclo de tratamiento para el estreñimiento no dura más de 2 semanas. Su tratamiento puede durar más de dos semanas si tiene estreñimiento continuo o alguna enfermedad que le provoque estreñimiento (como enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple), o si está tomando regularmente otros medicamentos que puedan causar estreñimiento. En estos casos, su médico podría reducirle la dosis a un sobre una o dos veces al día.

Impactación fecal

Por lo general, el ciclo de tratamiento para la impactación fecal no dura más de 3 días.

Si toma más Laxido Orange del que debe

Es posible que experimente dolor agudo e hinchazón abdominal, vómitos o diarrea. Estos últimos efectos podrían causar una deshidratación. En esos casos, deje de tomar Laxido Orange y beba agua en abundancia. Si tiene alguna duda o preocupación, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad usada.

Si olvidó tomar Laxido Orange

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde y luego siga como antes. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Laxido Orange

Para obtener el máximo beneficio de Laxido Orange, termine siempre el ciclo de tratamiento recomendado por su médico o farmacéutico. Así se asegurará de haber solucionado el estreñimiento. De lo contrario, los síntomas que padece podrían persistir.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 14 días en el caso del estreñimiento crónico o después de 3 días en el caso de la impactación fecal, debe consultar al médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos secundarios, deje de tomar Laxido Orange y consulte a su médico inmediatamente:

- Signos de una reacción alérgica grave, como dificultad para respirar o hinchazón de cara, labios, lengua o garganta
- Signos de alergia, como un exantema, enrojecimiento de la piel, urticaria, picores o dificultad para respirar
- signos de un cambio en los niveles de fluidos o electrolitos de su cuerpo, como hinchazón (principalmente en los tobillos), sensación de cansancio, deshidratación o aumento de la sed

acompañado de dolor de cabeza. Estos síntomas pueden ser indicativos de que las concentraciones de potasio en su sangre son mayores o menores de lo normal

También es posible que se den los siguientes efectos secundarios:

- dolor abdominal
- sensación de hinchazón
- gases
- indigestión
- irritación (dolor, escozor) del ano
- diarrea leve
- náuseas
- vómitos
- hinchazón del abdomen
- ruidos del estómago

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Laxido Orange

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase de cartón y en el sobre. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar los sobres sin abrir, por debajo de 25°C.

No utilice este medicamento si observa que alguno de los sobres está dañado.

La solución de Laxido Orange reconstituido puede taparse y conservarse en nevera (entre 2°C y 8°C) y debe utilizar en un plazo de seis horas. Después de seis horas, hay que desechar toda la solución que no se haya utilizado.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Laxido Orange

Los principios activos son macrogol 3350 (13,125 g), cloruro de sodio (350,7 mg), bicarbonato de sodio (178,5 mg) y cloruro de potasio (46,6 mg). Los demás componentes son acesulfamo de potasio (E950) y aroma de naranja (que contiene maltodextrina y propilenglicol (E1520)).

Aspecto del producto y contenido del envase

Laxido Orange es un polvo blanco que viene envasado en sobres. Tiene sabor y olor a naranja.

Cada sobre contiene 13,8 g de polvo; se envasan en cajas que contienen 2, 8, 10, 20, 30, 50 y 100 sobres. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización

InterGal Pharma Ireland Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co Louth
Irlanda

Responsable de la fabricación

Almac Pharma Services Limited
Almac House
20 Seagoe Industrial Estate
Craigavon
BT63 5QD
Reino Unido

Almac Pharma Services (Ireland) Limited
Finnabair Industrial Estate
Dundalk
Co Louth
A91 P9KD
Irlanda

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido (Irlande del Norte) con los siguientes nombres:

Bélgica, Alemania, España, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido (Irlanda del Norte) - Laxido Orange
Finlandia - Laxido Appelsiini
Portugal - Laxido Laranja
Suecia - Laxido Apelsin
Italia - Laxido

Fecha de la última revisión de este prospecto: Noviembre 2021

Otras fuentes de información

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>