

## PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

### Lycopodium 5CH Glóbulos

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar al médico.
- Si sufre efectos adversos graves o cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **En este prospecto se explica:**

1. Qué es Lycopodium 5CH y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Lycopodium 5CH
3. Cómo tomar Lycopodium 5CH
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Lycopodium 5CH
6. Información adicional

#### **1. Qué es Lycopodium 5CH y para qué se utiliza**

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas.

#### **2. Antes de tomar Lycopodium 5CH**

##### **No tome Lycopodium 5CH**

- si es alérgico (hipersensible) a licopodio (*Lycopodium clavatum*).

##### **Tenga especial cuidado con Lycopodium 5CH**

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

##### **Uso de otros medicamentos**

No se han observado interacciones con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

##### **Uso de Lycopodium 5CH con los alimentos y bebidas**

No se recomienda tomar Lycopodium 5CH junto con las comidas. Se recomienda tomar los glóbulos media hora antes o después de las comidas.

Nota general: La acción de los medicamentos homeopáticos puede verse adversamente afectada por factores de hábitos de vida generalmente negativos así como por la ingesta de estimulantes (tabaco, menta, café, té, etc).

### **Embarazo y lactancia**

Consulte a su médico antes de tomar un medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas**

No son necesarias precauciones especiales.

### **Información importante sobre algunos de los componentes de Lycopodium 5CH:**

Este medicamento contiene sacarosa (azúcar). Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

## **3. Cómo tomar Lycopodium 5CH**

Pregunte a su médico como usar Lycopodium 5CH.

### **Si toma más Lycopodium 5CH del que debiera**

No se esperan efectos adversos en caso de sobredosis.

### **Si olvidó tomar Lycopodium 5CH**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **Si interrumpe el tratamiento con Lycopodium 5CH**

No se esperan efectos adversos si interrumpe la toma de Lycopodium 5CH.

### **Nota general**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Lycopodium 5CH puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

No se conocen efectos adversos hasta la fecha.

Nota: El uso de medicamentos homeopáticos puede temporalmente aumentar los síntomas existentes (agravación inicial). En estos casos interrumpa el tratamiento y consulte a un médico.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

## **5. Conservación de Lycopodium 5CH**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice Lycopodium 5CH después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y la caja.

Período de validez después de la primera apertura: 12 meses.

## **6. Información adicional**

### **Composición de Lycopodium 5CH**

En 10 g de glóbulos se han procesado:  
la sustancia activa Lycopodium (HAB) 5CH 0.1 g,  
el excipiente sacarosa.

### **Aspecto de Lycopodium 5CH y contenido del envase**

Lycopodium 5CH son glóbulos, tamaño 3.

Envase con 10 g de glóbulos

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
Alemania  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

### **Representante local**

D.H.U. Ibérica, S.A.  
Pol. Ind. Francolí, parcela 3, naves 1 y 2  
43006 Tarragona (España)

**Este prospecto ha sido aprobado en 12/2010.**