

Prospecto: información para el usuario

Cadelius D 600 mg/1.000 UI comprimidos bucodispersables carbonato de calcio/colecalciferol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Cadelius D y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cadelius D
3. Cómo tomar Cadelius D
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cadelius D
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Cadelius D y para qué se utiliza

Cadelius D se utiliza para prevenir y tratar el déficit de calcio o vitamina D₃ en personas de edad avanzada y como tratamiento adicional en la osteoporosis en pacientes con riesgo de deficiencia en vitamina D o calcio cuando un suplemento de la dieta de 600 mg/día de calcio y 1.000 UI/día de vitamina D₃ es adecuado.

Cadelius D contiene calcio y vitamina D₃, ambos componentes importantes en la formación del hueso. La vitamina D₃ regula la absorción y el metabolismo del calcio así como la incorporación del calcio en el tejido óseo.

Pregunte a su médico o farmacéutico si tiene dudas y siga siempre sus instrucciones.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de unos días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Cadelius D

No tome Cadelius D

- Si es alérgico al calcio, a la vitamina D o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si padece hipercalcemia (altos niveles de calcio en sangre) o hipercalciuria (altos niveles de calcio en orina).
- Si tiene hipervitaminosis D (altos niveles de vitamina D en sangre).
- Si tiene cálculos (piedras) en los riñones.
- Si padece fallo renal.
- Si es alérgico a la soja o al cacahuete.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Cadelius D

- si padece sarcoidosis (un tipo especial de enfermedad del tejido conectivo que afecta a los pulmones, a la piel y a las articulaciones).
- si está tomando otros medicamentos que contienen vitamina D o calcio.
- si sus riñones no funcionan bien o tiene tendencia a la formación de cálculos (piedras) en el riñón.
- si se encuentra inmovilizado por osteoporosis.

Otros medicamentos y Cadelius D

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

El efecto del tratamiento puede verse afectado si este medicamento se toma simultáneamente con otros medicamentos para:

- la presión arterial alta (diuréticos tiazídicos)
- los problemas cardíacos (glucósidos cardíacos como la digoxina)
- el colesterol alto (colestiramina)
- el estreñimiento (laxantes como la parafina líquida)
- la epilepsia (fenitoínas o barbitúricos)
- las enfermedades inflamatorias/supresión de la inmunidad (corticosteroides)
- la obesidad (orlistat).

Por favor, asegúrese de que su médico conoce si usted está tomando cualquiera de los medicamentos indicados en la lista anterior. Su dosis puede necesitar ser ajustada.

Si toma simultáneamente un medicamento para

- la osteoporosis (bifosfonatos)

debería tomarlo al menos una hora antes de tomar Cadelius D.

Si está tomando simultáneamente medicamentos para

- las infecciones (quinolonas)

debería tomarlos dos horas antes o seis horas después de tomar Cadelius D.

Si toma simultáneamente medicamentos para

- las infecciones (tetraciclinas)

debería tomarlos dos horas antes o seis horas después de tomar Cadelius D.

Si toma simultáneamente medicamentos para

- la caries dental (fluoruro sódico)
- la anemia (hierro)

debería tomar estos medicamentos al menos tres horas antes de tomar Cadelius D.

Si toma simultáneamente medicamentos para

- el hipotiroidismo (levotiroxina)

debería separar la toma de Cadelius D al menos cuatro horas.

Toma de Cadelius D con alimentos, bebidas y alcohol

La absorción del calcio puede ser inhibida por alimentos que contengan ácido oxálico (presente en espinacas y ruibarbo) o ácido fítico (presente en cereales integrales). Debería esperar al menos dos horas antes de tomar Cadelius D si ha tomado alimentos con alto contenido en ácido oxálico o ácido fítico.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Durante el embarazo, la ingesta diaria no debe superar los 1.500 mg de calcio y 600 UI de vitamina D. Por lo tanto, no se recomienda tomar Cadelius D durante el embarazo.

Cadelius D puede ser tomado durante la lactancia. El calcio y la vitamina D₃ pasan a la leche materna. Esto debe tenerse en cuenta cuando la vitamina D se aporta adicionalmente al lactante.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

Cadelius D contiene aspartamo

Este medicamento contiene 8,67 mg de aspartamo en cada comprimido. El aspartamo contiene una fuente de fenilalanina que puede ser perjudicial en caso de padecer fenilcetonuria (FCN), una enfermedad genética rara en la que la fenilalanina se acumula debido a que el organismo no es capaz de eliminarla correctamente.

Cadelius D contiene lactosa y sacarosa.

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Puede perjudicar los dientes.

3. Cómo tomar Cadelius D

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis es establecida por su médico de forma individual.

La dosis recomendada es 1 comprimido al día.

Los comprimidos deben disolverse en la boca. No deben ser tragados enteros.

Los comprimidos deben tomarse preferentemente después de las comidas.

La cantidad de calcio en Cadelius D es menor de la ingesta diaria habitualmente recomendada. Cadelius D, por tanto, está recomendado en pacientes que necesitan un aporte adicional de vitamina D, pero con una ingesta diaria de 500-1.000 mg de calcio al día. La dosis de calcio recomendada para usted, debe ser establecida por su médico.

Uso en niños y adolescentes

Cadelius D no está indicado en niños y adolescentes.

Si toma más Cadelius D del que debe

Si ha tomado más Cadelius D del que debe consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Los síntomas de una sobredosis de Cadelius D pueden incluir pérdida del apetito, sed, emisión anormal de grandes cantidades de orina, náuseas, vómitos y estreñimiento.

Si olvidó tomar Cadelius D

Tómelo en cuanto lo recuerde. Posteriormente, tome la siguiente dosis como habitualmente. Sin embargo, si ya es la hora de su siguiente dosis, omita la dosis olvidada y continúe como habitualmente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Debe dejar de tomar Cadelius D e informar a su médico inmediatamente si experimenta síntomas de reacciones alérgicas graves tales como:

- Hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta
- Dificultad para tragar
- Urticaria y dificultad para respirar

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): hipercalcemia (niveles elevados de calcio en suero) y/o hipercalciuria (niveles elevados de calcio en orina).

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): estreñimiento, flatulencia, náuseas, dolor abdominal, diarrea, prurito, erupción y urticaria.

Efectos adversos con frecuencia desconocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles): reacciones alérgicas graves.

Otras poblaciones especiales

Los pacientes con insuficiencia renal podrían tener un riesgo potencial de hiperfosfatemia, nefrolitiasis y nefrocalcinosis

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Cadelius D

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.


Mantener el envase perfectamente cerrado.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase, después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. Mantener el envase perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad.

La caducidad es de 60 días después de su primera apertura.

No utilice este medicamento si observa cualquier indicio visible de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Cadelius D

- Los principios activos son carbonato de calcio y colecalciferol (vitamina D₃). Cada comprimido contiene 1.500 mg de carbonato de calcio equivalentes a 600 mg de calcio y 1.000 UI de colecalciferol equivalentes a 0,025 mg.
- Los demás componentes son: maltodextrina, aspartamo (E951), hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (E463), lactosa monohidrato, ácido cítrico anhidro (E330), aroma de naranja, ácido esteárico, TODO- α -tocoferol (E307), aceite de soja parcialmente hidrogenado, gelatina, sacarosa, almidón de maíz, dióxido de silicio.

Aspecto del producto y contenido del envase

Cadelius D se presenta en forma de comprimidos bucodispersables de color blanco o casi blanco, circulares, biselados.

Frascos de 30 o 60 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización

ITALFARMACO, S.A.
C/ San Rafael, 3
28108 Alcobendas, Madrid
España

Responsable de la fabricación

ITALFARMACO, S.p.A.
Viale Fulvio Testi 330
20126 Milán
Italia

Pueden solicitar más información de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización

Especialidades Farmacéuticas Centrum, S.A.
C/ Sagitario 14
03006 Alicante
España

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del espacio económico europeo con los siguientes nombres

España	Cadelius D 600 mg/1.000 UI comprimidos bucodispersables
Francia	Cadelius 600 mg/1.000 UI comprimés orodispersibles
Italia	Riliscal 600 mg/1.000 UI compresse orodispersibili
Portugal	Riliscal 600 mg + 1000 UI comprimidos orodispersíveis
Grecia	Cadelius 600 mg + 1000 U.I. δισκία διασπειρόμενα στο στόμα

Fecha de la última revisión de este prospecto: Enero 2022

La información actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es>).