

Prospecto: Información para el usuario.

Laxor 320 mg comprimidos

Rhamnus purshianus D.C.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora, o si no mejora después de 4 días.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Laxor y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Laxor
3. Cómo tomar Laxor
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Laxor

Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Laxor y para qué se utiliza

Medicamento de plantas para el tratamiento de corta duración del estreñimiento ocasional.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 4 días.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Laxor

No tome Laxor

Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

No utilice este medicamento en niños menores de 12 años.

Si padece dolor abdominal de origen desconocido.

En caso de vómitos o diarreas con pérdida importante de líquidos y electrolitos.

En caso de obstrucción intestinal y estenosis, atonía, apendicitis, enfermedades inflamatorias del colon (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Laxor:

- Si está tomando medicamentos como glucósidos cardiacos, medicamentos antiarrítmicos, medicamentos que prolongan el intervalo QT, diuréticos, corticosteroides o raíz de regaliz
- Si padece dolencias gastrointestinales agudas o persistentes sin diagnosticar
- Si padece alguna enfermedad renal

Se debe evitar el uso frecuente de laxantes. Los tratamientos prolongados pueden producir tolerancia (acostumbramiento) a la acción laxante y dependencia (necesidad) de éste para conseguir la evacuación, así como trastornos en el metabolismo hídrico y electrolítico.

Si necesita tomar laxantes con frecuencia, se debe investigar la causa del estreñimiento.

Cuando las preparaciones de cáscara se administran a adultos con incontinencia, las compresas deberían cambiarse con más frecuencia para evitar el contacto de la piel con las heces.

Niños y adolescentes

No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica.

Otros medicamentos y Laxor

Informe a su farmacéutico o médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

El uso prolongado de laxantes puede provocar la disminución de los niveles de potasio, que pueden potenciar la acción de otros medicamentos que se administran para el corazón (antiarrítmicos, diuréticos, corticosteroides y raíz de regaliz).

La acción de este medicamento sobre el tránsito intestinal puede modificar los niveles de otros medicamentos que se toman al mismo tiempo por vía oral.

Toma de Laxor con alimentos, bebidas y alcohol

Los alimentos, bebidas y alcohol no influyen en el efecto del medicamento.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad de conducir y usar máquinas.

3. Cómo tomar Laxor

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 comprimido al día, antes de acostarse con un vaso de agua.

La posología debe adaptarse según necesidad, normalmente es suficiente con tomar este medicamento 2-3 veces a la semana.

Laxor necesita entre 6-12 horas tras su administración para que actúe, por lo que se recomienda tomar por la noche.

Si los síntomas persisten después de 4 días de tratamiento, consulte a su médico o farmacéutico.

Uso en niños y adolescentes

No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica.

Si toma más Laxor del que debe

En caso de sobredosis o ingestión accidental pueden aparecer dolores de tipo cólico y diarrea severa y es necesario reponer los líquidos perdidos. En ancianos o personas que hayan tomado al mismo tiempo

glucósidos cardiacos, diuréticos, corticosteroides o raíz de regaliz, deberán acudir al médico para que se controlen los niveles de potasio.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91.562.04.20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Laxor

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Laxor

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Este medicamento puede producir dolor abdominal, espasmos y deposiciones líquidas, en particular en personas que padecen colon irritable. Sin embargo, estos síntomas en muchos casos se deben a que se ha tomado una dosis mayor de la necesaria, por lo que en estos casos es necesario reducir la dosis.

Tenga en cuenta que el uso prolongado de laxantes o su abuso, puede llevar a desequilibrios que se observarán en un análisis de orina (albuminuria y hematuria). La orina puede aparecer coloreada (amarilla o marrón-rojiza) debido a los compuestos que se eliminan. Esto carece de importancia clínica y desaparecerá cuando cese el tratamiento.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Laxor

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservar en el embalaje original.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de Cad. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si observa indicios visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Laxor

Composición por comprimido:

El principio activo es 320 mg de corteza de *Rhamnus purshianus* DC. (Cáscara sagrada)
(Contenido en glucósidos hidroxiantracénicos expresados como cascarósido A 26,88 mg/comprimido).
Los demás componentes (excipientes) son celulosa microcristalina, estearato de magnesio y croscarmelosa sódica.

Aspecto del producto y contenido del envase

Se presenta en envase de cartón conteniendo 24 comprimidos de 400 mg en blister de PVC/PVDC/AL.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Soria natural S.A.

Polígono La Sacea nº 1.

Garray. (42162). Soria.

Tel: 975252046

Fax: 975252267

e-mail: soria@sorianatural.es

Fecha de la última revisión de este prospecto: Febrero 2019

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>