

**Prospecto: información para el usuario**  
**Solifenacina Accord 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG**  
Solifenacina, succinato

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

**Contenido del prospecto:**

1. Qué es Solifenacina Accord y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Solifenacina Accord
3. Cómo tomar Solifenacina Accord
4. Posibles efectos adversos
- 5 Conservación de Solifenacina Accord
6. Contenido del envase e información adicional

**1. Qué es Solifenacina Accord y para qué se utiliza**

El principio activo de Solifenacina Accord pertenece al grupo de los anticolinérgicos. Estos medicamentos se utilizan para reducir la actividad de la vejiga hiperactiva. Esto le permite que pueda disponer de más tiempo antes de tener que ir al servicio y aumenta la cantidad de orina que su vejiga puede retener.

Solifenacina Accord se utiliza para tratar los síntomas del síndrome vejiga hiperactiva. Estos síntomas incluyen: tener una fuerte y repentina necesidad de orinar sin previo aviso, tener que orinar con frecuencia o tener escapes de orina por no llegar a tiempo al servicio.

**2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Solifenacina Accord**

**No tome Solifenacina Accord**

- si es alérgico a solifenacina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
  - si tiene dificultad para orinar o para vaciar completamente su vejiga (retención urinaria)
  - si tiene una alteración del estómago o del intestino grave (incluyendo megacolon tóxico, una complicación asociada a colitis ulcerosa)
  - si padece una enfermedad muscular llamada miastenia gravis, que puede provocar una extremada debilidad de ciertos músculos
  - si padece presión alta en los ojos, con pérdida gradual de la visión (glaucoma)
  - si está sometido a diálisis renal
  - si tiene una enfermedad hepática grave
  - si padece una enfermedad renal grave o enfermedad hepática moderada y al mismo tiempo está siendo tratado con medicamentos que pueden disminuir la eliminación de Solifenacina Accord del cuerpo (p.ej. ketoconazol). Su médico o farmacéutico le tendrá informado si éste es el caso.
- Antes de iniciar el tratamiento con Solifenacina Accord, informe a su médico si tiene o ha tenido cualquiera de las enfermedades mencionadas anteriormente.

## **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Solifenacina Accord

- si tiene problema para vaciar su vejiga (= obstrucción de la vejiga) o para orinar (p. ej. un flujo de orina débil). El riesgo de acumulación de orina en la vejiga (retención urinaria) es mucho mayor.
- si tiene alguna obstrucción del sistema digestivo (estreñimiento).
- si tiene riesgo aumentado de disminución de la actividad del sistema digestivo (movimientos del estómago y del intestino). Su médico le tendrá informado si este es el caso.
- si padece una enfermedad renal grave.
- si tiene una enfermedad hepática moderada.
- si tiene hernia de hiato o ardor de estómago.
- si tiene un trastorno nervioso (neuropatía autonómica).

## **Niños y adolescentes**

Solifenacina Accord no debe utilizarse en niños ni adolescentes menores de 18 años.

Informe a su médico antes de iniciar el tratamiento con Solifenacina Accord, si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubiera ocurrido alguna vez.

Antes de iniciar el tratamiento con Solifenacina Accord, su médico valorará si hay otras causas en su necesidad de orinar con frecuencia (por ejemplo insuficiencia cardíaca (insuficiente capacidad de bombeo del corazón) o enfermedad renal). Si tiene una infección del tracto urinario, su médico le prescribirá un antibiótico (un tratamiento contra determinadas infecciones bacterianas).

## **Uso de Solifenacina Accord con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando:

- otros medicamentos anticolinérgicos, la actividad y los efectos adversos de ambos medicamentos podrían aumentar.
- colinérgicos ya que pueden reducir el efecto de Solifenacina Accord.
- medicamentos tales como metoclopramida o cisaprida, que hacen que el sistema digestivo trabaje más rápido. Solifenacina Accord puede reducir su efecto.
- medicamentos tales como ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, intraconazol, verapamilo y diltiazem, que disminuyen la velocidad de eliminación de Solifenacina Accord del organismo.
- medicamentos tales como rifampicina, fenitoína y carbamazepina, ya que pueden aumentar la velocidad de eliminación de Solifenacina Accord del organismo.
- medicamentos tales como los bifosfonatos, que pueden provocar o empeorar la inflamación del esófago (esofagitis).

## **Toma de Solifenacina Accord con alimentos y bebidas**

Solifenacina Accord se puede tomar con o sin alimentos, según prefiera.

## **Embarazo, lactancia y fertilidad**

No debe usar Solifenacina Accord si está embarazada a menos que sea absolutamente necesario. No use Solifenacina Accord durante la lactancia ya que solifenacina puede pasar a la leche materna.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

## **Conducción y uso de máquinas**

Solifenacina Accord puede provocar visión borrosa y algunas veces somnolencia o fatiga. Si sufre alguno de estos efectos secundarios, no conduzca ni use máquinas.

## **Solifenacina Accord contiene lactosa**

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia hereditaria a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### 3. Cómo tomar Solifenacina Accord

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis normal es de 5 mg al día, a menos que su médico le indique que tome 10 mg al día.

Debe tragar el comprimido entero con algún líquido. Se puede tomar con o sin alimentos, según su preferencia. No triture los comprimidos.

#### Uso en niños y adolescentes

Solifenacina Accord no debe usarse en niños o adolescentes menores de 18 años.

#### Si toma más Solifenacina Accord del que debe

Si ha tomado demasiado Solifenacina Accord o si un niño ha tomado accidentalmente Solifenacina Accord, póngase en contacto con su médico o farmacéutico inmediatamente, o llame al Servicio de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

Los síntomas en caso de sobredosis pueden incluir: dolor de cabeza, sequedad de boca, mareo, somnolencia y visión borrosa, percepción de cosas que no están (alucinaciones), excitación pronunciada, convulsiones, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia cardiaca (taquicardia), acumulación de orina en la vejiga (retención urinaria), y dilatación de las pupilas (midriasis).

#### Si olvidó tomar Solifenacina Accord

Si olvida tomar una dosis a la hora habitual, tómela en cuanto se acuerde, a menos que sea el momento de tomar la siguiente dosis. Nunca tome más de una dosis al día. Si tiene alguna duda, consulte siempre a su médico o farmacéutico.

#### Si interrumpe el tratamiento con Solifenacina Accord

Si deja de tomar Solifenacina Accord, sus síntomas de vejiga hiperactiva pueden volver o empeorar. Consulte siempre a su médico si está pensando interrumpir el tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, Solifenacina Accord puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si sufre un ataque de alergia o una reacción cutánea grave (por ejemplo formación de ampollas y descamación de la piel), debe informar a su médico o enfermero/a inmediatamente.

Se ha notificado angioedema (alergia en la piel que resulta en la inflamación que se produce en el tejido que está debajo de la superficie de la piel) con obstrucción de vías respiratorias (dificultad para respirar) en algunos pacientes tratados con succinato de solifenacina (Solifenacina Accord). Si aparece angioedema, se debe interrumpir el tratamiento inmediatamente con succinato de solifenacina (Solifenacina Accord) y se debe tomar el tratamiento adecuado y/o las medidas adecuadas.

Solifenacina Accord puede producir los siguientes efectos adversos:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- sequedad de boca

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- visión borrosa
- estreñimiento, náuseas, indigestión con síntomas tales como sensación de pesadez de estómago, dolor abdominal, eructos, náuseas y ardor de estómago (dispepsia), malestar de estómago

Efectos adversos poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- infección del tracto urinario, infección de la vejiga
- somnolencia
- percepción anormal del gusto (disgeusia)
- ojos secos (irritados)
- sequedad de las fosas nasales
- enfermedad de reflujo (reflujo gastroesofágico)
- garganta seca
- piel seca
- dificultad para orinar
- cansancio
- acumulación de líquido en las extremidades inferiores (edema)

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- acumulación de gran cantidad de heces endurecidas en el intestino grueso (impactación fecal)
- acumulación de orina en la vejiga por incapacidad para vaciar la vejiga (retención urinaria)
- mareo, dolor de cabeza
- vómitos
- picor, erupción cutánea

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

- alucinaciones, confusión
- erupción cutánea alérgica.

Frecuencia no conocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- disminución del apetito, altos niveles de potasio en sangre que pueden causar un ritmo del corazón anormal.
- aumento de la presión en los ojos
- cambios en la actividad eléctrica del corazón (ECG), latidos irregulares, palpitaciones, latido del corazón rápido.
- trastorno de la voz
- trastorno del hígado
- debilidad muscular
- trastorno renal

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

[www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Conservación de Solifenacina Accord**

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD.
- La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- No requiere condiciones especiales de conservación. Después de la primera apertura del frasco, los comprimidos pueden conservarse durante 6 meses. Mantener el frasco bien cerrado.

- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Solifenacina Accord

El principio activo es succinato de solifenacina 10 mg.

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de succinato de solifenacina, equivalente a 7,5 mg de solifenacina.

Los demás componentes son:

Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Hipromelosa (3cps) (E464) , Estearato de magnesio (E572)

Cubierta pelicular: Hipromelosa (5cps) (E464), Talco (E553b), Dióxido de titanio (E171), Macrogol 6000 (E1521), Óxido férrico rojo (E172)

### Aspecto del producto y contenido del envase

Solifenacina Accord 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG: Comprimidos recubiertos con película de color rosa claro, redondos, de aproximadamente 7,1 mm de diámetro, biconvexos, marcados con “EG” en una cara y “2” en la otra cara.

Solifenacina Accord está disponible en envases con blísters de PVC/PVdC-Aluminio con tamaños de envase: 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ó 200 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

#### Titular de la autorización de comercialización

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center

Moll de Barcelona, s/n

Edificio Est, 6ª planta

08039 Barcelona

#### Responsable de la fabricación

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Reino Unido

o

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Países bajos

o

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park,  
Paola, PLA 3000  
Malta

o

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,  
ul. Lutomierska 50,  
95-200 Pabianice,  
Polonia

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

País	Nombre medicamento
BG	Солифенацин Акорд 10 mg филмирани таблетки
CY	Solifenacin Accord 10 mg Film-coated Tablets
CZ	Solifenacin Accord 10 mg potahované tablety
LV	Solifenacin Accord 10 mg apvalkotās tabletes
LT	Solifenacin Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės
SL	Solifenacin Accord 10 mg filmsko obložene tablete
DK	Solifenacinsuccinat Accord 10 mg filmovertrukne tabletter
AT	Solifenacin Accord 10 mg Filmtabletten
DE	Solifenacin Accord 10 mg Filmtabletten
FI	Solifenacin Accord 10 mg kalvopäällysteinen tabletti
IE	Solifenacin succinate 10 mg film-coated tablet
IT	Solifenacina Accord
NL	Solifenacinesuccinaat Accord 10 mg, filmomhulde tabletten
NO	Solifenacin Accord
PL	Urosol
SE	Solifenacin Accord 10 mg filmdragerad tabletter
UK	Solifenacin Succinate 10 mg Film-coated Tablets (PL No. PL 20075/0473, PL 20075/0474)
ES	Solifenacina Accord 10 mg comprimidos recubiertos con película
FR	Solifenacin Accord 10 mg comprimé pelliculé

**Fecha de la última revisión de este prospecto:**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>