

## Prospecto: información para el paciente

### Setlona 0,120 mg/0,015 mg cada 24 horas, sistema de liberación vaginal EFG etonogestrel/etinilestradiol

#### **Cosas importantes que debe saber acerca de los anticonceptivos hormonales combinados (AHCs):**

- Son uno de los métodos anticonceptivos reversibles más fiables si se utilizan correctamente.
- Aumentan ligeramente el riesgo de sufrir un coágulo de sangre en las venas y arterias, especialmente en el primer año o cuando se reinicia el uso de un anticonceptivo hormonal combinado tras una pausa de 4 semanas o más.
- Esté alerta y consulte a su médico si cree que puede tener síntomas de un coágulo de sangre (ver sección 2 “Coágulos de sangre”).

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Su medicamento se denomina con el nombre completo anterior, pero durante todo el prospecto se hará referencia a él como Setlona.

#### **Contenido del prospecto**

##### **1. Qué es Setlona y para qué se utiliza**

##### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Setlona**

###### 2.1 Cuándo no debe usar Setlona

###### 2.2 Advertencias y precauciones

Coágulos de sangre

Cáncer

###### 2.3 Niños y adolescentes

###### 2.4 Otros medicamentos y Setlona

Pruebas de laboratorio

###### 2.5 Embarazo y lactancia

###### 2.6 Conducción y uso de máquinas

##### **3. Cómo usar Setlona**

###### 3.1 Forma de ponerse y quitarse Setlona

###### 3.2 Tres semanas dentro, una semana fuera

###### 3.3 Cuándo empezar con el primer anillo

###### 3.4 Qué hacer si...

*Su anillo se expulsa accidentalmente de la vagina*

*Su anillo ha estado fuera de la vagina temporalmente*

*El anillo se rompe*

*Se ha puesto más de un anillo*

*Si olvida ponerse un nuevo anillo después de la pausa sin anillo*

*Si ha olvidado quitarse el anillo*

*Si no aparece el periodo o regla*  
*Si tiene un sangrado inesperado*  
*Si desea cambiar el día en que empieza su periodo o regla*  
*Si desea retrasar su periodo o regla*

3.5 Si desea dejar de usar Setlona

#### **4. Posibles efectos adversos**

#### **5. Conservación de Setlona**

#### **6. Contenido del envase e información adicional**


*Composición de Setlona*

*Aspecto de Setlona y contenido del envase*

*Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación*

### **1. Qué es Setlona y para qué se utiliza**

Setlona es un anillo vaginal anticonceptivo que se utiliza para evitar el embarazo. Cada anillo contiene una pequeña cantidad de dos hormonas sexuales femeninas, etonogestrel y etinilestradiol. El anillo libera lentamente estas hormonas al torrente sanguíneo. Dada la pequeña cantidad de hormonas liberadas, Setlona es un anticonceptivo hormonal de baja dosis. Como Setlona libera dos tipos diferentes de hormonas, es un anticonceptivo hormonal combinado.



Setlona actúa como la píldora anticonceptiva combinada (la “Píldora”), pero en vez de tomar una píldora cada día, el anillo se utiliza durante 3 semanas seguidas. Setlona libera dos hormonas sexuales femeninas que impiden que los ovarios liberen un óvulo. Si no se libera ningún óvulo, no puede quedarse embarazada.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Setlona**

#### **Consideraciones generales**

Antes de empezar a usar Setlona debe leer la información acerca de los coágulos de sangre en la sección 2. Es particularmente importante que lea los síntomas de un coágulo de sangre (ver sección 2 “Coágulos de sangre”).

En este prospecto se describen diversas situaciones en las que debe usted dejar de usar Setlona, o en las que Setlona puede ser menos fiable. En estas situaciones, no debe mantener relaciones sexuales, o debe tomar medidas anticonceptivas adicionales no hormonales, como el preservativo masculino u otro método de barrera. **No** utilice el método del ritmo o el de la temperatura. Puede ser que estos métodos no sean fiables ya que Setlona altera los cambios mensuales de temperatura del cuerpo y el moco cervical.

**Setlona, al igual que otros anticonceptivos hormonales, no protege contra la infección por VIH (SIDA) ni cualquier otra enfermedad de transmisión sexual.**

## 2.1 Cuándo no debe usar Setlona

No debe usar Setlona si tiene alguna de las afecciones enumeradas a continuación. Informe a su médico si tiene alguna de las afecciones enumeradas a continuación. Su médico comentará con usted qué otra forma de anticoncepción sería más adecuada.

- Si tiene (o ha tenido alguna vez) un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP), en los pulmones (embolia pulmonar, EP) o en otros órganos.
- Si sabe que padece un trastorno que afecta a la coagulación de la sangre: por ejemplo, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, deficiencia de antitrombina III, factor V Leiden o anticuerpos antifosfolípidos.
- Si necesita una operación o si pasa mucho tiempo sin ponerse de pie (ver sección “Coágulos de sangre”).
- Si ha sufrido alguna vez un ataque al corazón o un ictus.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) una angina de pecho (una afección que provoca fuerte dolor en el pecho y puede ser el primer signo de un ataque al corazón) o un accidente isquémico transitorio (AIT, síntomas temporales de ictus).
- Si tiene alguna de las siguientes enfermedades que pueden aumentar su riesgo de formación de un coágulo en las arterias:
  - diabetes grave con lesión de los vasos sanguíneos
  - tensión arterial muy alta
  - niveles muy altos de grasa en la sangre (colesterol o triglicéridos)
  - una afección llamada hiperhomocisteinemia.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) un tipo de migraña llamada “migraña con aura”.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) inflamación del páncreas (pancreatitis), asociada a niveles altos de grasas en su sangre.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) una enfermedad grave del hígado y su hígado aún no funciona de forma normal.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez) un tumor benigno o maligno en el hígado.
- Si tiene (o ha tenido alguna vez), o podría tener, un cáncer de mama o de los órganos genitales.
- Si tiene algún sangrado vaginal de origen desconocido.
- Si es alérgica a etinilestradiol o etonogestrel, o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Si cualquiera de estas circunstancias se presenta por primera vez mientras utiliza Setlona, quítese el anillo inmediatamente y consulte a su médico. Mientras tanto, utilice medidas anticonceptivas no hormonales.

No use Setlona si tiene hepatitis C y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir o glecaprevir/pibrentasvir (ver también la sección 2.4 “Otros medicamentos y Setlona”).

## 2.2 Advertencias y precauciones

¿Cuándo debe consultar a su médico?

Busque asistencia médica urgente

- Si nota posibles signos de un coágulo de sangre que pueden significar que está sufriendo un coágulo de sangre en la pierna (es decir, trombosis venosa profunda), un coágulo de sangre en el pulmón (es decir, embolia pulmonar), un ataque al corazón o un ictus (ver sección “Coágulos de sangre” a continuación).

Para obtener una descripción de los síntomas de estos efectos adversos graves, consulte “Cómo reconocer un coágulo de sangre”.

### **Informe a su médico si sufre cualquiera de las siguientes afecciones.**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar Setlona.

Si la afección se desarrolla o empeora mientras está usando Setlona, también debe informar a su médico.

- Si algún familiar directo padece o ha padecido alguna vez cáncer de mama.
- Si sufre epilepsia (ver la sección 2.4. “Otros medicamentos y Setlona”).
- Si tiene una enfermedad del hígado (por ejemplo, ictericia) o de la vesícula (por ejemplo, piedras en la vesícula).
- Si tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad intestinal inflamatoria crónica);
- Si tiene lupus eritematoso sistémico (LES, una enfermedad que afecta su sistema natural de defensa).
- Si tiene síndrome urémico hemolítico (SUH, un trastorno de la coagulación de la sangre que provoca insuficiencia en el riñón).
- Si tiene anemia de células falciformes (una enfermedad hereditaria de los glóbulos rojos).
- Si tiene niveles elevados de grasa en la sangre (hipertrigliceridemia) o antecedentes familiares conocidos de esta afección. La hipertrigliceridemia se ha asociado a un mayor riesgo de padecer pancreatitis (inflamación del páncreas).
- Si necesita una operación o pasa mucho tiempo sin ponerse de pie (ver sección 2 “Coágulos de sangre”).
- Si acaba de dar a luz, corre mayor riesgo de sufrir coágulos de sangre. Debe preguntar a su médico cuándo puede empezar a tomar Setlona tras el parto.
- Si tiene una inflamación de las venas que hay debajo de la piel (tromboflebitis superficial);
- Si tiene varices.
- Si padece alguna enfermedad que apareció por primera vez o empeoró durante un embarazo o uso anterior de hormonas sexuales (por ejemplo, pérdida de oído, porfiria [una enfermedad de la sangre], herpes del embarazo [erupción cutánea con vesículas durante el embarazo], o corea de Sydenham [enfermedad nerviosa en la que se producen movimientos involuntarios]; angioedema hereditario [*vea a su médico inmediatamente si experimenta síntomas de angioedema, como hinchazón de la cara, lengua o garganta, o bien dificultad para tragar, o urticaria junto con dificultad para respirar*]).
- Si tiene o ha tenido alguna vez cloasma (manchas de color amarillento-marrón en la piel, llamadas “manchas del embarazo”, particularmente en la cara); si este es el caso, evite la exposición excesiva al sol o los rayos ultravioleta.
- Si tiene trastornos que hagan difícil el uso de Setlona, por ejemplo, si padece estreñimiento, si tiene un prolapso del cuello uterino o siente dolor durante las relaciones sexuales.
- Si tiene una micción urgente, frecuente, con ardor y/o dolorosa, y no puede localizar el anillo en la vagina. Estos síntomas pueden indicar la colocación accidental de Setlona en la vejiga urinaria.

## **COÁGULOS DE SANGRE**

El uso de un anticonceptivo hormonal combinado como Setlona, aumenta su riesgo de sufrir un coágulo de sangre en comparación con no usarlo. En raras ocasiones, un coágulo de sangre puede bloquear vasos sanguíneos y provocar problemas graves.

Se pueden formar coágulos de sangre:

- En las venas (lo que se llama “trombosis venosa”, “tromboembolismo venoso” o TEV).
- En las arterias (lo que se llama “trombosis arterial”, “tromboembolismo arterial” o TEA).

La recuperación de los coágulos de sangre no es siempre completa. En raras ocasiones, puede haber efectos graves duraderos o, muy raramente, pueden ser mortales.

**Es importante recordar que el riesgo global de un coágulo de sangre perjudicial debido a Setlona es pequeño.**

### CÓMO RECONOCER UN COÁGULO DE SANGRE

Busque asistencia médica urgente si nota alguno de los siguientes signos o síntomas.

¿Experimenta alguno de estos signos?	¿Qué es posible que esté sufriendo?
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hinchazón de una pierna o a lo largo de una vena de la pierna o pie, especialmente cuando va acompañada de:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor o sensibilidad en la pierna, que tal vez se advierta solo al ponerse de pie o caminar.</li> <li>• Aumento de la temperatura en la pierna afectada</li> <li>• Cambio de color de la piel de la pierna, p. ej. si se pone pálida, roja o azul.</li> </ul> </li> </ul>	Trombosis venosa profunda
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de aliento repentina sin causa conocida o respiración rápida;</li> <li>• Tos repentina sin una causa clara, que puede arrastrar sangre;</li> <li>• Dolor en el pecho agudo que puede aumentar al respirar hondo;</li> <li>• Aturdimiento intenso o mareo;</li> <li>• Latidos del corazón acelerados o irregulares;</li> <li>• Dolor de estómago intenso;</li> </ul> <p>Si no está segura, consulte a un médico, ya que algunos de estos síntomas como la tos o la falta de aliento se pueden confundir con una afección más leve como una infección respiratoria (p. ej. un “catarro común”).</p>	Embolia pulmonar
<p>Síntomas que se producen con más frecuencia en un ojo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pérdida inmediata de visión o</li> <li>• Visión borrosa indolora que puede evolucionar hasta pérdida de la visión.</li> </ul>	Trombosis de las venas retinianas (coágulo de sangre en el ojo).
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor, molestias, presión, pesadez en el pecho.</li> <li>• Sensación de opresión o plenitud en el pecho, brazo o debajo del esternón.</li> <li>• Sensación de plenitud, indigestión o ahogo;</li> <li>• Malestar de la parte superior del cuerpo que irradia a la espalda, la mandíbula, la garganta, el brazo y el estómago;</li> <li>• Sudoración, náuseas, vómitos o mareo;</li> <li>• Debilidad extrema, ansiedad o falta de aliento;</li> <li>• Latidos del corazón acelerados o irregulares</li> </ul>	Ataque al corazón
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debilidad o entumecimiento repentino de la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo;</li> <li>• Confusión repentina, dificultad para hablar o para comprender;</li> <li>• Dificultad repentina de visión en un ojo o en ambos;</li> <li>• Dificultad repentina para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación;</li> <li>• Dolor de cabeza repentino, intenso o prolongado sin causa conocida;</li> </ul>	Ictus

<ul style="list-style-type: none"><li>• Pérdida del conocimiento o desmayo, con o sin convulsiones.</li></ul> <p>A veces los síntomas de un ictus pueden ser breves, con una recuperación casi inmediata y completa, pero debe buscar asistencia médica urgente ya que puede correr riesgo de sufrir otro ictus.</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hinchazón y ligera coloración azul de una extremidad.</li><li>• Dolor de estómago intenso (abdomen agudo).</li></ul>	Coágulos de sangre que bloquean otros vasos sanguíneos.

## COÁGULOS DE SANGRE EN UNA VENA

### ¿Qué puede ocurrir si se forma un coágulo de sangre en una vena?

- El uso de anticonceptivos hormonales combinados se ha relacionado con un aumento del riesgo de coágulos de sangre en las venas (trombosis venosa). No obstante, estos efectos adversos son raros. Se producen con más frecuencia en el primer año de uso de un anticonceptivo hormonal combinado.
- Si se forma un coágulo de sangre en una vena de la pierna o del pie, puede provocar trombosis venosa profunda (TVP).
- Si un coágulo de sangre se desplaza desde la pierna y se aloja en el pulmón, puede provocar una embolia pulmonar.
- En muy raras ocasiones se puede formar un coágulo en una vena de otro órgano como el ojo (trombosis de las venas retinianas).

### ¿Cuándo es mayor el riesgo de presentar un coágulo de sangre en una vena?

El riesgo de presentar un coágulo de sangre en una vena es mayor durante el primer año en el que se toma un anticonceptivo hormonal combinado por primera vez. El riesgo puede ser mayor también si vuelve a empezar a tomar un anticonceptivo hormonal combinado (el mismo medicamento o un medicamento diferente) después de una interrupción de 4 semanas o más.

Después del primer año, el riesgo disminuye, pero siempre es algo mayor que si no estuviera tomando un anticonceptivo hormonal combinado.

Cuando deja de utilizar Setlona, su riesgo de presentar un coágulo de sangre regresa a la normalidad en pocas semanas.

### ¿Cuál es el riesgo de presentar un coágulo de sangre?

El riesgo depende de su riesgo natural de TEV y del tipo de anticonceptivo hormonal combinado que esté tomando.

El riesgo global de presentar un coágulo de sangre en la pierna o en el pulmón (TVP o EP) con Setlona es pequeño.

- De cada 10.000 mujeres que no usan un anticonceptivo hormonal combinado y que no están embarazadas, unas 2 presentarán un coágulo de sangre en un año.
- De cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene levonorgestrel, noretisterona o norgestimato, unas 5-7 presentarán un coágulo de sangre en un año.

- De cada 10.000 mujeres que usan un anticonceptivo hormonal combinado que contiene norelgestromina, o etonogestrel como Setlona, entre unas 6 y 12 mujeres presentarán un coágulo de sangre en un año.
- El riesgo de presentar un coágulo de sangre dependerá de sus antecedentes personales (ver “Factores que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre” más adelante).

	<b>Riesgo de presentar un coágulo de sangre en un año</b>
Mujeres que <b>no utilizan</b> un comprimido/parche/anillo hormonal combinado y que no están embarazadas	Unas 2 de cada 10.000 mujeres
Mujeres que utilizan un comprimido anticonceptivo hormonal combinado que contiene <b>levonorgestrel, noretisterona o norgestimato</b>	Unas 5-7 de cada 10.000 mujeres
Mujeres que utilizan Setlona	Unas 6-12 de cada 10.000 mujeres

### **Factores que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre en una vena**

El riesgo de tener un coágulo de sangre con Setlona es pequeño, pero algunas afecciones aumentan el riesgo. Su riesgo es mayor:

- Si tiene exceso de peso (índice de masa corporal o IMC superior a 30 kg/m<sup>2</sup>).
- Si alguno de sus parientes próximos ha tenido un coágulo de sangre en la pierna, pulmón u otro órgano a una edad temprana (por ejemplo, antes de los 50 años aproximadamente). En este caso, podría tener un trastorno hereditario de la coagulación de la sangre.
- Si necesita operarse o si pasa mucho tiempo sin ponerse de pie debido a una lesión o enfermedad o si tiene la pierna escayolada. Tal vez haya que interrumpir el uso de Setlona varias semanas antes de la intervención quirúrgica o mientras tenga menos movilidad. Si necesita interrumpir el uso de Setlona, pregúntele a su médico cuándo puede empezar a usarlo de nuevo.
- Al aumentar la edad (en especial por encima de unos 35 años).
- Si ha dado a luz hace menos de unas semanas.

El riesgo de presentar un coágulo de sangre aumenta cuantas más afecciones tenga.

Los viajes en avión (más de 4 horas) pueden aumentar temporalmente el riesgo de un coágulo de sangre, en especial si tiene alguno de los demás factores de riesgo enumerados.

Es importante informar a su médico si sufre cualquiera de las afecciones anteriores, aunque no esté segura. Su médico puede decidir que hay que interrumpir el uso de Setlona.

Si alguna de las afecciones anteriores cambia mientras está utilizando Setlona, por ejemplo un pariente próximo experimenta una trombosis sin causa conocida o usted aumenta mucho de peso, informe a su médico.

### **COÁGULOS DE SANGRE EN UNA ARTERIA**

#### **¿Qué puede ocurrir si se forma un coágulo de sangre en una arteria?**

Al igual que un coágulo de sangre en una vena, un coágulo en una arteria puede provocar problemas graves. Por ejemplo, puede provocar un ataque al corazón o un ictus.



## **Factores que aumentan su riesgo de un coágulo de sangre en una arteria**

Es importante señalar que el riesgo de un ataque al corazón o un ictus por utilizar Setlona es muy pequeño, pero puede aumentar:

- Con la edad (por encima de unos 35 años).
- **Si fuma.** Cuando utiliza un anticonceptivo hormonal combinado como Setlona, se le aconseja que deje de fumar. Si no es capaz de dejar de fumar y tiene más de 35 años, su médico puede aconsejarle que utilice un tipo de anticonceptivo diferente.
- Si tiene sobrepeso.
- Si tiene la tensión alta.
- Si algún pariente próximo ha sufrido un ataque al corazón o un ictus a una edad temprana (menos de unos 50 años). En este caso usted también podría tener mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón o un ictus.
- Si usted o alguno de sus parientes próximos tiene un nivel elevado de grasa en la sangre (colesterol o triglicéridos).
- Si padece migrañas, especialmente migrañas con aura.
- Si tiene un problema de corazón (trastorno de las válvulas, alteración del ritmo cardíaco llamado fibrilación auricular).
- Si tiene diabetes.

Si tiene más de una de estas afecciones o si alguna de ellas es especialmente grave, el riesgo de presentar un coágulo de sangre puede verse incrementado aún más.

Si alguna de las afecciones anteriores cambia mientras está utilizando Setlona, por ejemplo empieza a fumar, un pariente próximo experimenta una trombosis sin causa conocida o usted aumenta mucho de peso, informe a su médico.

## **Cáncer**

La siguiente información se ha obtenido de estudios con anticonceptivos orales combinados y podría ser aplicable a Setlona. No se dispone de información sobre la administración por vía vaginal de hormonas anticonceptivas (como Setlona).

Se han observado casos de tumores de mama con una frecuencia ligeramente mayor en mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas, pero se desconoce si esto se debe al tratamiento. Por ejemplo, podría ser que se encontraran más tumores en las mujeres que usan píldoras anticonceptivas porque acuden a revisión médica con más frecuencia. Este aumento de frecuencia disminuye gradualmente después de interrumpir el tratamiento.

Es importante examinar sus pechos regularmente e informar a su médico si nota algún bulto. Informe a su médico si algún pariente cercano tiene o ha tenido un cáncer de mama (vea la sección 2.2 “*Advertencias y precauciones*”).

Rara vez se han comunicado casos de tumores de hígado benignos y menos casos aún de tumores de hígado malignos, en mujeres que usan la píldora anticonceptiva. Contacte con su médico si tiene un dolor fuerte y poco común en el abdomen.

En usuarias de la píldora combinada se ha observado que se produce con menos frecuencia cáncer de endometrio (el tejido que recubre el útero) y de ovarios. Esto también podría ser el caso de Setlona, pero no ha sido confirmado.

## **Trastornos psiquiátricos:**

Algunas mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales como {nombre del producto} han notificado



depresión o un estado de ánimo deprimido. La depresión puede ser grave y a veces puede inducir pensamientos suicidas. Si experimenta alteraciones del estado de ánimo y síntomas depresivos, póngase en contacto con su médico para obtener asesoramiento médico adicional lo antes posible.

### 2.3 Niños y adolescentes

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Setlona en adolescentes menores de 18 años.

### 2.4 Otros medicamentos y Setlona

Informe siempre a su médico sobre qué medicamentos o plantas medicinales está tomando. Informe también a cualquier médico o dentista (o farmacéutico) acerca de que está utilizando Setlona. Ellos le podrán informar si necesita tomar alguna medida anticonceptiva complementaria (por ejemplo, preservativo masculino) y, si fuera necesario, durante cuánto tiempo, o bien si debe modificar el uso del otro medicamento.

Algunos medicamentos

- pueden tener una influencia en los niveles de Setlona en sangre.
- pueden hacer que sea **menos efectivo en la prevención del embarazo**.
- pueden causar sangrados inesperados.

Estos incluyen los medicamentos utilizados para el tratamiento de:

- La epilepsia (por ejemplo, primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato).
- Tuberculosis (por ejemplo, rifampicina).
- Infección por VIH (por ejemplo, ritonavir, nelfinavir, nevirapina, efavirenz).
- Infección por el virus de la Hepatitis C (por ejemplo, boceprevir, telaprevir).
- Otras enfermedades infecciosas (por ejemplo, griseofulvina).
- La presión alta en los vasos sanguíneos de los pulmones (bosentán).
- Estados de ánimo depresivos (la planta medicinal Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)).

Si está tomando medicamentos o plantas medicinales que podrían hacer menos eficaz a Setlona, debe utilizar también un método anticonceptivo de barrera. Dado que el efecto de otro medicamento sobre Setlona puede durar hasta 28 días después de suspender el medicamento, durante ese tiempo es necesario utilizar un método anticonceptivo de barrera adicional.

Nota: no use Setlona junto con un diafragma, capuchón cervical o preservativo femenino.

Setlona puede influir sobre el efecto de otros medicamentos, por ejemplo:

- medicamentos que contienen ciclosporina.
- el antiepiléptico lamotrigina (esto podría conllevar un aumento de la frecuencia de las convulsiones).

No use Setlona si tiene Hepatitis C y está tomando medicamentos que contienen ombitasvir/paritaprevir/ritonavir y dasabuvir o glecaprevir/pibrentasvir ; se pueden producir aumentos en los resultados de pruebas hepáticas (aumento de la enzima hepática ALT).

Su médico le prescribirá otro tipo de anticonceptivo antes de comenzar el tratamiento con estos medicamentos.

Setlona se puede volver a usar aproximadamente 2 semanas después de la finalización de este tratamiento.

Consulte la sección 2.1 “Cuando no debe usar Setlona”.

*Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.*

Se pueden usar tampones mientras utiliza Setlona. Póngase primero Setlona y luego el tampón. Tenga especial cuidado al quitarse el tampón para que el anillo no sea expulsado accidentalmente. En caso de que se expulse, simplemente lave el anillo con agua fría o tibia y vuelva a ponérselo inmediatamente.

El uso de espermicidas o productos para los hongos vaginales no reduce la eficacia anticonceptiva de Setlona.

### **Pruebas de laboratorio**

Si le hacen análisis de sangre u orina, informe a su médico de que usa Setlona, ya que puede afectar al resultado de algunos análisis.

### **2.5 Embarazo y lactancia**

No deben utilizar Setlona mujeres embarazadas o que sospechen que pueden estarlo. Si se queda embarazada mientras usa Setlona deberá quitarse el anillo y consultar a su médico.

Si quiere interrumpir el uso de Setlona porque quiere quedarse embarazada, vea la sección 3.5 “*Si desea dejar de usar Setlona*”.

En general no se recomienda utilizar Setlona durante la lactancia. Si desea usar Setlona mientras da el pecho, consulte a su médico.

### **2.6 Conducción y uso de máquinas**

No es probable que Setlona afecte su capacidad de conducir o utilizar máquinas.

## **3. Cómo usar Setlona**

Puede colocarse y quitarse Setlona usted misma. Su médico le indicará en qué momento empezar a utilizarlo por primera vez. El anillo vaginal debe insertarse en el día correcto de su ciclo mensual (ver sección 3.3 “Cuándo empezar con el primer anillo”) y permanecer en la vagina durante 3 semanas seguidas. Compruebe regularmente si Setlona está todavía en su vagina (por ejemplo, antes y después de tener relaciones sexuales) para asegurar que está protegida frente a un embarazo. Después de la tercera semana, quítese Setlona y deje pasar una semana de descanso. Normalmente tendrá su periodo o regla durante esta pausa sin anillo.

Mientras esté usando Setlona, no debe usar algunos métodos anticonceptivos de barrera femeninos, tales como el diafragma vaginal, el capuchón cervical o el preservativo femenino. Estos métodos anticonceptivos de barrera no deben utilizarse como método de refuerzo de control de la natalidad ya que Setlona puede interferir con la colocación y posición correctas del diafragma, del capuchón cervical o del preservativo femenino. Sin embargo, puede utilizar un condón masculino como método anticonceptivo de barrera adicional.

### **3.1 Forma de ponerse y quitarse Setlona**

1. Antes de ponerse el anillo, compruebe que no esté caducado (ver sección 5 “Conservación de Setlona”).
2. Lávese las manos antes de ponerse o quitarse el anillo.
3. Escoja la postura que sea más cómoda para usted para insertárselo, por ejemplo, de pie con una pierna levantada hacia arriba, en cuclillas o tumbada.
4. Retire Setlona de su sobre. Guarde el sobre para usarlo más adelante.
5. Sujete el anillo entre los dedos índice y pulgar, presione los lados opuestos e introduzca el anillo en la vagina (ver figuras 1-4).

Cuando Setlona esté en su sitio, no debe notar nada. Si se siente incómoda, empuje suavemente Setlona al interior de la vagina. La posición exacta del anillo en el interior de la vagina no es importante.

6. Pasadas 3 semanas, quítese Setlona de la vagina. Puede hacerlo enganchando el anillo con el dedo índice o sujetando con los dedos y estirando hacia fuera (ver figura 5). En caso de que no pueda quitarse el anillo a pesar de haberlo localizado, contacte con su médico.
7. Elimine el anillo usado con la basura normal de la casa, preferiblemente en su sobre. No tire Setlona al inodoro.



Figura 1  
Retire Setlona de su sobre



Figura 2  
Presione el anillo




Figura 3

Escoja una posición cómoda para ponerse el anillo



Figura 4A

Figura 4B

Figura 4C

Póngase el anillo en la vagina con una mano (Figura 4A), si es necesario, separe los labios de la vagina con la otra. Empuje el anillo al interior de la vagina hasta que lo sienta cómodo (Figura 4B). Deje el anillo en la vagina durante 3 semanas (Figura 4C).



Figura 5:

Setlona puede retirarse enganchando el anillo con el dedo índice o sujetando entre el índice y el dedo medio y estirando hacia fuera.

### 3.2 Tres semanas dentro, una semana fuera

1. El anillo vaginal debe permanecer en la vagina desde el día en que se lo pone durante 3 semanas seguidas, **ininterrumpidamente**.
2. Al cabo de 3 semanas, quítese el anillo el mismo día de la semana que se lo puso y a la misma hora aproximadamente. Por ejemplo, si puso Setlona un miércoles aproximadamente a las 22.00 h, debe quitárselo 3 semanas más tarde, en miércoles, aproximadamente a las 22.00 h.
3. Una vez que se haya quitado el anillo, no lo use durante una semana. Durante esta semana debe producirse un sangrado vaginal. Normalmente empieza 2-3 días después de quitarse el Setlona.
4. Póngase un nuevo anillo exactamente después del intervalo de 1 semana (de nuevo el mismo día de la semana y aproximadamente a la misma hora), incluso si aún no ha dejado de sangrar.

Si se pone el nuevo anillo con más de 3 horas de retraso, la eficacia anticonceptiva puede reducirse. Siga las instrucciones de la sección 3.4 “*Qué hacer si olvida ponerse un nuevo anillo después de la pausa sin anillo*”.

Si usa Setlona como se ha descrito más arriba, su sangrado vaginal tendrá lugar aproximadamente los mismos días cada mes.

### 3.3 Cuándo empezar con el primer anillo

- *Si no ha usado anticoncepción hormonal en el mes anterior*

Póngase Setlona el primer día de su ciclo natural (es decir, el primer día de su menstruación). Setlona empieza a actuar enseguida. No necesita tomar otras medidas anticonceptivas.

También se puede empezar con Setlona entre el día 2 y el 5 de su ciclo, pero en caso de que tenga relaciones sexuales durante los primeros 7 días de uso de Setlona, asegúrese de utilizar un método anticonceptivo complementario (preservativo masculino). Solo debe seguir esta recomendación cuando use Setlona por primera vez.

- *Si usaba una píldora combinada durante el mes anterior*

Empiece a usar Setlona como tarde al día siguiente después de la pausa con su píldora actual. Si el envase de su píldora también contiene comprimidos placebo, empiece Setlona como tarde al día siguiente del último comprimido placebo. Si no está segura de qué comprimido es, consúltelo con su médico o su farmacéutico. No alargue nunca los días de descanso de su píldora actual más allá de lo recomendado. Si ha tomado su píldora actual de forma continuada y correcta y está segura de que no está embarazada, también puede dejar de tomar la píldora cualquier día de su ciclo actual y empezar con Setlona inmediatamente.

- *Si usaba un parche transdérmico durante el mes anterior*

Empiece a usar Setlona como tarde al día siguiente después de la pausa sin parche. No alargue los días de descanso sin parche más allá de lo recomendado. Si ha utilizado el parche de forma continuada y correcta, y está segura de que no está embarazada, también puede dejar el parche cualquier día y empezar con Setlona inmediatamente.

- *Si usaba una píldora con progestágeno solo durante el mes anterior*

Puede dejar de tomar su píldora con progestágeno solo cualquier día y empezar Setlona al día siguiente a la misma hora a la que normalmente hubiera tomado su píldora. Pero asegúrese de que también usa un método anticonceptivo complementario (como un preservativo masculino) durante los primeros 7 días de usar el anillo.

- *Si usaba un inyectable, un implante o un Sistema de Liberación Intrauterino [SLI] con carga hormonal (progestágeno) durante el mes anterior.*

Empiece a usar Setlona en el momento en que debería recibir la siguiente inyección o el día que le extraigan el implante o el SLI. Pero asegúrese de utilizar un método anticonceptivo complementario (como un preservativo masculino) durante los primeros 7 días de usar el anillo.

- *Después del parto*

Si acaba de tener un niño, su médico le puede aconsejar que espere hasta que aparezca su primera regla normal antes de empezar con Setlona. A veces es posible empezar antes, su médico le aconsejará cómo hacerlo. Si está dando el pecho y desea utilizar Setlona, debe consultarlo primero con su médico.

- *Después de un aborto*

Consulte a su médico.

### 3.4 Qué hacer si...

#### Su anillo se expulsa accidentalmente de la vagina

Setlona puede expulsarse accidentalmente fuera de la vagina, por ejemplo, si no se lo ha insertado adecuadamente, al quitarse un tampón, durante las relaciones sexuales, si tiene estreñimiento o si tiene prolapsos uterino. Por ello, debe comprobar regularmente si el anillo está en su vagina (por ejemplo, antes y después de tener relaciones sexuales).

Si el anillo se ha expulsado y no han pasado 3 horas, todavía le protegerá del embarazo. Puede lavar el anillo con agua fría o tibia (no utilice agua caliente) y volvérselo a poner. Si se ha expulsado el anillo y pasan más de 3 horas, podría no protegerla del embarazo, ver recomendación en la sección 3.4 “*Qué hacer si ... su anillo ha estado fuera de la vagina temporalmente*”.

#### Su anillo ha estado fuera de la vagina temporalmente

En la vagina, Setlona libera lentamente hormonas al cuerpo para evitar el embarazo. Si el anillo ha estado fuera de la vagina durante más de 3 horas, podría no protegerla del embarazo. Por tanto, el anillo no puede estar fuera de la vagina durante más de 3 horas en un periodo de veinticuatro horas.

- En caso de que el anillo haya estado fuera de la vagina y hayan pasado **menos de 3 horas**, todavía la protegerá del embarazo. Debe ponerse el anillo tan pronto como sea posible, siempre dentro de las 3 horas.
- En caso de que el anillo esté fuera de la vagina o sospeche que haya estado fuera de la vagina durante **más de 3 horas en la 1ª o 2ª semana**, podría no protegerla del embarazo. Póngase el anillo tan pronto como lo recuerde y déjelo en la vagina durante al menos 7 días seguidos. Use un preservativo masculino si mantiene relaciones sexuales durante esos 7 días. Si está en la primera semana, y ha mantenido relaciones sexuales en los 7 días anteriores, existe la posibilidad de que esté embarazada. En ese caso, consulte a su médico.
- Si el anillo ha estado fuera de la vagina o se sospecha que ha estado fuera de la vagina durante **más de 3 horas en la 3ª semana**, podría no protegerla del embarazo. Debe quitarse el anillo y escoger una de las dos opciones siguientes:

1 - Póngase un nuevo anillo inmediatamente.

Al ponerse un nuevo anillo iniciará un nuevo ciclo de uso de tres semanas y puede ser que no aparezca el periodo. Sin embargo, puede producirse sangrado intermenstrual o manchado durante ese ciclo.

2 - No se ponga un nuevo anillo. Deje pasar el periodo menstrual y póngase un nuevo anillo no más tarde de 7 días desde el momento en que el anillo anterior se quitó o se expulsó.

Escoja esta opción solo si ha utilizado Setlona de forma seguida durante los 7 días anteriores.

Si Setlona ha estado fuera de la vagina por un tiempo desconocido, puede que no esté protegida frente a un embarazo. Hágase un test de embarazo y consulte a su médico antes de ponerse un nuevo anillo.

#### El anillo se rompe

Es poco común que el anillo de Setlona se rompa. Se ha notificado lesión vaginal relacionada con la rotura del anillo. Si nota que Setlona se ha roto, quítese el anillo y póngase uno nuevo tan pronto como sea posible. Tome precauciones anticonceptivas complementarias (por ejemplo un preservativo masculino) durante los 7 días siguientes. Si ha tenido relaciones sexuales antes de notar que el anillo se había roto, consulte con su médico.

#### Se ha puesto más de un anillo

No hay informes de daños graves debido a sobredosis de las hormonas de Setlona. Si accidentalmente se ha puesto más de un anillo, puede sentirse mal (náuseas), vomitar o tener un sangrado vaginal. Quítese el anillo de más y contacte con su médico si estos síntomas no desaparecen.

También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad utilizada.

### **Si olvida ponerse un nuevo anillo después de la pausa sin anillo**

Si su **pausa sin anillo ha durado más de 7 días**, póngase un nuevo anillo en la vagina tan pronto como lo recuerde. Tome medidas anticonceptivas adicionales (como el preservativo masculino) si mantiene relaciones sexuales durante los siguientes 7 días. **Si ha tenido relaciones sexuales en esta pausa sin anillo, existe la posibilidad de que se haya quedado embarazada.** En tal caso, informe a su médico inmediatamente. Cuanto más larga sea la pausa sin anillo, mayor es el riesgo de quedarse embarazada.

### **Si ha olvidado quitarse el anillo**

- Si el anillo ha estado en la vagina **entre 3 y 4 semanas**, todavía la protegerá del embarazo. Deje pasar la semana sin anillo y después póngase uno nuevo.
- Si el anillo ha estado en la vagina durante **más de 4 semanas**, existe la posibilidad de embarazo. Contacte con su médico antes de empezar con un nuevo anillo.

### **Si no aparece el periodo o regla**

#### **• Ha usado Setlona según las instrucciones**

Si no aparece el periodo, pero ha usado Setlona según las instrucciones y no ha tomado otros medicamentos, es muy improbable que esté embarazada. Continúe usando Setlona de la forma habitual. Sin embargo, si tiene dos faltas seguidas, puede estar embarazada, por lo que debe comunicárselo a su médico inmediatamente. No se ponga el siguiente Setlona hasta que su médico haya comprobado que no está embarazada.

#### **• Si se ha desviado de las recomendaciones de uso de Setlona**

Si no se presenta su sangrado habitual en la pausa de una semana sin anillo y se ha desviado del régimen recomendado, existe la posibilidad de que pueda estar embarazada, por lo que deberá contactar con su médico antes de ponerse un nuevo Setlona.

### **Si tiene un sangrado inesperado**

En algunas mujeres, durante el uso de Setlona puede aparecer un sangrado vaginal inesperado entre sus periodos menstruales. Puede necesitar protección higiénica. De todas formas, continúe utilizando el anillo de la forma normal, no se lo quite. Si el sangrado continúa, se hace más intenso o empieza de nuevo, consulte a su médico.

### **Si desea cambiar el día en que empieza su periodo o regla**

Si usa Setlona según las instrucciones, su periodo menstrual (sangrado por privación) empezará en la semana de pausa sin anillo. Si quiere cambiar el día que empieza, tiene que acortar (¡nunca alargar!) la pausa sin anillo.

Por ejemplo, si su periodo suele empezar un viernes, puede cambiarlo a un martes, es decir, 3 días antes a partir del mes siguiente. Simplemente, póngase el siguiente anillo tres días antes del día habitual.

Si la pausa se hace muy corta (por ejemplo 3 días o menos), puede ser que no tenga su sangrado habitual. Puede tener un manchado (gotas o manchas de sangre) o sangrado intermenstrual durante el uso del siguiente anillo.

*Si no está segura de cómo hacerlo, consulte a su médico*

### **Si desea retrasar su periodo o regla**



Aunque no es el régimen recomendado, puede retrasar su periodo menstrual (sangrado por privación) poniéndose un nuevo anillo inmediatamente después de quitarse el anillo actual, sin dejar la pausa entre anillos. Puede dejarse puesto el nuevo anillo durante 3 semanas como máximo. Durante el uso del nuevo anillo, puede experimentar manchado (gotas o manchas de sangre) o sangrado irregular. Cuando desee que empiece su periodo, simplemente quítese el anillo. Deje la pausa normal de una semana sin anillo y póngase después un anillo nuevo.

*Puede consultar a su médico antes de decidir retrasar su periodo menstrual.*

### **3.5 Si desea dejar de usar Setlona**

Puede dejar de utilizar Setlona en cualquier momento que lo desee.

Si no desea quedar embarazada, consulte a su médico sobre otros métodos anticonceptivos.

Si deja de utilizar Setlona porque desea quedarse embarazada, se recomienda esperar hasta que haya tenido su primera regla natural antes de intentar concebir. Esto le ayudará a calcular la fecha del parto.

### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Si sufre cualquier efecto adverso, especialmente si es grave o persistente, o tiene algún cambio de salud que cree que puede deberse a Setlona, consulte a su médico.

Todas las mujeres que toman anticonceptivos hormonales combinados corren mayor riesgo de presentar coágulos de sangre en las venas (tromboembolismo venoso (TEV)) o coágulos de sangre en las arterias (tromboembolismo arterial (TEA)). Para obtener información más detallada sobre los diferentes riesgos de tomar anticonceptivos hormonales combinados, ver sección 2 “Qué necesita saber antes de empezar a usar Setlona”.

**Si nota alguno de los siguientes efectos adversos, puede que necesite atención médica urgente. Deje de usar Setlona y contacte inmediatamente con su médico.**

#### Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Si es alérgica a alguno de los componentes de Setlona (hipersensibilidad), puede tener los siguientes síntomas: angioedema [hinchazón de la cara, lengua y/o garganta y/o dificultad para tragar] o urticaria, junto con dificultades para respirar. Si esto ocurre, quítese Setlona y contacte con su médico inmediatamente.

Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 mujeres

- coágulos de sangre perjudiciales en una vena o arteria, por ejemplo:
  - en una pierna o pie (es decir, TVP)
  - en un pulmón (es decir, EP)
  - ataque al corazón
  - ictus
  - ictus leve o síntomas temporales similares a los de un ictus, lo que se llama accidente isquémico transitorio (AIT)
  - coágulos de sangre en el hígado, estómago/intestino, riñones u ojo

Las posibilidades de tener un coágulo de sangre pueden ser mayores si tiene cualquier otra afección que aumente este riesgo (ver sección 2 para obtener más información sobre las afecciones que aumentan el riesgo de padecer coágulos de sangre y los síntomas de un coágulo de sangre).

- secreción mamaria

Usuaris del anillo que contiene etonogestrel/etinilestradiol han informado de los siguientes efectos adversos:

Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 mujeres

- dolor abdominal, malestar (náuseas)
- infección de la vagina por levaduras (parecido a candidiasis oral), molestias vaginales debidas al anillo, picor genital, flujo vaginal
- dolor de cabeza o migraña, humor depresivo, menos deseo sexual
- dolor en las mamas, dolor en la pelvis, menstruación dolorosa
- acné
- aumento de peso
- expulsión del anillo

Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 mujeres

- alteraciones de la vista, mareos
- abdomen hinchado, vómitos, diarreas o estreñimiento
- sensación de estar cansada, molesta o irritable, cambios de humor, cambios en el estado de ánimo
- retención de líquidos en el cuerpo (edema)
- infección de orina o de la vejiga
- dificultad o dolor al orinar; urgencia de orinar; necesidad de orinar más frecuente
- problemas en las relaciones sexuales como dolor, sangrado o que la pareja note el anillo
- aumento de la presión sanguínea
- aumento del apetito
- dolor de espalda, calambres en los músculos, dolor en las piernas o brazos
- menos sensibilidad en la piel
- tensión o dolor en las mamas o aumento de tamaño; enfermedad fibroquística de la mama (quistes en las mamas que pueden llegar a hincharse o doler)
- inflamación del cuello del útero, pólipos que crecen en el cuello del útero, desplazamiento hacia la parte exterior de tejido del interior del cuello del útero (ectropión)
- cambios en el periodo menstrual (por ejemplo, periodos más intensos, largos, irregulares o desaparición del periodo), molestias en la pelvis, síndrome premenstrual, calambres uterinos
- infección vaginal (por hongos o bacterias), quemazón, olor, dolor, molestias o sequedad de la vagina o vulva
- pérdida de pelo, eczema, picor, erupción o sofocos
- urticaria.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- cloasma (manchas de color amarillento-marrón en la piel, particularmente en la cara)
- molestias en el pene de la pareja (irritación, erupción, picor)
- incapacidad para quitarse el anillo sin asistencia médica (por ejemplo, debido a su adherencia a la pared vaginal)
- lesión vaginal relacionada con la rotura del anillo.

Se han notificado casos de cáncer de mama y tumores en el hígado en mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales combinados. Para más información ver la sección 2.2 *Advertencias y precauciones, Cáncer*.

En muy raras ocasiones el anillo se puede romper. Para más información, ver sección 3.4 *Que hacer si...El anillo se rompe*.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través

del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Setlona

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Si descubre que un niño se ha expuesto a las hormonas de Setlona, pida consejo a su médico.


Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Este medicamento debe ser utilizado al menos un mes antes de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en cada sobre después de CAD o EXP. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes que se indica.

No utilice Setlona si observa cambios en el color del anillo o cualquier signo visible de deterioro.

Este medicamento puede suponer un riesgo para el medio ambiente. Después de retirarlo, debe colocar Setlona en el sobre y cerrarlo adecuadamente. La eliminación del sobre debe realizarse con los residuos domésticos o debe devolverse a la farmacia para su correcta destrucción de acuerdo con la normativa local.

Este medicamento no se debe tirar por el inodoro. Al igual que con otros medicamentos, no tire los anillos no utilizados o caducados por el desagüe ni a la basura.

Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Setlona

- Los principios activos son etonogestrel y etinilestradiol. Setlona contiene 11,0 mg etonogestrel y 3,474 mg etinilestradiol. El anillo libera etonogestrel y etinilestradiol en una proporción de 0,120 mg y 0,015 mg, respectivamente cada 24 horas, durante tres semanas.
- Los demás componentes son: copolímero de acetato de vinilo-etileno, 28% acetato de vinilo y poliuretano (un tipo de plástico que no se disuelve en el cuerpo).

### Aspecto de Setlona y contenido del envase

Sistema de liberación vaginal.

Setlona es un anillo flexible, transparente, de incoloro a casi incoloro, con un diámetro exterior de 54 mm y un diámetro de sección de 4 mm.

Cada anillo se envasa en un sobre de aluminio. El sobre se presenta en una caja de cartón junto con este prospecto y adhesivos para su calendario que le pueden ayudar a recordar cuando ponerse y quitarse el anillo.

Cada caja contiene:

- 1 anillo.
- 3 anillos.

6 anillos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

#### **Titular de la autorización de comercialización**

Mylan Pharmaceuticals, S.L.  
C/ Plom, 2-4, 5ª planta  
08038 – Barcelona  
España

#### **Responsable de la fabricación**

Laboratorios León Farma S.A.  
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera  
24008- León  
España

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con el siguiente nombre:**

Alemania:	SetLona 0.120 / 0.015 mg pro 24 Stunden , vaginales Wirkstofffreisetzungssystem
Austria:	SetLona 0,120 mg/0,015 mg pro 24 Stunden vaginales Wirkstofffreisetzungssystem
Bélgica:	Ringafema 0,120 mg / 0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal 0,120 mg / 0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik 0,120 mg / 0,015 mg pro 24 Stunden, Vaginales Wirkstofffreisetzungssystem
Eslovenia:	Setlona 0,120 mg / 0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistema
España:	Setlona 0,120 mg/0,015 mg cada 24 horas, sistema de liberación vaginal EFG
Estonia:	Setlona
Finlandia:	Mylvona 0,120 mg / 0,015 mg per 24 tuntia, depotlääkevalmiste, emättimeen
Francia:	ETONOGESTREL / ETHINYLESTRADIOL MYLAN 120 microgrammes / 15 microgrammes / 24 heures, système de diffusion vaginal
Islandia:	Vonamyl 0,120 mg/0,015 mg/24 klst. skeiðarinnlegg
Italia:	MYPRIMOSE
Letonia:	SetLona 120/15 mikrogrami/24 stundās vaginālās ievadīšanas sistema
Liechtenstein:	SetLona 0.120 / 0.015 mg per 24 hours, vaginal delivery system
Lituania:	Ringafema 120 / 15 mikrogramų/24 valandas vartojimo į makštį sistema
Luxemburgo:	Ringafema 0,120 mg / 0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal
Países bajos:	Etonogestrel/Ethinylestradiol Mylan 0,120 mg/ 0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik
Polonia:	Contraseton
Portugal:	Mystrelle 0,120 mg + 0,015 mg por 24 horas, sistema de libertação vaginal
Suecia:	Vonamyl 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar, vaginalinlägg

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** septiembre 2021.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>