

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Eslicarbazepina Normon 400 mg comprimidos EFG** eslicarbazepina acetato

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Eslicarbazepina Normon y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Eslicarbazepina Normon
3. Cómo tomar Eslicarbazepina Normon
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Eslicarbazepina Normon
6. Contenido del envase e información adicional

### **1. Qué es Eslicarbazepina Normon y para qué se utiliza**

Eslicarbazepina Normon contiene el principio activo eslicarbazepina acetato.

Eslicarbazepina pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiepilépticos, utilizados para tratar la epilepsia, una enfermedad donde la persona afectada tiene convulsiones o crisis convulsivas repetidas.

Eslicarbazepina se utiliza:

- Como único medicamento (monoterapia) en pacientes adultos con epilepsia recién diagnosticada.
- Junto con otros medicamentos antiepilépticos (terapia adyuvante) en pacientes adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años que sufren ataques epilépticos (convulsiones) que afectan a una parte del cerebro (convulsiones parciales). Estas convulsiones pueden estar seguidos o no de una convulsión que afecte a la totalidad del cerebro (generalización secundaria).

Su médico le ha indicado eslicarbazepina para reducir el número de convulsiones.

### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Eslicarbazepina Normon**

#### **No tome Eslicarbazepina Normon:**

- Si es alérgico a eslicarbazepina acetato, a otros derivados de carboxamida (por ejemplo carbamazepina u oxcarbazepina, medicamentos utilizados para el tratamiento de la epilepsia), o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si sufre un tipo determinado de trastorno del ritmo cardíaco (bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo o tercer grado).

## Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento.

Informe a su médico de inmediato:

- Si presenta ampollas o descamación de la piel y/o membranas mucosas, erupción, problemas para tragar o para respirar, hinchazón en los labios, rostro, párpados, garganta o lengua. Estos podrían ser signos de una reacción alérgica.
- Si sufre confusión, empeoramiento de las convulsiones o disminución de la conciencia, que podrían ser signos de niveles sanguíneos bajos de sales.

Informe a su médico:

- Si tiene problemas renales. Es posible que su médico deba ajustar la dosis. Eslicarbazepina no se recomienda en pacientes con enfermedad renal grave.
- Si tiene problemas hepáticos. Eslicarbazepina no se recomienda en pacientes con problemas hepáticos graves.
- Si usa cualquier medicamento que pueda provocar una anomalía en el ECG (electrocardiograma) denominada aumento del intervalo PR. Si no está seguro de que los medicamentos que está utilizando puedan provocar este efecto, coméntelo con su médico.
- Si sufre alguna enfermedad del corazón como insuficiencia cardíaca o ataque cardíaco, o tiene cualquier alteración del ritmo cardíaco.
- Si sufre convulsiones que comienzan con una descarga eléctrica extendida que afecta a ambos lados del cerebro.

Un pequeño número de personas en tratamiento con antiepilépticos han tenido pensamientos de autolesión o suicidas. Si esto le ocurre mientras toma eslicarbazepina, comuníquese de inmediato con su médico.

Eslicarbazepina puede hacer que se sienta mareado y/o aturdido, particularmente al inicio del tratamiento. Tenga especial cuidado mientras esté tomando eslicarbazepina a fin de evitar lesiones accidentales, tales como caídas.

Tenga especial cuidado con eslicarbazepina

En la experiencia poscomercialización, en pacientes tratados con eslicarbazepina, se han comunicado reacciones cutáneas graves y que potencialmente pueden ser mortales, incluyendo Síndrome de Stevens Johnson / necrólisis epidérmica tóxica, reacción al medicamento con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS).

Si desarrolla una erupción grave u otro síntoma cutáneo (ver sección 4), deje de tomar eslicarbazepina y consulte a su médico o busque atención médica inmediatamente.

En pacientes de origen Thai y del grupo étnico chino Han el riesgo de reacciones graves en la piel, asociado a carbamazepina o compuestos químicamente relacionados, se puede predecir mediante una analítica sanguínea de estos pacientes. Su médico le podrá aconsejar sobre la necesidad de dicho análisis de sangre antes de tomar eslicarbazepina.

## Niños

Eslicarbazepina no debe administrarse a niños de 6 años o menores.

## Otros medicamentos y Eslicarbazepina Normon

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Esta recomendación es para el caso de que alguno de ellos interfiera con el modo en que actúa eslicarbazepina, o de que eslicarbazepina interfiera con el efecto de tales medicamentos. Informe a su médico si está tomando:

- Fenitoína (un medicamento utilizado para el tratamiento de la epilepsia), ya que es posible que deba ajustar la dosis.
- Carbamazepina (un medicamento utilizado para el tratamiento de la epilepsia), ya que es posible que le tenga que ajustar la dosis, y los siguientes efectos adversos de eslicarbazepina pueden ocurrir con mayor frecuencia: visión doble, coordinación anormal y mareo.
- Anticonceptivos hormonales (tales como la píldora anticonceptiva) ya que eslicarbazepina puede disminuir la efectividad de los mismos.
- Simvastatina (un medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol), ya que es posible que le tenga que ajustar la dosis.
- Rosuvastatina, un medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol.
- El anticoagulante warfarina.
- Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs).
- No tome oxcarbazepina (un medicamento utilizado para el tratamiento de la epilepsia) junto con eslicarbazepina, ya que se desconoce si es seguro tomar estos dos medicamentos juntos.

Ver la sección “Embarazo y lactancia” para obtener recomendaciones sobre anticoncepción.

### **Embarazo y lactancia**

No se recomienda el uso de eslicarbazepina si está embarazada, ya que se desconocen los efectos de eslicarbazepina sobre el embarazo y el niño en gestación.

Si tiene intención de quedarse embarazada, hable con su médico antes de interrumpir el método anticonceptivo y antes de quedarse embarazada. Su médico puede decidir cambiar su tratamiento.

Hay datos limitados sobre el uso de eslicarbazepina acetato en mujeres embarazadas.

Las investigaciones han mostrado un aumento en el riesgo de defectos congénitos y problemas con el desarrollo neurológico (desarrollo del cerebro) en los hijos de mujeres que toman medicamentos antiepilépticos, particularmente cuando se toma más de un medicamento antiepiléptico a la vez.

Si está o cree que podría estar embarazada, informe a su médico inmediatamente. No debe dejar de tomar su medicamento hasta que lo haya comentado con su médico. Dejar de tomar su medicación sin consultar a su médico puede causar convulsiones, que podrían ser peligrosas para usted y su hijo en gestación. Su médico puede decidir cambiarle el tratamiento.

Si es una mujer en edad fértil y no está planeando quedarse embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con eslicarbazepina. Eslicarbazepina puede afectar al funcionamiento de los anticonceptivos hormonales, tales como la píldora anticonceptiva, y hacerlos menos eficaces para prevenir el embarazo. Por lo tanto, se le recomienda utilizar otras formas de anticoncepción segura y efectiva mientras tome eslicarbazepina. Hable con su médico, quien discutirá con usted el tipo de anticonceptivo más adecuado para usar mientras esté tomando eslicarbazepina. Si se suspende el tratamiento con eslicarbazepina, debe seguir usando un método anticonceptivo eficaz hasta el final del ciclo menstrual en curso. Si toma eslicarbazepina durante el embarazo, su bebé también corre el riesgo de tener problemas de sangrado inmediatamente después de nacer. Es posible que su médico le dé a usted y a su bebé un medicamento para prevenir esto.

No dé el pecho mientras esté tomando eslicarbazepina. Se desconoce si pasa a la leche materna.

### **Conducción y uso de máquinas**

Eslicarbazepina puede provocarle mareo, aturdimiento y afectar su visión, en particular al inicio del tratamiento. Si esto le ocurriera, no conduzca ni utilice ninguna herramienta ni máquina.

### **Eslicarbazepina Normon contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

### **3. Cómo tomar Eslicarbazepina Normon**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

#### Adultos

##### *Dosis al inicio del tratamiento*

400 mg una vez por día durante una o dos semanas, antes de aumentar a la dosis de mantenimiento. Su médico decidirá si se le administra esta dosis durante una o dos semanas.

##### *Dosis de mantenimiento*

La dosis de mantenimiento habitual es de 800 mg una vez por día.

En función del modo en que responda a eslicarbazepina, la dosis puede incrementarse a 1.200 mg una vez al día. Si está tomando el eslicarbazepina sólo (monoterapia), su médico puede valorar aumentarle la dosis a 1.600 mg una vez al día.

#### Pacientes con problemas renales

Si tiene problemas renales por lo general se le administrará una dosis menor de eslicarbazepina. Su médico determinará la dosis correcta para usted. No se recomienda eslicarbazepina si tiene problemas renales graves.

#### Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años)

Si usted es una persona mayor y está tomando eslicarbazepina en monoterapia la dosis de 1.600 mg no es adecuada para usted.

#### Niños mayores de 6 años de edad

##### *Dosis al inicio del tratamiento*

La dosis de inicio es 10 mg por kg de peso corporal una vez al día durante una o dos semanas, antes de aumentar a la dosis de mantenimiento.

##### *Dosis de mantenimiento*

Dependiendo de la respuesta a eslicarbazepina, la dosis puede aumentarse en 10 mg por kg de peso corporal, a intervalos de una o dos semanas, hasta los 30 mg por kg de peso corporal. La dosis máxima es 1.200 mg una vez al día.

#### Niños $\geq$ 60 kg

Los niños con un peso corporal de 60 kg o más deben tomar la misma dosis que los adultos.

La suspensión oral, otra forma farmacéutica del medicamento, puede ser más adecuada para la administración en niños. Consulte a su médico o farmacéutico.

#### Forma y vía de administración

Eslicarbazepina se administra por vía oral. Trague el comprimido con un vaso de agua.

Eslicarbazepina puede administrarse con o sin alimentos.

Si tiene dificultad para tragar el comprimido entero, puede triturarlo y añadirlo a una pequeña cantidad de agua o compota de manzana para tomarlo inmediatamente.

El comprimido se puede dividir en dosis iguales.

### **Si toma más Eslicarbazepina Normon del que debe**

Si accidentalmente toma más eslicarbazepina del que debe, está en riesgo potencial de tener más crisis; o puede sentir que el latido de su corazón es irregular o más rápido. Contacte con su médico o vaya inmediatamente a un hospital si experimenta cualquiera de estos síntomas. Lleve el envase del medicamento con usted, para que el médico sepa qué ha tomado.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó tomar Eslicarbazepina Normon**

Si olvida tomar un comprimido, tómelo en cuanto lo recuerde y continúe de la manera habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **Si interrumpe el tratamiento con Eslicarbazepina Normon**

No suspenda súbitamente la administración de los comprimidos. Si lo hace, corre el riesgo de sufrir más convulsiones. Su médico decidirá durante cuánto tiempo debe tomar eslicarbazepina. Si su médico decide suspenderle el tratamiento con eslicarbazepina, por lo general se le reducirá gradualmente la dosis. Es importante que complete el tratamiento conforme a las instrucciones de su médico; en caso contrario, sus síntomas podrían empeorar.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Los siguientes efectos adversos pueden ser muy graves. Si aparecen, suspenda la administración de eslicarbazepina e infórmele a un médico o vaya a un hospital de inmediato, ya que podría necesitar tratamiento médico urgente:

- Ampollas o descamación de la piel y/o membranas mucosas, erupción, problemas para tragar o para respirar, hinchazón de los labios, rostro, párpados, garganta o lengua. Estos podrían ser signos de una reacción alérgica.

Los efectos adversos **muy frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) son:

- Mareo o somnolencia.

Los efectos adversos **frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas) son:

- Sensación de inestabilidad, o de estar girando o flotando.
- Náuseas o vómitos.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea.
- Visión doble o borrosa.
- Dificultad para concentrarse.
- Sensación de cansancio o disminución de la energía.

- Temblor.
- Erupción cutánea.
- Análisis de sangre que muestran niveles bajos de sodio.
- Disminución del apetito.
- Dificultad para dormir.
- Dificultad en la coordinación de movimientos (ataxia).
- Aumento de peso.

Los efectos adversos **poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas) son:

- Torpeza de movimientos.
- Alergia.
- Estreñimiento.
- Convulsiones.
- Glándula tiroides hipoactiva. Los síntomas incluyen disminución del nivel de hormonas tiroideas (detectada en los análisis de sangre), intolerancia al frío, aumento del tamaño de la lengua, uñas o cabellos finos y quebradizos, y baja temperatura corporal.
- Problemas hepáticos (tales como aumento de las enzimas hepáticas).
- Presión arterial alta o incremento intenso de la presión arterial.
- Presión arterial baja, o presión arterial disminuida al ponerse de pie.
- Análisis de sangre que muestren que tiene niveles bajos de sales (incluyendo cloruro), o una reducción en la cantidad de glóbulos rojos.
- Deshidratación.
- Cambios en los movimientos oculares, visión difusa u ojos rojos.
- Sufrir caídas.
- Quemadura térmica.
- Mala memoria u olvidos.
- Llanto, sensación de depresión, nerviosismo o confusión, falta de interés o de emociones.
- Incapacidad de hablar, escribir o entender el lenguaje hablado o escrito.
- Agitación.
- Déficit de atención/hiperactividad.
- Irritabilidad.
- Cambios del estado de ánimo o alucinaciones.
- Dificultad para hablar.
- Hemorragias nasales.
- Dolor en el pecho.
- Hormigueo o sensación de entumecimiento en cualquier parte del cuerpo.
- Migraña.
- Ardor.
- Sensación anormal al tacto.
- Alteraciones del olfato.
- Zumbidos en los oídos.
- Dificultad para oír.
- Hinchazón de piernas y brazos.
- Acidez, malestar de estómago, dolor abdominal, hinchazón y molestia abdominal o boca seca.
- Heces negras.
- Inflamación de encías o dolor en los dientes.
- Sudoración o piel seca.
- Picor.
- Cambios en la piel (por ejemplo enrojecimiento de la piel).
- Pérdida del cabello.
- Infección urinaria.
- Malestar general, debilidad o escalofríos.

- Pérdida de peso.
- Dolor muscular, dolor en extremidades, debilidad muscular.
- Trastorno del metabolismo óseo.
- Proteínas óseas aumentadas.
- Enrojecimiento (sofoco), frío en las extremidades.
- Latidos del corazón más lentos o irregulares.
- Somnolencia extrema.
- Sedación.
- Alteración neurológica motora donde los músculos se contraen, provocando torsiones y movimientos repetitivos o posturas anormales. Entre los síntomas se incluyen temblores, dolor y calambres.
- Toxicidad medicamentosa.
- Ansiedad.

Los efectos adversos de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son:

- Reducción de las plaquetas que aumenta el riesgo de sangrado o hematomas.
- Dolor intenso en la espalda o estómago (causado por la inflamación del páncreas).
- Reducción de los glóbulos blancos que hace más probable las infecciones.
- Máculas rojizas o manchas circulares a menudo con ampollas centrales en el tronco, descamación de la piel, úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos, ojos enrojecidos e inflamados y que pueden estar precedidos de fiebre y/o síntomas similares a la gripe (Síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica).
- Inicialmente síntomas parecidos a la gripe, erupción en la cara, erupción generalizada, temperatura corporal elevada, elevaciones de las enzimas hepáticas, anomalías sanguíneas (eosinofilia), ganglios linfáticos agrandados y otras afecciones del cuerpo (reacción al medicamento con eosinofilia y síntomas sistémicos que también se conoce como DRESS o síndrome de hipersensibilidad a los medicamentos).
- Reacción alérgica grave que causa hinchazón de la cara, la garganta, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas.
- Urticaria (erupción cutánea con picor).
- Letargo, confusión, espasmos musculares o un empeoramiento significativo de las convulsiones (posibles síntomas de niveles bajos de sodio en sangre debido a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética (ADH)).

El uso de eslicarbazepina se asocia con una anomalía en el ECG (electrocardiograma) denominada aumento en el intervalo PR. Pueden producirse efectos adversos asociados con esta anomalía del ECG (por ejemplo, desvanecimiento y ralentización de los latidos del corazón).

Se han comunicado trastornos óseos incluyendo osteopenia y osteoporosis (adelgazamiento de los huesos) y fracturas con medicamentos antiepilépticos relacionados estructuralmente como carbamazepina y oxcarbazepina. Hable con su médico o farmacéutico si está en tratamiento de larga duración con antiepilépticos, tiene historial de osteoporosis o toma esteroides.

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## 5. Conservación de Eslicarbazepina Normon

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Eslicarbazepina Normon

- El principio activo es eslicarbazepina acetato. Cada comprimido contiene 400 mg de eslicarbazepina acetato.
- Los demás componentes son povidona, sílice coloidal anhidra, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Los comprimidos de Eslicarbazepina Normon 400 mg son blancos, oblongos y biconvexos, grabados con "E400" y ranurados en un lado y lisos en el otro lado, con un diámetro de 14,4 mm x 7,2 mm  $\pm 10\%$ . El comprimido se puede dividir en dosis iguales.

Los comprimidos vienen envasados en blísters, en cajas de cartón de 28 y 30 comprimidos.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (ESPAÑA)

### Fecha de la última revisión de este prospecto: Septiembre 2023

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>

Puede acceder a información detallada sobre este medicamento escaneando con su teléfono móvil (smartphone) el código QR incluido en el prospecto y cartón. También puede acceder a esta información en la siguiente dirección de internet:

[https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/89036/P\\_89036.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/89036/P_89036.html)