

## Prospecto: información para el paciente

### Cequa 0,9 mg/ml colirio en solución en envase unidosos ciclosporina

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### Contenido del prospecto

1. Qué es Cequa y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Cequa
3. Cómo usar Cequa
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Cequa
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Cequa y para qué se utiliza

Cequa contiene el principio activo ciclosporina. La ciclosporina forma parte de un grupo de medicamentos denominados inmunodepresores, que se utilizan para reducir la inflamación.

Ciclosporina se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco de moderada a grave (queratoconjuntivitis seca) en pacientes adultos que no han respondido adecuadamente a las lágrimas artificiales.

Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

Debe acudir a la consulta de su médico como mínimo cada 3 meses para que evalúe el efecto de este medicamento.

#### 2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Cequa

##### No use Cequa:

- si es alérgico a la ciclosporina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6);
- si ha sufrido o sufre cáncer en o alrededor del ojo;
- si sufre una infección ocular.

## **Advertencias y precauciones**

Utilice este medicamento únicamente como colirio para el (los) ojo(s).

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar este medicamento:

- si ha tenido anteriormente una infección ocular por el virus del herpes que pueda haber dañado la parte frontal transparente del ojo (córnea);
- si está tomando algún medicamento que contenga esteroides;
- si está tomando algún medicamento para tratar el glaucoma.

Se debe quitar las lentes de contacto antes de usar este medicamento; puede volver a ponérselas 15 minutos después de la administración de este medicamento.

## **Niños y adolescentes**

No se debe usar este medicamento en niños y adolescentes menores de 18 años.

## **Otros medicamentos y Cequa**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Consulte a su médico si está usando un colirio que contenga esteroides, ya que estos pueden aumentar el riesgo de efectos adversos.

Se debe usar este medicamento al menos 15 minutos después de utilizar cualquier otro colirio.

## **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No debe utilizar este medicamento si está embarazada.

Si se puede quedar embarazada, debe utilizar anticonceptivos mientras use este medicamento.

Es posible que haya cantidades muy pequeñas de ciclosporina en la leche materna. Si está en periodo de lactancia consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

## **Conducción y uso de máquinas**

Puede que tenga visión borrosa inmediatamente después de utilizar este medicamento. En este caso, espere hasta que su visión sea clara antes de conducir o utilizar máquinas.

## **Cequa contiene fosfatos**

Este medicamento contiene 0,0159 mg de fosfatos en cada gota. Si sufre de daño grave en la capa transparente de la parte frontal del ojo (córnea), el tratamiento con fosfatos, en casos muy raros, puede provocar parches nublados en la córnea debido al calcio.


### 3. Cómo usar Cequa

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es una gota en cada ojo afectado, dos veces al día, con un intervalo aproximado de 12 horas.

#### Instrucciones de uso


Siga atentamente estas instrucciones y consulte a su médico o farmacéutico si hay algo que no entiende.



1



2



3

- Lávese las manos.
- Si tiene puestas las lentes de contacto, quítelas antes de usar el colirio; puede volvérselas a poner 15 minutos después de haberse administrado las gotas.
- Abra la bolsa de aluminio, extraiga un envase unidosis, e inserte el resto de envases unidosis de nuevo en el interior de la bolsa de aluminio.
- Gire la tapa (**figura 1**).
- Baje el párpado inferior (**figura 2**).
- Eche la cabeza hacia atrás y mire al techo.
- Suavemente, apriete para echar una gota de medicamento en el ojo. Asegúrese de no tocar el ojo con la punta del envase unidosis.
- Parpadee varias veces para distribuir la gota en el ojo.
- Después de aplicar la gota, presione con un dedo la comisura del ojo junto a la nariz y cierre suavemente los párpados durante 2 minutos (**figura 3**) (esto favorece el efecto local).
- Si utiliza el colirio en ambos ojos, repita estos pasos en el otro ojo.
- Tire el envase unidosis en cuanto lo haya utilizado, incluso si aún queda algo de medicamento en él.
- Debe mantener los envases unidosis restantes en la bolsa de aluminio.

Si la gota cae fuera del ojo, inténtelo de nuevo.

**Si usa más Cequa del que debe**, lávese el ojo con agua. No se aplique más gotas hasta que le corresponda aplicar la siguiente dosis.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

**Si olvidó usar Cequa**, continúe con la siguiente dosis prevista.

No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. No use más de una gota a la vez en el ojo(s) afectado(s).

**Si interrumpe el tratamiento con Cequa, consúltelo antes con su médico.**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Se han observado los siguientes efectos adversos:

Los efectos adversos más frecuentes se producen en y alrededor de los ojos.

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): dolor o malestar cuando se aplica una gota por primera vez.

Frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas): enrojecimiento del ojo, irritación del ojo, ojos llorosos, irritación en el ojo.

Poco frecuentes (pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas): aumento del lagrimeo del ojo, aumento de la sensibilidad a la luz, dolor en el ojo, hinchazón de la conjuntiva (piel que recubre la parte blanca del ojo), inflamación de los márgenes del párpado, infecciones oculares y perioculares, cefalea e irritación de garganta.

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM](http://www.notificaRAM). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### **5. Conservación de Cequa**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la bolsa de aluminio y los envases unidos después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar por encima de 25°C. No congelar. Después de abrir las bolsas de aluminio, se deben mantener los envases unidos en ellas para evitar la evaporación. El período de validez tras la apertura de la bolsa de aluminio: 5 días. Desechar inmediatamente después de su uso cualquier envase unidos individual abierto con restos de solución.

No utilice este medicamento si observa partículas visibles.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el

medio ambiente.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de Cequa

- El principio activo es ciclosporina. Un mililitro de Cequa contiene 0,9 mg de ciclosporina.
- Los demás componentes son: macrogolglicerol hidroxistearato, octoxinol-40, dihidrógenofosfato de sodio dihidrato (E339), hidrogenofosfato de sodio anhidro (E339), cloruro sódico, povidona (E1201), ácido clorhídrico (para ajuste del pH) (E507), hidróxido sódico (para ajuste del pH) (E524) y agua para preparaciones inyectables.

### Aspecto del producto y contenido del envase

Cequa es una solución clara, incolora en envases unidosis.

Se suministra en envases unidosis de polietileno de baja densidad (LDPE).

Cada envase unidosis contiene 0,25 ml de colirio en solución.

Los envases unidosis se acondicionan en una bolsa sellada de aluminio con recubrimiento de polietileno.

Tamaños de envases: 60 envases unidosis.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

### Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

#### Titular de la autorización de comercialización

Sun Pharmaceutical Industries BV  
Polarisavenue 87,  
2132JH Hoofddorp,  
Países Bajos

#### Responsable de la fabricación

Laboratoire Unither  
1 Rue De L'Arquerie  
Coutances 50200  
Francia

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:**

- Holanda: Cequa 0.9 mg/ml oogdruppels, oplossing in verpakking voor eenmalig gebruik  
Austria: Cequa 0,9 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis  
Alemania: Cequa 0,9 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis  
Dinamarca: Sekua 0.9 mg/ml øjendråber, opløsning i enkeltdosisbeholder  
España: Cequa 0,9 mg/ml colirio en solución en envase unidosis  
Finlandia: Cequa 0.9 mg/ml silmätipat, liuos kerta- annospakkauksessa  
Francia: Cequa 0,9 mg/mL, collyre en solution en récipient unidose  
Italia: Cequa  
Noruega: Cequa 0.9 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder  
Suecia: Cequa 0.9 mg/ml ögondroppar, lösning i endosbehållare

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2024**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>