

## Prospecto: información para el usuario

### **Bupropión SUN 150 mg comprimidos de liberación modificada EFG** **Bupropión SUN 300 mg comprimidos de liberación modificada EFG**

bupropión hidrocloreuro

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Bupropión SUN y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Bupropión SUN
3. Cómo tomar Bupropión SUN
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Bupropión SUN
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Bupropión SUN y para qué se utiliza**

Bupropión es un medicamento prescrito por su médico para el tratamiento de la depresión. Se cree que actúa sobre determinadas sustancias en el cerebro llamadas *noradrenalina* y *dopamina*.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Bupropión SUN**

##### **No tome Bupropión SUN**

- Si es alérgico a bupropión o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- Si está tomando otros medicamentos que contengan bupropión
- Si le han diagnosticado epilepsia o tiene antecedentes de sufrir convulsiones
- Si padece, o ha padecido, algún trastorno de la alimentación (por ejemplo, bulimia o anorexia nerviosa)
- Si tiene un tumor en el cerebro
- Si toma grandes cantidades de alcohol y ha iniciado, o va a iniciar, una deshabituación de alcohol
- Si tiene alguna enfermedad grave de hígado
- Si ha dejado de tomar medicamentos para dormir, o va a dejarlos mientras esté tomando bupropión
- Si está tomando o ha tomado, en las últimas dos semanas, otros medicamentos para la depresión denominados *inhibidores de la enzima monoaminoxidasa* (IMAOs)

Si está en alguna de estas situaciones, comuníquese inmediatamente a su médico y no tome bupropión.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar bupropión.

### **Síndrome de Brugada**

Si tiene una afección denominada síndrome de Brugada (un síndrome hereditario raro que afecta al ritmo cardíaco) o si se ha producido una parada cardíaca o muerte súbita en su familia.

### **Niños y adolescentes**

Bupropión no está recomendado en el tratamiento de niños menores de 18 años de edad.

En pacientes menores de 18 años existe un mayor riesgo de pensamientos e intentos de suicidio cuando están en tratamiento con antidepresivos.

### **Adultos**

Comuníquese a su médico antes de comenzar a tomar bupropión:

- Si toma mucho alcohol habitualmente
- Si padece diabetes que está siendo tratada con insulina o comprimidos orales
- Si ha sufrido una lesión grave en la cabeza o ha tenido en el pasado un traumatismo en la cabeza. Se ha observado que bupropión puede producir crisis epilépticas (convulsiones) en aproximadamente 1 de cada 1.000 personas. Este efecto adverso es más probable que ocurra en personas que estén en las situaciones citadas anteriormente. Si sufre una crisis epiléptica mientras está tomando bupropión, interrumpa su tratamiento. No lo tome nunca más y visite a su médico
- Si tiene trastorno bipolar (oscilaciones muy pronunciadas del estado de ánimo), bupropión puede producir episodios de esta enfermedad
- Si está tomando otros medicamentos para la depresión, el uso de estos medicamentos junto con bupropión puede causar síndrome serotoninérgico, una condición potencialmente mortal (ver “Otros medicamentos y Bupropión SUN” en esta sección)
- Si tiene alguna enfermedad del hígado o del riñón, la probabilidad de sufrir efectos adversos es mayor

Si usted está en alguna de las situaciones citadas anteriormente, consulte con su médico antes de tomar bupropión, quien podría decidir hacerle un seguimiento más estrecho o recomendarle otro tratamiento.

### **Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión**

Si usted está deprimido a veces puede tener pensamientos de hacerse daño a sí mismo o suicidarse. Estos pueden aumentar al principio del tratamiento con antidepresivos, ya que todos estos medicamentos tardan un tiempo en hacer efecto, que normalmente es de unas dos semanas, pero a veces puede ser más tiempo. Es probable que le suceda esto:

- Si usted ya ha tenido previamente pensamientos de suicidio o de hacerse daño a sí mismo
- Si es usted un adulto joven. Hay información de ensayos clínicos que muestran que existe un aumento del riesgo de conductas suicidas en adultos menores de 25 años con enfermedades psiquiátricas que estaban siendo tratados con algún antidepresivo.

Si tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo o suicidarse en cualquier momento, **consulte a su médico o acuda al hospital inmediatamente.**

**Puede ser útil para usted explicarle a algún familiar o a un amigo cercano** que está deprimido o tiene trastornos de ansiedad, y pedirles que lean este prospecto. Puede pedirles también que le digan si piensan que su depresión o ansiedad está empeorando, o si están preocupados por los cambios en su conducta.

### **Otros medicamentos y Bupropión SUN**

Interrumpa su tratamiento con bupropión e informe a su médico si está tomando o ha tomado medicamentos antidepresivos denominados *inhibidores del enzima monoaminoxidasa* (IMAOs) durante las dos últimas semanas (vea también la sección 2 “No tome Bupropión SUN”).

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, vitaminas o plantas medicinales, incluso los adquiridos sin receta. El médico podría cambiarle la dosis de bupropión o sugerir un cambio en los otros medicamentos.

Algunos medicamentos interactúan con bupropión. Algunos de ellos pueden aumentar la probabilidad de sufrir crisis epilépticas o convulsiones, y otros pueden aumentar el riesgo de sufrir otros efectos adversos. A continuación, se enumeran algunos ejemplos, aunque la lista no es completa.

Puede aumentar la posibilidad de sufrir convulsiones

- si toma otros medicamentos para la depresión u otras enfermedades mentales
- si toma teofilina usado para tratar el asma u otras enfermedades pulmonares
- si toma tramadol, un analgésico fuerte
- si ha estado tomando medicamentos sedantes, o si los va a dejar de tomar mientras está tomando bupropión (vea también la sección 2 “No tome Bupropión SUN”)
- si toma medicamentos para tratar la malaria (como mefloquina o cloroquina)
- si toma estimulantes u otros medicamentos para controlar su peso o apetito
- si usa corticosteroides (por vía oral o inyectable)
- si usa antibióticos denominados quinolonas
- si usa ciertos antihistamínicos que pueden causar somnolencia
- si usa medicamentos para tratar la diabetes.

Si usted está en alguna de estas situaciones, informe inmediatamente a su médico antes de tomar bupropión. Su médico valorará los riesgos y beneficios de tomar este medicamento.

**Puede aumentar la posibilidad de tener otros efectos adversos**

- si toma otros medicamentos para tratar la depresión (amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina, dosulepina, desipramina o imipramina) u otras enfermedades mentales (clozapina, risperidona, tioridazina u olanzapina). Bupropión puede interactuar con algunos medicamentos usados para el tratamiento de la depresión y puede experimentar cambios en el estado mental (por ejemplo, agitación, alucinaciones, coma) y otros efectos adversos como temperatura corporal superior a 38 °C, aumento del ritmo cardíaco, presión arterial inestable, reflejos exagerados, rigidez muscular, falta de coordinación y/o síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea)
- si toma medicamentos antiparkinsonianos (levodopa, amantadina u orfenadrina)
- si toma medicamentos que afectan la capacidad de su organismo de eliminar bupropión (carbamecepina, fenitoína, valproato)
  
- si toma algunos medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer (como ciclofosfamida o ifosfamida)
- si toma ticlopidina o clopidogrel, usados principalmente para prevenir el accidente cerebrovascular
- si toma algún medicamento betabloqueante (metoprolol)
- si toma medicamentos para tratar arritmias del corazón (propafenona, flecainida)
- si usa parches de nicotina para ayudarle a dejar de fumar.

Si usted está en alguna de estas situaciones, informe inmediatamente a su médico antes de tomar bupropión.

**Bupropión SUN puede ser menos eficaz**

- si toma ritonavir o efavirenz, medicamentos para tratar la infección por VIH (SIDA).

Informe a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos. Su médico comprobará si bupropión está funcionando de forma adecuada en usted. Puede ser necesario aumentar la dosis o cambiar a otro tratamiento para su depresión. No debe aumentar la dosis de bupropión si no se lo aconseja su médico, ya que esto puede aumentar el riesgo de tener efectos adversos, incluso convulsiones.

### **Bupropión SUN puede hacer que otros medicamentos sean menos efectivos**

- Si toma tamoxifeno utilizado para el tratamiento del cáncer.

Informe a su médico si está en esta situación. Puede ser necesario cambiarle el tratamiento para su depresión.

- Si toma digoxina para el corazón.

Informe a su médico si está en esta situación. El médico puede considerar ajustar la dosis de digoxina.

### **Uso de Bupropión SUN y alcohol**

El alcohol puede afectar a la forma de actuar de bupropión y, cuando se toman juntos, raramente puede afectar a sus nervios o a su estado mental. Algunas personas han notado que son más sensibles al alcohol durante el tratamiento con bupropión. El médico podría recomendarle que no beba alcohol (cerveza, vino, licores) o que beba cantidades muy pequeñas mientras esté tomando bupropión. Si actualmente consume mucho alcohol, no lo deje de forma brusca, ya que puede correr el riesgo de sufrir una crisis epiléptica.

**Consulte al médico sobre el consumo de alcohol** antes de iniciar su tratamiento con bupropión.

### **Efecto en los análisis de orina**

Bupropión puede interferir con algunos análisis de orina utilizados para detectar otros fármacos o sustancias. Si necesita un análisis de orina, comuníquese a su médico o al hospital que está tomando bupropión.

### **Embarazo y lactancia**

No tome bupropión si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada a menos que el médico se lo prescriba. Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Algunos estudios, no todos, han notificado un aumento del riesgo de defectos de nacimiento, en particular defectos del corazón, de bebés cuyas madres estuvieron tomando bupropión. No se conoce si esto es debido al uso de bupropión.

Los componentes de Bupropión pueden pasar a la leche materna. Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar Bupropión .

### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si bupropión le produce mareo o aturdimiento.

## **3. Cómo tomar Bupropión SUN**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. A continuación, se incluyen las dosis recomendadas, pero el médico le aconsejará la dosis adecuada para usted. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

**Puede ser necesario que transcurra un tiempo antes de que empiece a notar una mejoría.** El medicamento tarda un tiempo en ejercer totalmente su acción, que puede ser semanas o meses. Cuando comience a sentirse mejor, su médico podrá aconsejarle continuar con su tratamiento de bupropión para prevenir que la depresión vuelva a aparecer.

### ***Qué dosis tomar***

La dosis normal recomendada en adultos es de un comprimido de 150 mg al día.

Si después de varias semanas no comienza a sentir mejoría, el médico podrá aumentar la dosis a 300 mg al día.

Tome los comprimidos de bupropión por la mañana. No tome bupropión más de una vez al día.

El comprimido está cubierto por una película que libera el medicamento lentamente en su organismo. Algunas veces puede notar que aparece una especie de comprimido en las heces. Esto es la película de recubrimiento vacía que ha pasado por su intestino.

Trague los comprimidos enteros. No los mastique ni los triture ni los divida, porque si hace esto existe el peligro de sobredosis debido a que el fármaco se liberará muy rápidamente en su organismo, aumentando la probabilidad de tener efectos adversos, incluso ataques (convulsiones).



Algunas personas pueden mantener la dosis de un comprimido de 150 mg al día durante todo el tratamiento. Su médico puede prescribir esta dosis en pacientes con problemas de hígado o riñón.

### ***Duración del tratamiento***

Consulte con su médico quien, de acuerdo con usted, le indicará la duración del tratamiento con bupropión. Pueden ser necesarias varias semanas o meses hasta que usted note alguna mejoría. Mantenga informado al médico regularmente sobre sus síntomas para que pueda decidir la duración del tratamiento. Aunque se empiece a sentir mejor, su médico puede recomendarle continuar el tratamiento con bupropión para evitar que reaparezcan los síntomas de la depresión.

### **Si toma más Bupropión SUN del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, o acuda a urgencias o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si usted toma más comprimidos de lo indicado por el médico, puede aumentar el riesgo de sufrir crisis epilépticas o convulsiones.

### **Si olvidó tomar Bupropión SUN**

Si se le olvida tomar una dosis, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **Si interrumpe el tratamiento con Bupropión SUN**

No interrumpa el tratamiento con bupropión o reduzca la dosis sin haberlo consultado previamente con el médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

##### Efectos adversos graves

###### *Crisis epilépticas o convulsiones*

Aproximadamente 1 de cada 1 000 personas que toman bupropión tienen riesgo de sufrir un ataque epiléptico (una crisis o convulsión). Este riesgo es mayor si toma más comprimidos de los que debe, si está tomando determinados medicamentos o si tiene mayor riesgo de lo habitual de sufrir ataques. Si tiene alguna duda, pregunte a su médico.

→ Consulte a su médico **si sufre un ataque epiléptico y no tome más comprimidos.**

###### *Reacciones alérgicas*

Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a bupropión, incluyendo:

- Enrojecimiento o erupción cutánea (urticaria), ampollas o habones en la piel. Algunas erupciones cutáneas pueden requerir hospitalización, especialmente si van unidas a hinchazón de boca y ojos
- Aparición anormal de “pitos” en el pecho o dificultad para respirar
- Hinchazón de párpados, labios o lengua
- Dolor en músculos o articulaciones
- Síncope o desmayo

→ Consulte a su médico **si sufre una reacción alérgica y no tome más comprimidos.**

**Las reacciones alérgicas pueden durar bastante tiempo.** Si el médico le prescribe algún medicamento para ello, asegúrese de completar el tratamiento.

###### *Lupus eritematoso cutáneo o empeoramiento de los síntomas del lupus*

Frecuencia no conocida: la frecuencia no puede estimarse con los datos disponibles de personas que toman bupropión. El lupus es un trastorno del sistema inmunológico que afecta a la piel y a otros órganos.

→ **Si experimenta una exacerbación del lupus, erupción cutánea o lesiones (particularmente en áreas expuestas al sol) mientras toma bupropión sun, contacte inmediatamente con su médico, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento.**

###### *Pustulosis Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)*

Frecuencia no conocida: la frecuencia no puede estimarse con los datos disponibles de personas que toman bupropión.

Los síntomas de la PEGA incluyen erupción con granos/ampollas llenas de pus.

→ **Si experimenta una erupción con granos/ampollas llenas de pus, contacte inmediatamente con su médico, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento.**

##### Otros efectos adversos

Efectos adversos muy frecuentes Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas:

- dificultad para dormir. Asegúrese de tomar bupropión por la mañana
- dolor de cabeza
- sequedad de boca
- náuseas, vómitos

##### Efectos adversos frecuentes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

- fiebre, mareo, picor, sudoración y erupción cutánea (en ocasiones debido a reacciones alérgicas)
- inestabilidad, temblor, debilidad, cansancio, dolor en el pecho
- sentirse ansioso o agitado
- dolor de estómago o molestias digestivas (estreñimiento), alteraciones del sentido del gusto, pérdida de apetito (anorexia)
- aumento de la tensión sanguínea (a veces grave), rubor
- sensación de oír campanillas, alteración de la visión

### **Efectos adversos poco frecuentes**

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

- sentirse deprimido (ver también la sección 2 “Tenga especial cuidado con Bupropión SUN”, en “Pensamientos de suicidio y empeoramiento de su depresión”)
- confusión
- dificultad para concentrarse
- aceleración de los latidos del corazón
- pérdida de peso

### **Efectos adversos raros**

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 1 000 personas:

- convulsiones

### **Efectos adversos muy raros**

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 000 personas:

- palpitaciones, desmayo
- espasmos musculares, rigidez muscular, falta de coordinación de movimientos, problemas al caminar o de coordinación
- sensación de inquietud, irritabilidad, hostilidad, agresividad, pesadillas, hormigueo o entumecimiento, pérdida de memoria
- coloración amarilla de la piel o del blanco de los ojos (*ictericia*) que puede estar asociada con un aumento de las enzimas hepáticas, hepatitis
- reacciones alérgicas graves; erupción cutánea junto a dolor en las articulaciones y músculos
- cambios en los niveles de azúcar en la sangre
- aumento o disminución de la frecuencia de orinar
- incontinencia urinaria (micción involuntaria, pérdida de orina)
- erupciones cutáneas graves que pueden afectar a la boca u otras partes del cuerpo y pueden ser peligrosas para la vida
- empeoramiento de la psoriasis (placas de engrosamiento o enrojecimiento de la piel)
- sensaciones de sentirse como no real o extraño (*despersonalización*); ver u oír cosas que no existen (*alucinaciones*); sentir o creer cosas irreales (*ideas delirantes*); desconfianza grave (*paranoia*)

### **Frecuencia no conocida**

Otros efectos adversos se han producido en un reducido número de personas, pero no se conoce su frecuencia exacta:

- pensamientos de autolesionarse o suicidarse durante el tratamiento con Bupropión SUN o poco después de interrumpir el tratamiento (ver la sección 2, “Qué necesita saber antes de empezar a tomar Bupropión SUN”). Si usted tiene estos pensamientos, contacte con su médico o acuda inmediatamente a un hospital
- pérdida de contacto con la realidad e incapaz de pensar o juzgar con claridad (*psicosis*); otros síntomas pueden incluir alucinaciones y/o ilusionestartamudeo
- reducción del número de glóbulos rojos (anemia), glóbulos blancos (leucopenia) y plaquetas (trombocitopenia)

- disminución de sodio en sangre (hiponatremia)
- cambios en el estado mental (por ejemplo, agitación, alucinaciones, coma) y otros efectos adversos como temperatura corporal superior a 38 °C, aumento del ritmo cardiaco, presión arterial inestable, reflejos exagerados, rigidez muscular, falta de coordinación y/o síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea) mientras toma bupropión junto con otros medicamentos usados para el tratamiento de la depresión (como paroxetina, citalopram, escitalopram, fluoxetina y venlafaxina)

### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

## **5. Conservación de Bupropión SUN**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad y de la luz. No tome este medicamento después de la fecha de caducidad que se indica en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **COMPOSICIÓN DE BUPROPIÓN SUN**

El principio activo es bupropión hidrocloreto. Cada comprimido contiene 150 mg o 300 mg de bupropión hidrocloreto.

Los demás componentes son:

Núcleo del comprimido: hidroxipropilcelulosa, glicerol dibehenato, ácido esteárico

Película de recubrimiento: hipromelosa, etilcelulosa, povidona K90, lactosa monohidrato, citrato de trietilo, copolímero de ácido metacrílico-acrilato de etilo (1:1) Dispersión 30 %, macrogol 6000 y sílice coloidal hidratada.

Tinta de impresión: Shellac, óxido de hierro negro (E 172), propilenglicol.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Bupropión SUN 150 son comprimidos recubiertos, redondos, de color blanco a amarillo pálido, de aproximadamente 7,7 mm de diámetro, impresos con una “T” en tinta negra en una cara y lisos en la otra cara.

Bupropión SUN 300 son comprimidos recubiertos, redondos, de color blanco a amarillo pálido, de aproximadamente 9,6 mm de diámetro, impresos con una “T1” en tinta negra en una cara y lisos en la otra

cara.

Bupropión SUN se presenta en frascos blancos de plástico que incluyen un recipiente desecante que contiene gel de sílice activado y carbón activado. La botella está cerrada con un cierre de plástico a prueba de niños que incluye un revestimiento de sellado por inducción.

150 mg: 30, 60, 90 comprimidos.

300 mg: 30, 60, 90 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

## **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN**

**Titular de la autorización de comercialización** Sun Pharmaceutical Industries  
Europe B.V.,  
Polarisavenue 87,  
2132JH Hoofddorp,  
Países Bajos

**Responsable de la fabricación** Sun Pharmaceutical Industries  
Europe B.V.,  
Polarisavenue 87,  
2132JH Hoofddorp,  
Países Bajos

O

Terapia S.A.  
Fabricii 124 Street,  
400632, Cluj-Napoca,  
Rumanía

**Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al Representante local del titular de la autorización de comercialización:**

Sun Pharma Laboratorios, S.L.  
Rambla de Catalunya, 53-55  
08007- Barcelona  
España

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido (Irlanda del Norte) con los siguientes nombres:**

Alemania: BUPROPION BASICS 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreizetsung  
BUPROPION BASICS 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreizetsung  
España: Bupropión SUN 150 mg comprimidos de liberación modificada EFG  
Bupropión SUN 300 mg comprimidos de liberación modificada EFG  
Italia: Bupropione SUN  
Países Bajos: Bupropion HCl SUN 150 mg tabletten met gereguleerde afgifte  
Bupropion HCl SUN 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Polonia: Sentaro  
Rumanía: AXABAL 150 mg comprimato cu eliberare modificată  
AXABAL 300 mg comprimato cu eliberare modificată  
Suecia: Bupropion SUN 150 mg Tablett med modifierad frisättning  
Bupropion SUN 300 mg Tablett med modifierad frisättning

**FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DE ESTE PROSPECTO: OCTUBRE 2024**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>