Prospecto: información para el paciente

Leponex 200 mg comprimidos
clozapina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Leponex y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Leponex
3. Cómo tomar Leponex
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Leponex
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Leponex y para qué se utiliza

El principio activo de Leponex es clozapina que pertenece a un grupo de medicamentos llamados antipsicóticos (medicamentos llamados también neurolépticos y que se utilizan para tratar trastornos mentales específicos tales como psicosis).

Leponex se utiliza para el tratamiento de pacientes adultos con esquizofrenia cuando la utilización de otros medicamentos no ha funcionado. La esquizofrenia es una enfermedad mental que implica trastornos del pensamiento, reacciones emocionales y trastornos del comportamiento. Usted solo puede utilizar este medicamento si ya ha probado como mínimo otros dos medicamentos neurolépticos, incluyendo uno de los nuevos neurolépticos atípicos para tratar la esquizofrenia, y estos medicamentos no responden, o causan reacciones adversas graves que no se pueden tratar.

Leponex está también indicado para tratar a adultos con trastornos del pensamiento, reacciones emocionales y trastornos del comportamiento graves que ocurren en la enfermedad de Parkinson, cuando otros tratamientos no han sido eficaces.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Leponex

No tome Leponex si:
- es alérgico a clozapina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- no va a ser posible realizarle análisis de sangre periódicamente;
- alguna vez le han dicho que tiene un recuento bajo de glóbulos blancos (p. ej., leucopenia o agranulocitosis), especialmente si ha sido causado por otros medicamentos. Esto no se aplica si ha tenido un recuento bajo de glóbulos blancos causado por quimioterapia previa;
- previamente ha tenido que dejar de utilizar Leponex porque le causaba reacciones adversas graves (p. ej., agranulocitosis o algún problema del corazón);
- está siendo o ha sido tratado con inyecciones depot de larga duración de antipsicóticos;
- tiene o ha tenido una enfermedad de la médula ósea;
- tiene epilepsia no controlada (crisis o ataques);
- ha tenido trastornos mentales graves causados por bebidas alcohólicas u otros medicamentos (p. ej., narcóticos);
- tiene episodios de pérdida de conciencia y fuerte sensación de sueño difícil de controlar;
- tiene colapso circulatorio que puede ocurrir como resultado de un estado de shock grave;
- tiene alguna enfermedad grave del riñón;
- tiene miocarditis (una inflamación del músculo del corazón);
- tiene alguna otra enfermedad grave del corazón;
- tiene síntomas o enfermedad activa del hígado como ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos, sensación de malestar y pérdida de apetito);
- tiene alguna otra enfermedad grave del hígado;
- tiene íleo paralítico (obstrucción intestinal, su intestino no funciona correctamente y tiene estreñimiento grave);
- utiliza algún medicamento que impide que su médula ósea funcione correctamente;
- utiliza algún medicamento que reduce el número de glóbulos blancos de su sangre;
  Informe a su médico y no tome Leponex si le puede aplicar cualquiera de las circunstancias anteriores.

Leponex no debe ser administrado a nadie que esté inconsciente o en coma.

Advertencias y precauciones
Las medidas de seguridad mencionadas en esta sección son muy importantes. Debe cumplir con ellas para minimizar el riesgo de las reacciones adversas graves que pueden suponer una amenaza para la vida.

Antes de empezar el tratamiento con Leponex, informe a su médico si tiene o ha tenido cualquiera de las siguientes circunstancias:
- coágulos sanguíneos o antecedentes familiares de coágulos sanguíneos, ya que este tipo de medicamentos se ha relacionado con formación de coágulos sanguíneos;
- glaucoma (presión en el ojo elevada);
- diabetes. En pacientes con o sin historial médico de diabetes mellitus (ver sección 4) se han dado niveles de glucosa en sangre elevados (a veces considerablemente);
- problemas de próstata o dificultad para orinar;
- cualquier enfermedad del corazón, riñón o hígado;
- estreñimiento crónico o está tomando medicamentos que le causan estreñimiento (tales como anticolinérgicos);
- intolerancia a la galactosa, deficiencia total de lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa;
- epilepsia controlada;
- enfermedades del intestino grueso;
- cirugía abdominal;
- una enfermedad cardíaca o antecedentes familiares de conducción anormal en el corazón llamada “prolongación de intervalo QT”;
- riesgo de padecer un ictus, por ejemplo, si tiene la presión sanguínea muy alta, problemas cardiovasculares o problemas en los vasos sanguíneos del cerebro.desarrolló un sarpullido grave o descamación de la piel, ampollas y/o llagas en la boca después de tomar Leponex.

  Este medicamento puede causar reacciones cutáneas graves. Deje de usar clozapina y busque

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

atención médica de inmediato si observa alguno de los síntomas relacionados con estas reacciones cutáneas graves.

Inmediatamente antes de tomar el siguiente comprimido de Leponex informe a su médico si:

* tiene signos de **resfriado, fiebre, síntomas parecidos a la gripe, dolor de garganta o cualquier otra infección**. Le deberán hacer un análisis de sangre urgente para saber si estos síntomas están relacionados con el medicamento;
* tiene un incremento repentino de la temperatura corporal, rigidez de los músculos que pueden derivar en alteración del estado de consciencia (síndrome neuroléptico maligno), ya que puede tratarse de un efecto adverso grave que requiere tratamiento inmediato;
* tiene **ritmo cardíaco rápido e irregular**, incluso cuando está en reposo, **palpitaciones, problemas respiratorios, dolor en el pecho** o **cansancio inusual**. Su médico deberá hacerle un chequeo del corazón y en caso necesario le derivará inmediatamente a un cardiólogo;
* tiene **náuseas, vómitos** y/o **pérdida de apetito**. Su médico deberá examinar su hígado.
* tiene **estreñimiento grave**. Su médico deberá tratarlo para evitar otras complicaciones.
* experimenta **estreñimiento**, **dolor abdominal**, **sensibilidad abdominal**, **fiebre**, **sensación de estar hinchado** y/o **diarrea con sangre**. Su médico necesitará examinarle.desarrolla signos y síntomas de apendicitis; estos pueden incluir dolor abdominal intenso y un empeoramiento que comienza cerca del ombligo y se desplaza hacia el lado inferior derecho, empeorando con el movimiento, la tos o al presionar la zona. Otros signos pueden incluir estreñimiento, hinchazón abdominal, malestar general, fiebre leve, vómitos, pérdida de apetito o diarrea. Necesitará un examen médico urgente por parte de su médico.

<u>Exámenes médicos y análisis de sangre</u>

Antes de empezar el tratamiento con Leponex, su médico le preguntará acerca de su historial médico y le hará un análisis de sangre para asegurarse que el recuento de sus glóbulos blancos es normal. Es importante conocer esto, ya que su cuerpo necesita disponer de glóbulos blancos para hacer frente a infecciones.
Asegúrese de que le realizan análisis de sangre de forma regular antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento y después de finalizar el tratamiento con Leponex.

- Su médico le informará exactamente de cuándo y dónde le realizarán estos análisis. Solo puede tomar Leponex si tiene un recuento sanguíneo normal.Leponex puede provocar una disminución grave de glóbulos blancos en sangre (agranulocitosis). Solo con un análisis de sangre regular su médico puede saber si presenta riesgo de desarrollar agranulocitosis (ver sección 4). Los análisis de sangre deben hacerse semanalmente durante las primeras 18 semanas de tratamiento y después, al menos una vez al mes durante las 34 semanas siguientes.
- Al cabo de 12 meses de tratamiento, se deben realizar análisis de sangre cada 12 semanas durante un año, y después anualmente, si no se detecta una disminución del número de glóbulos blancos en la sangre.Si hay una disminución del número de glóbulos blancos, deberá suspender el tratamiento con Leponex inmediatamente. Sus glóbulos blancos deberán volver a los valores normales.Debe realizarse análisis de sangre durante otras 4 semanas después de finalizar el tratamiento con Leponex en caso de suspensión completa del tratamiento por motivos hematológicos (es decir, agranulocitosis) o en caso de una duración del os controles < 2 años o en presencia de antecedentes de neutropenia que no hayan motivado la interrupción del tratamiento.

Antes de iniciar el tratamiento, su médico también le hará una exploración física. Su médico puede hacerle un electrocardiograma (ECG) para chequear su corazón, pero solo si es necesario para usted, o si tiene cualquier preocupación especial.
Si presenta alteraciones hepáticas, se le practicarán pruebas periódicas de la función del hígado a lo largo del tratamiento con Leponex.
Si tiene niveles de glucosa elevados en sangre (diabetes), su médico puede realizar una comprobación periódica de los niveles de glucosa.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Leponex puede alterar los niveles de lípidos de la sangre. Leponex puede provocar un aumento del peso corporal. Su médico puede vigilar su peso y sus niveles de lípidos.

Si tiene sensación de dolor leve de cabeza, mareo o debilidad, o Leponex hace que se sienta así, tenga cuidado al levantarse de la posición sentada o tumbada, ya que esto puede aumentar la posibilidad de caídas.

Si tiene que ser intervenido de alguna operación o si por cualquier motivo no puede andar durante un periodo de tiempo largo, comente a su médico que está tomando Leponex. Puede estar en riesgo de tener trombosis (coágulo sanguíneo en una vena).

Niños y adolescentes menores de 16 años
Si tiene menos de 16 años no debe tomar Leponex, ya que no se dispone de suficiente información para su uso en este grupo de edad.

Uso en pacientes de edad avanzada (60 años y mayores)
Los pacientes de 60 años y mayores pueden ser más susceptibles a los siguientes efectos adversos durante el tratamiento con Leponex: debilidad o dolor de cabeza leve después de cambiar de posición, mareo, ritmo cardíaco rápido, retención urinaria y estreñimiento.

Informe a su médico o farmacéutico si sufre una enfermedad llamada demencia.

Otros medicamentos y Leponex
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta o tratamientos a base de plantas. Puede necesitar tomar diferente cantidad de sus medicamentos o diferentes medicamentos.

No tome Leponex junto con otros medicamentos que detienen el funcionamiento correcto de la médula ósea y/o disminuyan el número de células sanguíneas producidas por el organismo, tales como:
- carbamazepina, un medicamento utilizado en la epilepsia;
- determinados antibióticos: cloranfenicol, sulfonamidas, tales como cotrimoxazol;
- determinados medicamentos para el dolor: analgésicos del grupo de las pirazolonas, tales como fenilbutazona;
- penicilamina, un medicamento utilizado para el tratamiento de la inflamación de las articulaciones reumáticas;
- agentes citotóxicos, medicamentos utilizados en quimioterapia;
- inyecciones depot de larga duración de medicamentos antipsicóticos.

Estos medicamentos incrementan su riesgo de desarrollar agranulocitosis (déficit de glóbulos blancos en la sangre).

La toma de Leponex al mismo tiempo que otros medicamentos puede afectar a la acción correcta de Leponex y/o de los otros medicamentos. Informe a su médico si tiene intención de tomar, si está tomando (incluso si el tratamiento está a punto de finalizar) o si recientemente ha dejado de tomar cualquiera de los siguientes medicamentos:
- medicamentos utilizados para tratar la depresión, tales como litio, fluvoxamina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO, citalopram, paroxetina, fluoxetina y sertralina;
- otros medicamentos antipsicóticos utilizados para tratar enfermedades mentales, tales como perazina;
- benzodiazepinas y otros medicamentos utilizados para tratar la ansiedad o alteraciones del sueño;
- narcóticos y otros medicamentos que pueden afectar a la respiración;
- medicamentos utilizados para controlar la epilepsia, tales como fenitoína y ácido valproico;

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- medicamentos utilizados para tratar la presión sanguínea alta o baja, tales como adrenalina y noradrenalina;
- warfarina, un medicamento utilizado para prevenir la coagulación sanguínea;
- antihistamínicos, medicamentos utilizados para resfriados y alergias, tales como rinitis alérgica estacional;
- medicamentos anticolinérgicos, utilizados para aliviar los retortijones en el estómago, espasmos y mareo;
- medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson;
- digoxina, un medicamento utilizado para tratar problemas del corazón;
- medicamentos utilizados para tratar el ritmo cardíaco rápido o irregular;
- algunos medicamentos utilizados para tratar las úlceras de estómago, tales como omeprazol o cimetidina;
- algunos antibióticos, tales como eritromicina y rifampicina;
- algunos medicamentos utilizados para tratar infecciones por hongos (tales como ketoconazol) o por virus (tales como inhibidores de la proteasa, utilizados para tratar infecciones por VIH);
- atropina, un medicamento que puede ser utilizado en algunas gotas para los ojos, o en preparados para la tos y el resfriado;
- adrenalina, un medicamento utilizado en situaciones de emergencia;
- anticonceptivos hormonales (comprimidos para el control de la natalidad).

Esta lista no es completa. Su médico y su farmacéutico tienen más información sobre los medicamentos que deben administrarse con cuidado o bien que deben evitarse mientras tome Leponex. Ellos también saben si los medicamentos que está tomando pertenecen a algún grupo de los listados anteriormente. Coméntelo con ellos.

Toma de Leponex con alimentos y bebidas
Durante el tratamiento con Leponex no beba alcohol.

Informe a su médico si fuma y con cuánta frecuencia toma bebidas que contienen cafeína (café, té, refresco de cola). El cambio brusco de sus hábitos de fumar o de tomar bebidas que contienen cafeína también pueden cambiar los efectos de Leponex.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su médico comentará con usted los beneficios y posibles riesgos de utilizar este medicamento durante el embarazo. Informe inmediatamente a su médico si se queda embarazada durante el tratamiento con Leponex.
Los síntomas siguientes pueden aparecer en los bebés recién nacidos de madres que han utilizado Leponex en el último trimestre (los últimos tres meses de su embarazo): temblor, agarrotamiento de los músculos y/o debilidad, somnolencia, agitación, problemas para respirar y dificultad para alimentarse. Si su bebé desarrolla cualquiera de estos síntomas es necesario que contacte con su médico.

Algunas mujeres que toman algunos medicamentos para tratar enfermedades mentales tienen menstruaciones irregulares o no tienen menstruaciones. Si le ha pasado esto, su menstruación volverá a la normalidad cuando su medicación sea sustituida por Leponex. Esto quiere decir que debe utilizar anticonceptivos efectivos.

Durante el tratamiento con Leponex no debe dar de mamar a su bebé. Clozapina, sustancia activa de Leponex, puede pasar a la leche materna y afectar al bebé.

Conducción y uso de máquinas

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Leponex puede provocar cansancio, somnolencia y ataques, especialmente al inicio del tratamiento. Por tanto, deberá evitar conducir o manejar maquinaria mientras tenga estos síntomas.

Leponex contiene lactosa.
Si su médico le ha informado que tiene intolerancia a algunos azúcares, contacte con su médico antes de tomar este medicamento.

3. Cómo tomar Leponex

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Para reducir en lo posible el riesgo de padecer crisis epilépticas, somnolencia o presión arterial baja, es necesario que su médico incremente la dosis de forma gradual.
Es importante que no cambie la dosis o deje de tomar Leponex sin preguntar antes a su médico. Continúe tomando Leponex durante el tiempo que el médico le haya indicado. Si es usted un paciente de 60 años o mayor puede que su médico le haga iniciar el tratamiento con una dosis menor y que incremente su dosis más gradualmente, ya que podría ser más susceptible a desarrollar algunas reacciones adversas inesperadas (ver sección 2 "Qué necesita saber antes de empezar a tomar Leponex").

Si con esta presentación de comprimidos no puede alcanzar la dosis que le ha sido prescrita, están disponibles otras presentaciones de este medicamento para alcanzar la dosis prescrita.

Tratamiento de la esquizofrenia
El tratamiento se inicia con 12,5 mg (la mitad de un comprimido de 25 mg) una o dos veces el primer día seguido de 25 mg una o dos veces el segundo día. Trague el comprimido con la ayuda de un vaso de agua. Si lo tolera bien, el médico aumentará poco a poco la dosis en cantidades de 25 a 50 mg durante 2 a 3 semanas hasta alcanzar la dosis de 300 mg por día. Puede ser necesario seguir aumentando la dosis en cantidades de 50 a 100 mg dos veces por semana, o preferiblemente una vez por semana.

La dosis diaria efectiva de clozapina es de entre 200 y 450 mg, dividida en varias dosis por día. Algunas personas pueden necesitar dosis superiores. Se permiten dosis de hasta 900 mg al día. A dosis diarias superiores a 450 mg pueden incrementar las reacciones adversas (en particular las convulsiones). Tome siempre la mínima dosis que sea efectiva para usted. La mayoría de los pacientes deben tomar una parte de la dosis por la mañana y otra por la noche. Su médico le dirá exactamente cómo debe dividir su dosis diaria. Si su dosis diaria no excede los 200 mg, entonces podrá tomarla como una dosis única por la noche. Una vez que el tratamiento con Leponex le esté funcionando bien durante algún tiempo, su médico le probará el tratamiento con dosis inferiores. Usted necesitará tomar Leponex como mínimo durante 6 meses.

Tratamiento de trastornos graves del pensamiento en pacientes con enfermedad de Parkinson
Para la dosis en trastornos psicóticos, en la enfermedad de Parkinson, hay disponibles formas farmacéuticas más apropiadas.
La dosis inicial normal de clozapina es de 12,5 mg (medio comprimido de 25 mg) por la noche. Trague el comprimido con la ayuda de un vaso de agua. El médico aumentará lentamente la dosis en cantidades de 12,5 mg, con un máximo de dos aumentos por semana, hasta alcanzar la dosis máxima de hasta 50 mg al final de la segunda semana. Se deberán interrumpir o posponer los incrementos de la dosis deberán si se

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

siente débil, mareado o confuso. Con el fin de evitar tales síntomas, se le medirá la presión arterial durante las primeras semanas de tratamiento.

La dosis diaria efectiva está normalmente entre 25 y 37,5 mg, tomada como una sola dosis por la noche. Solo se puede aumentar a dosis superiores a 50 mg por día en casos excepcionales. La dosis máxima es de 100 mg al día. Tome siempre la dosis mínima que sea efectiva para usted.

Forma de administración
Leponex se administra por vía oral.
El comprimido se puede partir en dosis iguales.

Si toma más Leponex del que debe
Si cree que usted ha tomado más Leponex del que debiera, o si alguien ha tomado alguno de sus comprimidos, póngase en contacto con un médico inmediatamente o solicite ayuda médica de urgencia. También puede llamar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Los síntomas de sobredosis son:
Somnolencia, cansancio, falta de energía, inconsciencia, coma, confusión, alucinaciones, agitación, habla incoherente, entumecimiento en las extremidades, temblor de manos, convulsiones, aumento de la producción de saliva, dilatación de las pupilas, visión borrosa, presión arterial baja, colapso, latido cardíaco acelerado o irregular, respiración superficial o dificultad para respirar.

Si olvidó tomar Leponex
Si olvidó tomar una dosis, tómese la dosis olvidada cuanto antes. Si queda poco tiempo para la siguiente dosis, no se tome la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora que le correspondía. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si ha dejado de tomar Leponex durante más de 48 horas, no inicie el tratamiento sin antes consultar a su médico.

Si interrumpe el tratamiento con Leponex
No interrumpa el tratamiento con Leponex sin preguntárselo a su médico, ya que podría tener síntomas de abstinencia. Estos síntomas incluyen sudoración, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea. **Si presenta alguno de estos síntomas, consulte inmediatamente con su médico. Estos síntomas pueden ir seguidos de otros más graves a menos que reciba tratamiento inmediatamente.** Sus síntomas iniciales podrían producirse de nuevo. Si tiene que interrumpir el tratamiento se recomienda disminuirlo gradualmente en cantidades de 12,5 mg a lo largo de un periodo de 1 a 2 semanas. Su médico le dará las indicaciones de cómo debe reducir su dosis diaria. Si tiene que interrumpir su tratamiento repentinamente, su médico le deberá examinar.
Si su médico decide reiniciar el tratamiento con Leponex y su última dosis de Leponex fue hace dos días o más, deberá hacerlo con la dosis inicial de 12,5 mg.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Algunos efectos adversos pueden ser graves y necesitar atención médica inmediata:
Informe a su médico inmediatamente antes de tomar el próximo comprimido de Leponex si experimenta alguna de las siguientes circunstancias:

- **estreñimiento grave**. Su médico deberá tratarlo para evitar otras complicaciones.
- estreñimiento, dolor abdominal, sensibilidad abdominal, fiebre, sensación de estar hinchado, diarrea con sangre. Esto puede ser indicativo de posible megacolon (agrandamiento del intestino) o infarto/isquemia/necrosis intestinal que podría causar la muerte. Su médico necesitará examinarle.
- dolor en el abdomen, retortijones, abdomen hinchado, vómitos, estreñimiento y falta de paso de gases, que pueden ser signos y síntomas de una obstrucción intestinal.
- dolor ardiente en la parte superior del abdomen, particularmente entre comidas, temprano por la mañana o después de beber bebidas ácidas; heces alquitranadas, negras o con sangre; sensación de estar hinchado, ardor de estómago, náuseas o vómitos, sensación temprana de saciedad (ulceración intestinal del estómago y/o intestino), que puede causar la muerte.
- dolor abdominal fuerte intensificado por el movimiento, náuseas, vómitos, incluso vómitos de sangre (o líquido con lo que parece café molido); el abdomen se vuelve rígido con sensibilidad (rebote) que se extiende desde el punto de perforación a través del abdomen; fiebre y/o escalofríos (perforación intestinal del estómago y/o intestino o rotura del intestino) que pueden causar la muerte.
- número bajo de glóbulos blancos en un análisis de sangre (agranulocitosis).
- signos de **resfriado, fiebre, síntomas parecidos a la gripe, dolor de garganta o cualquier otra infección**. Le deberán hacer un análisis de sangre urgente para saber si estos síntomas están relacionados con el medicamento.
- infección confirmada o alta sospecha de infección, acompañada de fiebre o baja temperatura corporal, respiración rápida anormal, ritmo cardíaco rápido, alteración de la capacidad de reacción y conciencia, disminución de la presión arterial (sepsis).
- signos de infección de las vías respiratorias o neumonía, tales como fiebre, tos, dificultad para respirar, sibilancias (respiración ruidosa).
- ataques epilépticos.
- **ritmo cardíaco rápido e irregular**, incluso cuando está en reposo, **palpitaciones, problemas respiratorios, dolor en el pecho** o **cansancio inusual**. Su médico deberá hacerle un chequeo del corazón y en caso necesario le derivará inmediatamente a un cardiólogo.
- dolor opresivo en el pecho, sensación de opresión, presión o constricción (el dolor en el pecho puede que irradie hacia el brazo izquierdo, mandíbula, cuello y parte superior del abdomen), dificultad para respirar, sudoración, debilidad, mareos, náuseas, vómitos y palpitaciones (síntomas de un ataque al corazón) que pueden causar la muerte. Acuda inmediatamente al médico para un tratamiento de urgencia.
- enfermedad del músculo cardíaco (cardiomiopatía), parada del ritmo cardíaco (paro cardíaco).
- ritmo cardíaco irregular, inflamación del músculo cardíaco (miocarditis) o de la membrana que envuelve el músculo cardíaco (pericarditis), acumulación de líquido alrededor del corazón (derrame pericárdico).
- sensación de presión, pesadez, opresión, constricción, quemazón o asfixia en el pecho (signos de flujo insuficiente de sangre y oxígeno al corazón), que pueden causar la muerte. Su médico deberá evaluar la función del corazón.
- sensación intermitente en el pecho de manera “punzante”, "acelerada" o "agitada" (palpitaciones).
- latidos cardíacos rápidos e irregulares (fibrilación auricular). Puede haber palpitaciones ocasionales del corazón, desmayos, dificultad para respirar o molestias en el pecho. Su médico deberá evaluar la función del corazón.
- pérdida de apetito, abdomen hinchado, dolor en el abdomen, amarilleamiento de la piel, debilidad grave y malestar. Esto puede ser indicativo de posibles alteraciones hepáticas que conllevan reemplazo del tejido hepático normal con tejido cicatrizado llevando a la pérdida de la función hepática, incluyendo aquellos acontecimientos hepáticos que dan lugar a consecuencias potencialmente mortales, tales como insuficiencia hepática (que puede causar la muerte), daño hepático (daño de las células hepáticas, conducto biliar en el hígado, o ambos) y trasplante de hígado.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- incremento repentino de la temperatura corporal, rigidez de los músculos que puede derivar a alteración del estado de consciencia (síndrome neuroléptico maligno), ya que puede tratarse de un efecto adverso grave que requiere tratamiento inmediato.
- inflamación del apéndice (apendicitis).
-

Si se le puede aplicar cualquiera de los casos mencionados anteriormente, informe a su médico inmediatamente antes de tomar el siguiente comprimido de Leponex.

Otros efectos adversos:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):
Somnolencia, mareo, aumento de la producción de saliva.

Frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 personas):
Niveles altos de glóbulos blancos en la sangre (leucocitosis), niveles altos de un determinado tipo de glóbulos blancos en la sangre (eosinofilia), aumento de peso, visión borrosa, dolor de cabeza, temblor, rigidez, inquietud, convulsiones, movimientos bruscos, movimientos anormales, incapacidad para iniciar el movimiento, incapacidad para estarse quieto, cambios en la prueba del electrocardiograma (ECG) del corazón, presión arterial alta, mareo o aturdimiento después de cambiar de posición, sequedad de boca, anomalías menores en las pruebas de la función hepática, pérdida del control de la vejiga, dificultad para orinar, cansancio, aumento de la sudoración, temperatura corporal elevada, trastornos del habla (p. ej., habla arrastrada), desmayo repentino o pérdida de consciencia repentina con debilidad muscular (síncope).

Poco frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 100 personas):
Trastornos del habla (p. ej., tartamudeo), aturdimiento, mareo o desvanecimiento al levantarse desde una posición sentada o tumbada, ya que puede aumentar la posibilidad de caídas.

Raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 1 000 personas):
Niveles altos de glóbulos rojos en la sangre (anemia), inquietud, agitación, confusión, delirio, niveles altos de azúcar en la sangre, diabetes mellitus, coágulo de sangre en los pulmones (tromboembolismo), inflamación del hígado (hepatitis), enfermedad del hígado que causa amarilleamiento de la piel/orina oscura/picor, niveles elevados en la sangre de una enzima llamada creatinina fosfoquinasa, dolor ardiente, intenso en la parte superior del abdomen que se extiende hacia la espalda acompañado de náuseas y vómitos debido a una inflamación del páncreas, desmayos y debilidad muscular debido a un descenso significativo de la presión arterial (colapso circulatorio), dificultad para tragar (lo cual puede provocar la inhalación de comida), náuseas, vómitos y/o pérdida de apetito. Su médico deberá examinar su hígado para detectar signos de obesidad o de aumento de la obesidad, interrupción de la respiración con o sin ronquidos durante el sueño.

Muy raros (pueden afectar hasta a 1 de cada 10 000 personas):
Aumento del número de plaquetas en la sangre con posible coagulación en los vasos sanguíneos, movimientos incontrolados de la boca/lengua y las extremidades, pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos repetitivos (síntomas obsesivo-compulsivos), reacciones de la piel, hinchazón delante de las orejas (por inflamación de las glándulas salivales), dificultad para respirar, niveles muy altos de triglicéridos o colesterol en la sangre, muerte súbita de causa desconocida, erección dolorosa y persistente del pene, si es usted un hombre. Esto se llama priapismo. Si usted tiene una erección que dura más de 4 horas, puede ser necesario un tratamiento médico inmediato para evitar complicaciones adicionales, sangrados o moretones espontáneos, que podrían ser signos de un descenso en el número de plaquetas en sangre, síntomas debidos a niveles de azúcar en sangre no controlados (tales como náuseas o

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

vómitos, dolor en el abdomen, sed excesiva, micción excesiva, desorientación o confusión), náuseas, vómitos, fatiga y pérdida de peso que pueden ser síntomas de inflamación del riñón.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)
Cambios en el registro de ondas cerebrales (electroencefalograma/EEG), diarrea, malestar de estómago, ardor de estómago, malestar de estómago después de comer, debilidad muscular, espasmos musculares, dolor muscular, congestión nasal, enuresis nocturnas, aumento repentino e incontrolable de la presión sanguínea (pseudofeocromocitoma), contracción involuntaria que causa la curvatura del cuerpo hacia un lado (pleurotótonos), trastorno de la eyaculación si usted es un hombre, en el que el semen entra en la vejiga en lugar de eyacular a través del pene (orgasmo seco o eyaculación retrógrada), sarpullido, manchas rojo-púrpura, fiebre o picor debido a la inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación del colon que provoca diarrea, dolor abdominal, fiebre, cambio en el color de la piel, sarpullido en la cara en forma de "mariposa", dolor de las articulaciones, dolor muscular, fiebre y fatiga (lupus eritematoso), síndrome de piernas inquietas (impulso irresistible de mover las piernas o los brazos, generalmente acompañado de sensaciones incómodas durante los periodos de descanso, especialmente durante la tarde o durante la noche y que temporalmente se alivia con el movimiento), síntomas de presión arterial baja, tales como aturdimiento, mareos, desmayos, visión borrosa, fatiga inusual, piel fría y húmeda o náuseas, signos de coágulos de sangre en las venas, especialmente en las piernas (síntomas que incluyen hinchazón, dolor y enrojecimiento de las piernas), que pueden desplazarse a través de los vasos sanguíneos a los pulmones causando dolor de pecho y dificultad para respirar, sudoración abundante, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea (síntomas de síndrome colinérgico), disminución importante de la producción de orina (signos de fallo del riñón), reacción alérgica (hinchazón principalmente en la cara, boca y garganta, así como en la lengua, que puede producir picor o ser dolorosa), dolor agudo en el pecho con dificultad para respirar y con o sin tos, aparición o aumento de debilidad muscular, espasmos musculares, dolor muscular. Esto puedo indicar una posible alteración muscular (rabdomiolisis). Su médico necesitará examinarle; dolor agudo en el pecho o abdominal con dificultad para respirar con o sin tos o fiebre; durante el uso de Leponex se han notificado reacciones cutáneas extremadamente intensas y graves, como reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos (síndrome DRESS). La reacción adversa de la piel puede aparecer como erupciones con o sin ampollas. Se puede presentar irritación de la piel, edema y fiebre y síntomas similares a los de la gripe. Los síntomas del síndrome DRESS generalmente aparecen aproximadamente de 2 a 6 semanas (posiblemente hasta 8 semanas) después de que comienza el tratamiento.

En pacientes de edad avanzada con demencia, se ha notificado un pequeño aumento del número de casos de muerte en los pacientes que toman antipsicóticos comparado con los que no lo toman.
Cáncer sanguíneo (malignidad hematológica)
Se ha observado un pequeño aumento en el riesgo de desarrollar cáncer sanguíneo en pacientes que toman clozapina, especialmente en casos de tratamiento prolongado.

Los síntomas podrían incluir:
• fiebre inexplicable
• ganglios inflamados
• infecciones persistentes durante el tratamiento
• pérdida de peso
• cansancio extremo
• enrojecimiento
• sudores nocturnos
• facilidad para moretones o sangrado.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Leponex

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Leponex 200 mg comprimidos

- El principio activo es clozapina. Cada comprimido contiene 200 mg de clozapina.
- Los demás componentes son estearato de magnesio, sílice coloidal anhidra, povidona K30, talco, almidón de maíz y lactosa monohidrato.

Aspecto del producto y contenido del envase

Comprimido amarillo claro, redondo y biconvexo, con una ranura en forma de cruz en ambas caras del comprimido y con grabado V C 7 en una de las caras.

Diámetro: aproximadamente 13 mm.

Leponex 200 mg comprimidos está disponible en blísteres de PVC/PE/PVdC-aluminio con 20, 30, 40, 50 o 100 comprimidos, o blíster unidosis perforado de PVC/PE/PVdC-aluminio con 20 × 1, 30 × 1, 40 × 1, 50 × 1 y 100 × 1 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización

Viatris Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart, Dublín 15
Dublín

Responsable de la fabricación

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Madaus GmbH
Lütticher Straße 5
53842 Troisdorf Alemania

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:
Viatris Pharmaceuticals, S.L.
C/ General Aranaz, 86
28027 - Madrid
España

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

Bélgica	Leponex 200 mg tabletten
Croacia	Leponex 200 mg tablete
República Checa	Leponex 200 mg tablety
Finlandia	Leponex
Alemania	Leponex 200 mg Tabletten
Grecia	Leponex
Hungría	Leponex 200mg tabletta
Irlanda	Clozaril 200 mg tablets
Luxemburgo	Leponex 200 mg comprimés
España	Leponex 200 mg comprimidos
Eslovenia	Leponex 200 mg tablete

Fecha de la última revisión de este prospecto: febrero 2026
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) https://www.aemps.gob.es/

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios