

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Solifenacina Sandoz 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG  
Solifenacina Sandoz 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido recubierto con película contiene 5 mg de solifenacina succinato, equivalente a 3,8 mg de solifenacina.

Excipiente(s) con efecto conocido:

Cada comprimido recubierto con película contiene 49,04 mg de lactosa (como monohidrato).

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de solifenacina succinato, equivalente a 7,5 mg de solifenacina.

Excipiente(s) con efecto conocido: cada comprimido contiene 98,09 mg de lactosa (como monohidrato).

Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido recubierto con película.

Solifenacina Sandoz 5 mg Comprimido de color amarillo claro, redondo, recubierto con película con el número 05 impreso en una de las caras.

Solifenacina Sandoz 10 mg: Comprimido de color rosa claro, redondo, recubierto con película con el número 10 impreso en una de las caras y ranurado en la otra.

El comprimido recubierto con película de 10 mg se puede dividir en dosis iguales.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento sintomático de la incontinencia de urgencia y/o aumento de la frecuencia urinaria y la urgencia que puede producirse en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva.

#### 4.2. Posología y forma de administración

##### Posología

*Adultos incluyendo edad avanzada:*

La dosis recomendada es de 5 mg de solifenacina succinato una vez al día. En caso necesario, se puede aumentar la dosis a 10 mg de solifenacina succinato una vez al día.

Poblaciones especiales:

*Población pediátrica*

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia en niños y adolescentes menores de 18 años. Por tanto, solifenacina no se debe utilizar en niños.

*Pacientes con insuficiencia renal*

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina  $>30$  ml/min). Los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min) se deben tratar con precaución y no deben recibir más de 5 mg una vez al día (ver sección 5.2).

#### *Pacientes con insuficiencia hepática*

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. Los pacientes con insuficiencia hepática moderada (Puntuación de Child-Pugh de 7 a 9) deben ser tratados con precaución y no deben recibir más de 5 mg una vez al día (ver sección 5.2).

#### *Pacientes en tratamiento con inhibidores potentes del citocromo P450 3A4*

La dosis máxima de solifenacina se debe limitar a 5 mg cuando se administre concomitantemente con ketoconazol o con dosis terapéuticas de otros potentes inhibidores del CYP3A4 por ejemplo ritonavir, nelfinavir, itraconazol (ver sección 4.5).

#### Forma de administración

Solifenacina Sandoz se debe tomar por vía oral sin masticar o triturar el comprimido y se debe tragar con líquidos. Se puede tomar con o sin alimentos.

### **4.3. Contraindicaciones**

Solifenacina está contraindicada en pacientes con:

- retención urinaria, trastornos gastrointestinales graves (incluyendo megacolon tóxico), miastenia gravis o glaucoma de ángulo estrecho y en pacientes que presentan riesgo de estas patologías,
- pacientes hipersensibles al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1,
- pacientes sometidos a hemodiálisis (ver sección 5.2),
- pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 5.2),
- pacientes con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática moderada en tratamiento concomitante con un inhibidor potente de CYP3A4, por ejemplo, ketoconazol (ver sección 4.5).

### **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Antes de iniciar el tratamiento con solifenacina se debe valorar otras causas de micción frecuente (insuficiencia cardíaca o enfermedad renal). Si se presenta una infección del tracto urinario, se debe iniciar el tratamiento antibacteriano adecuado.

Solifenacina se debe usar con precaución en pacientes con:

- obstrucción clínicamente significativa de la salida vesical con riesgo de retención urinaria,
- trastornos obstructivos gastrointestinales,
- riesgo de motilidad gastrointestinal disminuida,
- insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min; ver sección 4.2 y 5.2), y las dosis no deben exceder de 5 mg en estos pacientes,
- insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9; ver sección 4.2 y 5.2), y las dosis no deben exceder de 5 mg en estos pacientes,
- uso concomitante de un inhibidor potente de la CYP3A4, por ejemplo ketoconazol (ver 4.2 y 4.5),
- hernia de hiato/reflujo gastro-esofágico y/o que estén en tratamiento con medicamentos (como bifosfonatos) que puedan causar o empeorar la esofagitis,
- neuropatía autonómica.

Se ha notificado angioedema con obstrucción de vías respiratorias en algunos pacientes en tratamiento con solifenacina succinato. Si aparece angioedema, se debe interrumpir el tratamiento con solifenacina succinato y se debe instaurar el tratamiento adecuado y/o las medidas adecuadas.

Todavía no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con hiperactividad del detrusor por causa neurógena.

Se han observado casos de prolongación del intervalo QT y de Torsades de Pointes en pacientes con factores de riesgo, tales como síndrome de QT largo preexistente e hipopotasemia.

Se ha notificado reacción anafiláctica en algunos pacientes en tratamiento con solifenacina succinato. En pacientes que desarrollan reacciones anafilácticas, se debe interrumpir el tratamiento con solifenacina succinato y se debe instaurar el tratamiento adecuado y/o las medidas adecuadas.

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

El máximo efecto de solifenacina puede alcanzarse a partir de las 4 semanas de tratamiento.

#### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

##### Interacciones farmacológicas

La medicación concomitante con otros medicamentos con propiedades anticolinérgicas puede dar lugar a efectos terapéuticos y efectos adversos más pronunciados. Se debe dejar un intervalo de aproximadamente una semana después de interrumpir el tratamiento con este medicamento antes de comenzar con otro tratamiento anticolinérgico. El efecto terapéutico de solifenacina se puede ver reducido por la administración concomitante de agonistas de los receptores colinérgicos.

Solifenacina puede reducir el efecto de los medicamentos que estimulan la motilidad del tubo digestivo como metoclopramida y cisaprida.

##### Interacciones farmacocinéticas

Estudios *in vitro* han demostrado que a concentraciones terapéuticas, solifenacina no inhibe las enzimas CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 o 3A4 derivadas de microsomas hepáticos humanos. Por tanto, es improbable que solifenacina altere el aclaramiento de los medicamentos metabolizados por dichas enzimas CYP.

##### Efecto de otros medicamentos sobre la farmacocinética de solifenacina

Solifenacina es metabolizada por el CYP3A4. La administración concomitante de ketoconazol (200 mg/día), un potente inhibidor del CYP3A4, duplicó el AUC de solifenacina mientras que la administración de ketoconazol a dosis de 400 mg/día triplicó el AUC de solifenacina. Por tanto, la dosis máxima de solifenacina se debe limitar a 5 mg, cuando se administre concomitantemente con ketoconazol o con dosis terapéuticas de otros potentes inhibidores del CYP3A4 (p.ej., ritonavir, nelfinavir, itraconazol) (ver sección 4.2). El tratamiento concomitante de solifenacina y un inhibidor potente de CYP3A4 está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática moderada.

No se han estudiado los efectos de la inducción enzimática sobre la farmacocinética de la solifenacina y sus metabolitos, ni el efecto de los sustratos con elevada afinidad por el CYP3A4 sobre la exposición de solifenacina. Dado que solifenacina es metabolizada por el CYP3A4, son posibles las interacciones farmacocinéticas con otros sustratos con elevada afinidad por el CYP3A4 (p.ej., verapamilo, diltiazem) e inductores del CYP3A4 (por ejemplo: rifampicina, fenitoína, carbamazepina).

##### Efecto de solifenacina sobre la farmacocinética de otros medicamentos

###### *Anticonceptivos orales*

La administración de solifenacina no mostró interacción farmacocinética de solifenacina con los anticonceptivos orales de combinación (etinilestradiol/levonorgestrel).

###### *Warfarina*

La administración de solifenacina no alteró la farmacocinética de *R*-warfarina ni de *S*-warfarina ni su efecto sobre el tiempo.

### *Digoxina*

La administración de solifenacina no mostró efectos sobre la farmacocinética de digoxina.

## **4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia**

### Embarazo

No se dispone de datos clínicos sobre mujeres que se hayan quedado embarazadas en tratamiento con solifenacina. Los estudios realizados en animales no muestran efectos dañinos directos sobre la fertilidad, el desarrollo embrional/fetal o el parto (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en humanos. No se recomienda solifenacina durante el embarazo y en mujeres con riesgo de quedarse embarazadas que no usen medidas anticonceptivas.

### Lactancia

No se dispone de datos sobre la excreción de solifenacina en la leche materna. En ratones, solifenacina y/o sus metabolitos se excretaron en la leche y dieron lugar a un insuficiente desarrollo dosis dependiente de los ratones neonatos (ver sección 5.3). Por tanto, se debe evitar el uso de este medicamento durante la lactancia.

## **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

La influencia de solifenacina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña a moderada. Dado que solifenacina, al igual que otros anticolinérgicos puede provocar visión borrosa, y de forma poco frecuente, somnolencia y fatiga (ver sección 4.8), la capacidad para conducir y utilizar máquinas se puede ver afectada negativamente.

## **4.8. Reacciones adversas**

### Resumen del perfil de seguridad

Debido al efecto farmacológico de solifenacina, este medicamento puede provocar efectos adversos anticolinérgicos (en general) de intensidad leve o moderada. La frecuencia de los efectos adversos anticolinérgicos está relacionada con la dosis.

La reacción adversa notificada con mayor frecuencia con solifenacina fue sequedad de boca. Se produjo en un 11% de los pacientes tratados con 5 mg una vez al día, en un 22% de los pacientes tratados con 10 mg una vez al día y en un 4% de los pacientes tratados con placebo. La intensidad de sequedad de boca fue generalmente leve y sólo ocasionalmente dio lugar a la interrupción del tratamiento. En general, el cumplimiento terapéutico fue muy elevado (aproximadamente el 99%) y aproximadamente un 90% de los pacientes tratados con solifenacina completaron todo el periodo de estudio de 12 semanas de tratamiento.

### Lista tabulada de reacciones adversas

<b>Clasificación de órganos del Sistema MedDRA</b>	<b>Muy Frecuentes</b> ≥1/10	<b>Frecuentes</b> ≥1/100, <1/10	<b>Poco frecuentes</b> ≥1/1.000, <1/100	<b>Raros</b> ≥1/10.000, <1/1,000	<b>Muy raros</b> <1/10.000	<b>Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)</b>
<b>Infecciones e infestaciones</b>			Infección del tracto urinario Cistitis			
<b>Trastornos del sistema</b>						Reacciones anafilácticas*

<b>inmuno- lógico</b>						
<b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>						Disminución del apetito*, hiperpotasemia*
<b>Trastornos psiquiátricos</b>					Alucinaciones* Estado de confusión*	Delirio*
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>			Somnolencia Disgeusia	Mareo* Dolor de cabeza*		
<b>Trastornos oculares</b>		Visión borrosa	Ojos secos			Glaucoma*
<b>Trastornos cardiacos</b>						Torsade de Pointes*, Intervalo QT del electrocardiograma prolongado*, fibrilación atrial*, Palpitaciones*, Taquicardia*
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>			Sequedad nasal			Disfonía*
<b>Trastornos gastro-intestinales</b>	Sequedad de boca	Estreñimiento Náuseas Dispepsia Dolor abdominal	Enfermedades de reflujo gastroesofágico Garganta seca	Obstrucción colónica Impactación fecal Vómitos*		Íleo*, molestias abdominales*
<b>Trastornos hepato-biliares</b>						Trastornos hepáticos*, Prueba anómala de función hepática*
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>			Piel seca	Prurito*, Erupción cutánea*	Eritema multiforme* Urticaria*, Angioedema*	Dermatitis exfoliativa*
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido</b>						Pérdida de fuerza muscular*

<b>conjuntivo</b>						
<b>Trastornos renales y urinarios</b>			Dificultad de micción	Retención urinaria		Insuficiencia renal*
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración</b>			Fatiga Edema periférico			

\* Observados a partir de la comercialización.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaram.es](http://www.notificaram.es)

## 4.9. Sobredosis

### Síntomas

La sobredosis con solifenacina succinato puede producir potencialmente efectos anticolinérgicos graves. La dosis más alta de solifenacina succinato administrada accidentalmente a un único paciente fue de 280 mg durante un periodo de 5 horas, produciendo cambios en el estado mental que no requirieron hospitalización.

### Tratamiento

En caso de sobredosis con solifenacina succinato el paciente debe ser tratado con carbón activo. El lavado gástrico es útil si se realiza dentro de la hora siguiente, pero no se debe inducir el vómito.

Como ocurre con otros anticolinérgicos, los síntomas se pueden tratar de la siguiente manera:

- efectos anticolinérgicos centrales graves como alucinaciones o excitación pronunciada: se debe tratar con fisostigmina o carbacol,
- convulsiones o excitación pronunciada: se debe tratar con benzodiazepinas,
- insuficiencia respiratoria: se debe tratar con respiración artificial,
- taquicardia: se debe tratar con betabloqueantes,
- retención urinaria: se debe tratar con sondaje,
- midriasis: se debe tratar con un colirio de pilocarpina y/o colocando al paciente en una habitación oscura.

Como ocurre con otros antimuscarínicos en caso de sobredosis, se debe prestar especial atención en los pacientes que tienen riesgo conocido de prolongación del intervalo QT (p.ej., hipopotasemia, bradicardia y administración concomitante con medicamentos que se conoce que prolongan el intervalo QT) y enfermedades cardíacas relevantes pre-existentes (p.ej., isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva).

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: urológicos, agentes para la frecuencia urinaria e incontinencia, código ATC: G04BD08.

#### Mecanismo de acción

Solifenacina es un antagonista competitivo específico del receptor colinérgico.

La vejiga urinaria está inervada por nervios colinérgicos parasimpáticos. La acetilcolina contrae el músculo liso detrusor mediante los receptores muscarínicos, de los cuales, el subtipo M<sub>3</sub> está implicado de forma predominante. Los estudios farmacológicos *in vitro* e *in vivo* indican que solifenacina es un inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos subtipo M<sub>3</sub>. Además, solifenacina ha demostrado ser un antagonista específico de los receptores muscarínicos mostrando baja o ninguna afinidad por otros diversos receptores y por los canales iónicos analizados.

### Efectos farmacodinámicos

El tratamiento con solifenacina administrado en dosis de 5 mg y 10 mg al día se estudió en varios ensayos clínicos doble ciego, aleatorizados y controlados, realizados en hombres y mujeres con vejiga hiperactiva. Como se muestra en la tabla siguiente, tanto las dosis de 5 mg como las de 10 mg de solifenacina produjeron mejorías estadísticamente significativas en los parámetros primarios y secundarios en comparación con placebo. Se observó eficacia a partir de la primera semana tras comenzar con el tratamiento, estabilizándose durante un periodo de 12 semanas. Un estudio abierto a largo plazo demostró que la eficacia se mantenía durante al menos 12 meses. Después de 12 semanas de tratamiento, aproximadamente un 50% de los pacientes que padecían incontinencia antes del tratamiento, dejaron de padecerla, y además un 35% de los pacientes alcanzó una frecuencia de micción de menos de 8 micciones por día. El tratamiento de los síntomas de vejiga hiperactiva además produce un efecto beneficioso sobre varias medidas de calidad de vida, como la percepción de salud general, impacto de la incontinencia, limitaciones de funciones, limitaciones físicas, limitaciones sociales, emociones, intensidad de los síntomas, medidas de gravedad y sueño/energía.

*Resultados (datos agrupados) de cuatro estudios controlados fase III con una duración de tratamiento de 12 semanas.*

	Placebo	Solifenacina 5 mg, 1 vez al día	Solifenacina 10 mg, 1 vez al día	Tolterodina 2 mg, 2 veces al día
<b>Nº de micciones/24 h</b>				
Media basal	11,9	12,1	11,9	12,1
Reducción media desde el inicio	1,4	2,3	2,7	1,9
% cambio desde el inicio	(12%)	(19%)	(23%)	(16%)
n	1138	552	1158	250
Valor p*		<0,001	<0,001	0,004
<b>Nº de episodios de urgencia/24h</b>				
Media basal	6,3	5,9	6,2	5,4
Reducción media desde el inicio	2,0	2,9	3,4	2,1
% cambio desde el inicio	(32%)	(49%)	(55%)	(39%)
n	1124	548	1151	250
Valor p*		<0,001	<0,001	0,031
<b>Nº de episodios de incontinencia/24h</b>				
Media basal	2,9	2,6	2,9	2,3
Reducción media desde el inicio	1,1	1,5	1,8	1,1
% cambio desde el inicio	(38%)	(58%)	(62%)	(48%)
n	781	314	778	157
Valor p*		<0,001	<0,001	0,009
<b>Nº de episodios de nocturia/24h</b>				
Media basal	1,8	2,0	1,8	1,9
Reducción media desde el inicio	0,4	0,6	0,6	0,5
% cambio desde el inicio	(22%)	(30%)	(33%)	(26%)
n	1005	494	1035	232
Valor p*		0,025	<0,001	0,199

### Volumen de evacuado/micción

Media basal	166 ml	146 ml	163 ml	147 ml
Reducción media desde el inicio	9 ml	32 ml	43 ml	24 ml
% cambio desde el inicio	(5%)	(21%)	(26%)	(16%)
n	1135	552	1156	250
Valor p*		<0,001	<0,001	<0,001

### Nº de compresas/24h

Media basal	3,0	2,8	2,7	2,7
Reducción media desde el inicio	0,8	1,3	1,3	1,0
% cambio desde el inicio	(27%)	(46%)	(48%)	(37%)
n	238	236	242	250
Valor p*		<0,001	<0,001	0,010

Nota: En 4 de los estudios fundamentales, se usó solifenacina 10 mg y placebo. En 2 de los 4 estudios se empleó además solifenacina 5 mg y en uno de estos estudios incluyó tolterodina 2 mg dos veces/día. No todos los parámetros ni grupos de tratamiento se evaluaron en cada estudio individual. Por tanto, las cifras de pacientes que se indican pueden presentar desviaciones por parámetro y grupo de tratamiento.

\*Valor de p para la comparación por parejas frente a placebo.

## 5.2. Propiedades farmacocinéticas

### Absorción

Después de tomar solifenacina comprimidos, las concentraciones plasmáticas máximas de solifenacina ( $C_{máx}$ ) se alcanzan después de 3 a 8 horas, El  $t_{máx}$  es independiente de la dosis, La  $C_{máx}$  y el área bajo la curva (AUC) aumentan en proporción a la dosis entre 5 y 40 mg. La biodisponibilidad absoluta es aproximadamente del 90%.

La ingesta de alimentos no afecta a la  $C_{máx}$  ni al AUC de solifenacina.

### Distribución

El volumen de distribución aparente de solifenacina tras la administración intravenosa es aproximadamente 600 litros. Solifenacina se une en gran medida (aproximadamente un 98%) a proteínas plasmáticas, principalmente a la glucoproteína ácida  $\alpha_1$ .

### Biotransformación

Solifenacina es ampliamente metabolizada por el hígado, principalmente por el citocromo P450 3A4 (CYP3A4). No obstante, existen vías metabólicas alternativas que pueden contribuir al metabolismo de solifenacina. El aclaramiento sistémico de solifenacina es de alrededor de 9,5 l/h y la semivida terminal es de 45-68 horas. Después de la dosificación oral, se ha identificado en el plasma un metabolito farmacológicamente activo (4R-hidroxi solifenacina) y tres inactivos (N-glucurónido, N-óxido y 4R-hidroxi-N-óxido de solifenacina), además de solifenacina.

### Eliminación

Después de una administración única de 10 mg de solifenacina [marcada con  $C^{14}$ ], aproximadamente el 70% de la radiactividad se detectó en orina y un 23% en heces durante 26 días. En orina, aproximadamente un 11% de la radiactividad se recuperó como sustancia activa inalterada; alrededor de un 18% como el metabolito N-óxido, 9% como el metabolito 4R-hidroxi-N-óxido y 8% como el metabolito 4R-hidroxi (metabolito activo).

### Linealidad/No linealidad

La farmacocinética es lineal en el intervalo de dosis terapéutica.

### Otras poblaciones especiales

*Pacientes de edad avanzada*



No se precisa ajuste de dosis en función de la edad del paciente. Los estudios en pacientes de edad avanzada han demostrado que la exposición a solifenacina, expresada como el AUC, después de la administración de solifenacina succinato (5 mg y 10 mg una vez al día) fue similar en pacientes de edad avanzada (edades entre 65 y 80 años) y en sujetos jóvenes sanos (edad inferior a 55 años). La velocidad media de la absorción expresada como  $t_{máx}$  fue ligeramente más lenta en los pacientes de edad avanzada y la semivida terminal fue aproximadamente un 20% más larga en los de edad avanzada. Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas.

No se ha establecido la farmacocinética de solifenacina en niños ni adolescentes.

#### *Sexo*

La farmacocinética de solifenacina no está influenciada por el sexo.

#### *Raza*

La farmacocinética de solifenacina no está influenciada por la raza.

#### *Insuficiencia renal*

El AUC y la  $C_{máx}$  de solifenacina en pacientes con insuficiencia renal leve y moderada, no fue significativamente diferente de la observada en voluntarios sanos. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina  $\leq 30$  ml/min) la exposición a solifenacina fue significativamente mayor que en los controles con incrementos de aproximadamente un 30% en la  $C_{máx}$ , de más del 100% en el AUC y de más del 60% en el  $t_{1/2}$ . Se observó una relación estadísticamente significativa entre el aclaramiento de creatinina y el aclaramiento de solifenacina.

No se ha estudiado la farmacocinética en pacientes sometidos a hemodiálisis.

#### *Insuficiencia hepática*

En pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9) la  $C_{máx}$  no se vio afectada, el AUC aumentó un 60% y el  $t_{1/2}$  se duplicó. No se ha estudiado la farmacocinética de solifenacina en pacientes con insuficiencia hepática grave.

### **5.3. Datos preclínicos sobre seguridad**

Los datos preclínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales sobre farmacología de seguridad, toxicidad de dosis repetidas, fertilidad, desarrollo embrionofetal, genotoxicidad y potencial carcinogénico. En los estudios de desarrollo pre- y postnatal en ratones, el tratamiento con solifenacina de la madre durante la lactancia causó un índice de supervivencia postpartum inferior y dosis-dependiente, disminución del peso de las crías y desarrollo físico más lento a niveles clínicamente relevantes.

Se observó un aumento de la mortalidad dosis dependiente en ratones jóvenes, sin signos clínicos anteriores, que comenzaron a tratarse el día 10 o el día 21 de vida, con dosis que suponen un efecto farmacológico. La mortalidad en los dos grupos de ratones jóvenes fue más elevada que en los ratones adultos. La exposición plasmática en los ratones jóvenes que comenzaron a tratarse el día 10 de vida fue superior a la de los ratones adultos; la exposición sistémica desde el día 21 de vida en adelante fue comparable a la de los ratones adultos. Se desconocen las implicaciones clínicas del aumento de la mortalidad en ratones jóvenes.

## **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

### **6.1. Lista de excipientes**

#### **Núcleo**

Lactosa monohidrato  
Hipromelosa  
Almidón de maíz pregelatinizado  
Estearato de magnesio

#### **Recubrimiento**

Hipromelosa  
Macrogol 6000  
Talco  
Dióxido de titanio (E-171)

*Además, los comprimidos recubiertos con película de 5 mg contienen:*

Óxido de hierro amarillo (E-172)

*Además, los comprimidos recubiertos con película de 10 mg contienen:*

Óxido de hierro rojo (E-172)

### **6.2. Incompatibilidades**

No procede.

### **6.3. Periodo de validez**

3 años.

Los comprimidos en frasco de HDPE tienen una caducidad tras la primera apertura del envase de 6 meses.

### **6.4. Precauciones especiales de conservación**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Ver sección 6.3 para las condiciones de conservación tras la primera apertura del envase en frasco.

### **6.5. Naturaleza y contenido del envase**

Los comprimidos recubiertos con película están disponibles en blísteres de PVC/AL o en frascos de polietileno (con tapón de rosca de polipropileno que contiene un desecante) dentro de envases de cartón.

Tamaños de envase en blíster: 10, 20, 30, 90 o 100 comprimidos recubiertos con película.

Tamaños de envase en frasco de polietileno: 30, 56, 60, 84, 90, 100 o 250 comprimidos recubiertos con película.

Puede que no todos los tamaños de envase estén comercializados.

### **6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

## **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Centro Empresarial Parque Norte  
Edificio Roble  
C/ Serrano Galvache, 56  
28033 Madrid  
España

#### **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Solifenacina Sandoz 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG: 80.649  
Solifenacina Sandoz 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG: 80.648

#### **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Fecha de la primera autorización: 12/02/2016  
Fecha de la última renovación: 21/10/2020

#### **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Octubre 2020

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.