

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Bilastina Flas Normon 10 mg comprimidos bucodispersables EFG

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido bucodispersable contiene 10 mg de bilastina.

Excipiente con efecto conocido: cada comprimido bucodispersable contiene 1.30 mg de aspartamo (E-951), 0,0097 mg de alcohol bencílico y 0,0001 mg de etanol.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido bucodispersable.

Comprimidos blancos o casi blancos, redondos, planos, biselados, marcados con “B10” en una cara y anónimos en la otra de 7,6 mm de diámetro.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1. Indicaciones terapéuticas

Tratamiento sintomático de la rinoconjuntivitis alérgica (estacional y perenne) y de la urticaria. Bilastina Flas Normon 10 mg comprimidos bucodispersables está indicado en niños de 2 a 11 años de edad con un peso corporal mínimo de 15 kg.

#### 4.2. Posología y forma de administración

##### 1.1. Posología

##### *Población pediátrica*

- Niños de 2 a 11 años de edad con un peso corporal mínimo de 15 kg: 10 mg de bilastina (1 comprimido bucodispersable) una vez al día para el alivio de los síntomas de la rinoconjuntivitis alérgica (rinitis alérgica estacional y perenne) y de la urticaria.

El comprimido bucodispersable debe administrarse una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos o de zumos de frutas (ver sección 4.5).

En adultos y adolescentes (mayores de 12 años de edad) la administración apropiada es bilastina 20 mg en comprimidos.

##### Duración del tratamiento:

Para rinoconjuntivitis alérgica el tratamiento debe limitarse al periodo de exposición a los alérgenos. Para rinitis alérgica estacional el tratamiento puede interrumpirse cuando se hayan resuelto los síntomas

y reiniciarse en caso de que estos reaparezcan. En rinitis alérgica perenne se puede proponer al paciente el tratamiento continuado durante los periodos de exposición a los alérgenos. Para urticaria la duración del tratamiento depende del tipo, duración y evolución de los síntomas.

#### *Poblaciones especiales*

##### Insuficiencia renal

No se ha establecido la seguridad y eficacia de bilastina en niños con insuficiencia renal. Los estudios realizados en grupos de adultos con un riesgo especial (pacientes con insuficiencia renal) indican que no se requiere ajustar la dosis de bilastina en adultos (ver sección 5.2).

##### Insuficiencia hepática

No se ha establecido la seguridad y eficacia de bilastina en niños con insuficiencia hepática. No hay experiencia clínica en pacientes adultos ni pediátricos con insuficiencia hepática. Sin embargo, dado que bilastina no se metaboliza y se elimina inalterada en orina y heces, no se espera que la insuficiencia hepática aumente la exposición sistémica por encima del margen de seguridad en pacientes adultos. Por ello, no se requiere ajustar la dosis en pacientes adultos con insuficiencia hepática (ver sección 5.2).

##### Forma de administración

Vía oral

El comprimido bucodispersable se debe colocar en la boca donde se disuelve rápidamente en la saliva, por lo que se puede tragar fácilmente. Alternativamente, el comprimido bucodispersable se puede dispersar en agua antes de la administración. Esto es altamente recomendable en niños menores de 6 años ya que son propensos a atragantarse con los comprimidos. No se debe utilizar zumo de pomelo o cualquier otro zumo de fruta para la dispersión (ver sección 4.5).

#### **4.3. Contraindicaciones**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1.

#### **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo**

##### *Población pediátrica*

La eficacia y seguridad de bilastina en niños menores de 2 años de edad y con peso corporal inferior a 15 kg no han sido establecidas, por lo que bilastina no se debería utilizar en niños menores de 2 años o con un peso inferior a 15 kg.

En pacientes con insuficiencia renal moderada o severa, la administración concomitante de bilastina con inhibidores de la P-glicoproteína, tales como p.ej., ketoconazol, eritromicina, ciclosporina, ritonavir o diltiazem, puede aumentar los niveles plasmáticos de bilastina y por tanto aumentar el riesgo de efectos adversos de bilastina. Por ello, la administración concomitante de bilastina e inhibidores de la P-glicoproteína debe evitarse en pacientes con insuficiencia renal moderada o severa.

**Se han notificado casos de prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma en pacientes que toman bilastina (ver secciones 4.8, 4.9 y 5.1). Se sospecha que los medicamentos que causan prolongación del intervalo QT/QTc aumentan el riesgo de Torsade de pointes.**

**Por lo tanto, se recomienda precaución al administrar bilastina a pacientes que tienen un mayor riesgo de sufrir una prolongación del intervalo QT/QTc. Esto incluye a pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas; pacientes con hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia; pacientes**

con prolongación conocida del intervalo QT o bradicardia significativa; pacientes con administración concomitante de otros medicamentos asociados con la prolongación del intervalo QT/QTc.

#### Excipientes

##### Sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido bucodispersable; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

##### Aspartamo

Este medicamento contiene 1,30 mg de aspartamo (E-951) en cada comprimido bucodispersable. El aspartamo contiene una fuente de fenilalanina que puede ser perjudicial en caso de padecer fenilcetonuria (FCN), una enfermedad genética rara en la que la fenilalanina se acumula debido a que el organismo no es capaz de eliminarla correctamente.

No hay datos clínicos o preclínicos disponibles que permitan evaluar el uso de aspartamo en lactantes por debajo de 12 semanas de edad.

##### Alcohol bencílico

Este medicamento contiene 0,0097 mg de alcohol bencílico en cada comprimido bucodispersable.

El alcohol bencílico puede provocar reacciones alérgicas.

El alcohol bencílico se ha relacionado con el riesgo de efectos adversos graves que incluyen problemas respiratorios ("síndrome de jadeo") en niños.

No se debe administrar este medicamento a recién nacidos (hasta de 4 semanas de edad).

Este medicamento no se debe utilizar durante más de una semana en niños menores de 3 años de edad.

Se requiere precaución en personas embarazadas o en periodo de lactancia. Esto es debido a que se pueden acumular grandes cantidades de alcohol bencílico en su organismo y provocar efectos adversos (acidosis metabólica).

Se requiere precaución en personas con enfermedades de hígado o riñón. Esto es debido a que se pueden acumular grandes cantidades de alcohol bencílico en su organismo y provocar efectos adversos (acidosis metabólica).

##### Etanol

Este medicamento contiene menos de 0,0001 mg de alcohol (etanol) en cada comprimido bucodispersable. La cantidad en miligramos de este medicamento es equivalente a menos de 1 ml de cerveza o 1 ml de vino.

La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible.

#### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos y se resumen a continuación.

Interacción con alimentos: Los alimentos reducen significativamente la biodisponibilidad oral de bilastina 20 mg comprimidos en un 30% y de bilastina 10 mg comprimidos bucodispersables en un 20%.

Interacción con zumo de pomelo: La administración concomitante de bilastina 20 mg y zumo de pomelo disminuyó la biodisponibilidad de bilastina en un 30%. Este efecto puede ocurrir también con otros zumos de frutas. El grado de reducción en la biodisponibilidad puede variar entre fabricantes y frutos. El mecanismo responsable de esta interacción es la inhibición del OATP1A2, un transportador de

captación, del cual bilastina es sustrato (ver sección 5.2). Los medicamentos que sean sustratos o inhibidores de OATP1A2, tales como ritonavir o rifampicina, podrían igualmente reducir las concentraciones plasmáticas de bilastina.

Interacción con ketoconazol o eritromicina: La administración concomitante de bilastina 20 mg una vez al día y ketoconazol 400 mg una vez al día o eritromicina 500 mg 3 veces al día aumentó el AUC de bilastina en 2 veces y la  $C_{max}$  en 2-3 veces. Estos cambios se pueden explicar debido a la interacción con transportadores intestinales de excreción, ya que bilastina es sustrato de la P-gp y no es metabolizada (ver sección 5.2). Estos cambios no parecen afectar al perfil de seguridad de bilastina y ketoconazol o eritromicina, respectivamente. Otros medicamentos que sean sustratos o inhibidores de la P-gp, tal como ciclosporina, podrían igualmente aumentar las concentraciones plasmáticas de bilastina.

Interacción con diltiazem: La administración concomitante de bilastina 20 mg una vez al día y diltiazem 60 mg una vez al día aumentó la  $C_{max}$  de bilastina un 50%. Este efecto se puede explicar por la interacción con transportadores intestinales de excreción (ver sección 5.2) y no parece afectar al perfil de seguridad de bilastina.

Interacción con alcohol: El rendimiento psicomotor tras la administración concomitante de alcohol y 20 mg de bilastina una vez al día fue similar al observado tras la administración de alcohol y placebo.

Interacción con lorazepam: La administración concomitante de bilastina 20 mg una vez al día y lorazepam 3 mg una vez al día durante 8 días no potenció los efectos depresores del SNC de lorazepam.

#### *Población pediátrica*

No se han realizado estudios de interacciones en niños con los comprimidos bucodispersables de bilastina. Dado que no hay experiencia clínica sobre la interacción de bilastina con otros medicamentos, alimentos o zumos de frutas en niños, actualmente se deben considerar los resultados obtenidos en los estudios de interacciones con adultos cuando se prescriba bilastina pediátrica. No existen datos clínicos en niños para asegurar que los cambios en la AUC o  $C_{max}$  debidos a interacciones afectan al perfil de seguridad de bilastina.

## **4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia**

### Embarazo

No hay datos relativos al uso de bilastina en mujeres embarazadas o éstos son limitados.

Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción, el parto o el desarrollo postnatal (ver sección 5.3). Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de bilastina durante el embarazo.

### Lactancia

La excreción de bilastina en la leche no ha sido estudiada en humanos. Los datos farmacocinéticos disponibles en animales muestran que bilastina se excreta en la leche (ver sección 5.3). Se debe decidir si continuar/discontinuar la lactancia o interrumpir/abstenerse del tratamiento con este medicamento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con bilastina para la madre.

### Fertilidad

No hay datos clínicos o éstos son limitados. En un estudio en ratas no se detectó ningún efecto negativo

sobre la fertilidad (ver sección 5.3).

#### 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Un estudio realizado en adultos para evaluar los efectos de bilastina sobre la capacidad para conducir, demostró que el tratamiento con 20 mg de bilastina no afectó al rendimiento durante la conducción. No obstante, dado que puede variar la respuesta individual al medicamento, se recomienda a los pacientes no conducir o utilizar máquinas hasta que hayan establecido su propia respuesta a bilastina.

#### 4.8. Reacciones adversas

##### Resumen del perfil de seguridad en la población pediátrica

Durante el desarrollo clínico, la frecuencia, el tipo y la intensidad de las reacciones adversas en adolescentes (de 12 a 17 años de edad) fueron las mismas que las observadas en adultos. La información recogida en esta población (adolescentes) durante la pos-comercialización, ha confirmado los resultados de los ensayos clínicos.

En un ensayo clínico controlado de 12 semanas, el porcentaje de niños (2-11 años de edad) que notificaron acontecimientos adversos (AAs) después del tratamiento con bilastina 10 mg para rinoconjuntivitis alérgica o urticaria idiopática crónica fue comparable con los pacientes que recibieron placebo (68,5% versus 67,5%).

Los AAs relacionados notificados más frecuentemente por 328 niños (2-11 años de edad) que recibieron bilastina (en la forma farmacéutica de comprimidos bucodispersables) durante los ensayos clínicos (#260 niños expuestos en el estudio clínico de seguridad, 68 niños expuestos en el estudio farmacocinético) fueron dolor de cabeza, conjuntivitis alérgica, rinitis y dolor abdominal. Estos acontecimientos adversos relacionados ocurrieron con una frecuencia comparable en 249 pacientes que recibieron placebo.

##### Tabla de reacciones adversas en la población pediátrica

La siguiente tabla muestra los acontecimientos adversos al menos posiblemente relacionados con bilastina y notificados en más del 0,1% de los niños (2-11 años de edad) tratados con bilastina durante el desarrollo clínico.

Las frecuencias se han clasificado de la siguiente forma:

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ) Frecuentes

( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ )

Poco frecuentes ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ) Raras

( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ )

Muy raras ( $< 1/10.000$ )

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Las reacciones raras, muy raras y de frecuencia no conocida no se han incluido en la tabla.

| Clasificación por órganos del Sistema |                  | Bilastina 10 mg<br>(n=328) <sup>#</sup> | Placebo (n=249) |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Frecuencia                            | Reacción Adversa |                                         |                 |
| <b>Infecciones e infestaciones</b>    |                  |                                         |                 |
| Poco frecuente                        | Rinitis          | 3 (0,9 %)                               | 3 (1,2 %)       |

| Trastornos del sistema nervioso                                   |                                          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Frecuente                                                         | Cefalea                                  | 6 (1,8 %) | 3 (1,2 %) |
| Poco frecuente                                                    | Mareo                                    | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
|                                                                   | Pérdida de conciencia                    | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
| Trastornos oculares                                               |                                          |           |           |
| Frecuente                                                         | Conjuntivitis alérgica                   | 4 (1,2 %) | 5 (2,0 %) |
| Poco frecuente                                                    | Irritación ocular                        | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
| Trastornos gastrointestinales                                     |                                          |           |           |
| Poco frecuente                                                    | Dolor abdominal/Dolor abdominal superior | 3 (0,9 %) | 3 (1,2 %) |
|                                                                   | Diarrea                                  | 2 (0,6 %) | 0 (0,0 %) |
|                                                                   | Náuseas                                  | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
|                                                                   | Hinchazón de los labios                  | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
| Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo                     |                                          |           |           |
| Poco frecuente                                                    | Eczema                                   | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) |
|                                                                   | Urticaria                                | 2 (0,6 %) | 2 (0,8 %) |
| Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración |                                          |           |           |
| Poco frecuente                                                    | Fatiga                                   | 3 (0,9 %) | 0 (0,0 %) |

#260 niños expuestos en el estudio clínico de seguridad, 68 niños expuestos en el estudio farmacocinético

#### Descripción de las reacciones adversas relevantes en la población pediátrica

Se observaron cefalea, dolor abdominal, conjuntivitis alérgica y rinitis tanto en niños tratados con 10 mg de bilastina como con placebo. La frecuencia notificada fue 1,8% vs. 1,2% para cefalea; 0,9% vs. 1,2% para dolor abdominal; 1,2% vs. 2,0% para conjuntivitis alérgica; y 0,9% vs. 1,2% para rinitis.

#### Resumen del perfil de seguridad en pacientes adultos y adolescentes

La incidencia de acontecimientos adversos en pacientes adultos y adolescentes afectados de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática tratados con 20 mg de bilastina en los estudios clínicos fue comparable a la incidencia en pacientes que recibieron placebo (12,7% frente a 12,8%).

Los ensayos clínicos de fase II y III realizados durante el desarrollo clínico incluyeron 2.525 pacientes adultos y adolescentes tratados con diferentes dosis de bilastina, de los cuales 1.697 recibieron 20 mg de bilastina. En estos ensayos 1.362 pacientes recibieron placebo. Los acontecimientos adversos notificados más frecuentemente por los pacientes tratados con bilastina 20 mg para la indicación de rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica idiopática fueron cefalea, somnolencia, mareo y fatiga. Estos acontecimientos adversos ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes que recibieron placebo.

#### Tabla de reacciones adversas en pacientes adultos y adolescentes

La siguiente tabla muestra las reacciones adversas al menos posiblemente relacionadas con bilastina y notificadas en más del 0,1% de los pacientes tratados con bilastina 20 mg durante el desarrollo clínico (N = 1.697).

Las frecuencias se han clasificado de la siguiente forma:

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ )

Frecuentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ )

Poco frecuentes ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ) Raras ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ )

Muy raras ( $< 1/10.000$ )

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Las reacciones raras, muy raras y de frecuencia no conocida no se han incluido en la tabla

| Clasificación por órganos y sistemas<br>Frecuencia Reacción adversa |                                                 | Bilastina<br>20 mg<br>N=1697 | Bilastina<br>cualquier<br>dosis<br>N=2525 | Placebo<br>N=1362 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Infecciones e infestaciones</b>                                  |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Herpes labial                                   | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 0 (0,0%)          |
| <b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>                 |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Aumento de apetito                              | 10 (0,59%)                   | 11 (0,44%)                                | 7 (0,51%)         |
| <b>Trastornos psiquiátricos</b>                                     |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Ansiedad                                        | 6 (0,35%)                    | 8 (0,32%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                                                     | Insomnio                                        | 2 (0,12%)                    | 4 (0,16%)                                 | 0 (0,0%)          |
| <b>Trastornos del sistema nervioso</b>                              |                                                 |                              |                                           |                   |
| Frecuente                                                           | Somnolencia                                     | 52 (3,06%)                   | 82 (3,25%)                                | 39 (2,86%)        |
|                                                                     | Cefalea                                         | 68 (4,01%)                   | 90 (3,56%)                                | 46 (3,38%)        |
| Poco frecuente                                                      | Mareo                                           | 14 (0,83%)                   | 23 (0,91%)                                | 8 (0,59%)         |
| <b>Trastornos del oído y del laberinto</b>                          |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Tinnitus                                        | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                                                     | Vértigo                                         | 3 (0,18%)                    | 3 (0,12%)                                 | 0 (0,0%)          |
| <b>Trastornos cardíacos</b>                                         |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Bloqueo de rama derecha                         | 4 (0,24%)                    | 5 (0,20%)                                 | 3 (0,22%)         |
|                                                                     | Arritmia sinusal                                | 5 (0,30%)                    | 5 (0,20%)                                 | 1 (0,07%)         |
|                                                                     | Intervalo QT del electrocardiograma prolongado* | 9 (0,53%)                    | 10 (0,40%)                                | 5 (0,37%)         |
|                                                                     | Otras anomalías del ECG                         | 7 (0,41%)                    | 11 (0,44%)                                | 2 (0,15%)         |
| <b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>          |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Disnea                                          | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                                                     | Molestias nasales                               | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                                                     | Sequedad nasal                                  | 3 (0,18%)                    | 6 (0,24%)                                 | 4 (0,29%)         |
| <b>Trastornos gastrointestinales</b>                                |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Dolor abdominal superior                        | 11 (0,65%)                   | 14 (0,55%)                                | 6 (0,44%)         |
|                                                                     | Dolor abdominal                                 | 5 (0,30%)                    | 5 (0,20%)                                 | 4 (0,29%)         |
|                                                                     | Náusea                                          | 7 (0,41%)                    | 10 (0,40%)                                | 14 (1,03%)        |
|                                                                     | Molestias gástricas                             | 3 (0,18%)                    | 4 (0,16%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                                                     | Diarrea                                         | 4 (0,24%)                    | 6 (0,24%)                                 | 3 (0,22%)         |
|                                                                     | Sequedad bucal                                  | 2 (0,12%)                    | 6 (0,24%)                                 | 5 (0,37%)         |
|                                                                     | Dispepsia                                       | 2 (0,12%)                    | 4 (0,16%)                                 | 4 (0,29%)         |
|                                                                     | Gastritis                                       | 4 (0,24%)                    | 4 (0,16%)                                 | 0 (0,0%)          |
| <b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>                |                                                 |                              |                                           |                   |
| Poco frecuente                                                      | Prurito                                         | 2 (0,12%)                    | 4 (0,16%)                                 | 2 (0,15%)         |

| Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración |               |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <i>Poco frecuente</i>                                             | <i>Fatiga</i> | 14 (0,83%) | 19 (0,75%) | 18 (1,32%) |
|                                                                   | <i>Sed</i>    | 3 (0,18%)  | 4 (0,16%)  | 1 (0,07%)  |

| Clasificación por órganos y sistema |                                              | Bilastina<br>20 mg<br>N=1697 | Bilastina<br>cualquier<br>dosis<br>N=2525 | Placebo<br>N=1362 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Frecuencia                          | Reacción adversa                             |                              |                                           |                   |
|                                     | <i>Mejoría de una condición preexistente</i> | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 1 (0,07%)         |
|                                     | <i>Pirexia</i>                               | 2 (0,12%)                    | 3 (0,12%)                                 | 1 (0,07%)         |
|                                     | <i>Astenia</i>                               | 3 (0,18%)                    | 4 (0,16%)                                 | 5 (0,37%)         |
| Exploraciones complementarias       |                                              |                              |                                           |                   |
| <i>Poco frecuente</i>               | <i>Aumento de Gamma-glutamyltransferasa</i>  | 7 (0,41%)                    | 8 (0,32%)                                 | 2 (0,15%)         |
|                                     | <i>Aumento de Alanin aminotransferasa</i>    | 5 (0,30%)                    | 5 (0,20%)                                 | 3 (0,22%)         |
|                                     | <i>Aumento de Aspartato aminotransferasa</i> | 3 (0,18%)                    | 3 (0,12%)                                 | 3 (0,22%)         |
|                                     | <i>Aumento de creatinina plasmática</i>      | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 0 (0,0%)          |
|                                     | <i>Aumento de triglicéridos plasmáticos</i>  | 2 (0,12%)                    | 2 (0,08%)                                 | 3 (0,22%)         |
|                                     | <i>Aumento de peso</i>                       | 8 (0,47%)                    | 12 (0,48%)                                | 2 (0,15%)         |

**\*También se han notificado prolongaciones del intervalo QT en el electrocardiograma después de la comercialización.**

**Frecuencia no conocida** (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Se han observado **palpitaciones, taquicardia, reacciones de hipersensibilidad** (como anafilaxia, angioedema, disnea, erupción cutánea, edema localizado/hinchazón local y eritema) y **vómitos** durante el período de post-comercialización.

#### Descripción de las reacciones adversas relevantes en pacientes adultos y adolescentes.

Se observaron somnolencia, cefalea, mareo y fatiga tanto en pacientes tratados con 20 mg de bilastina o con placebo. La frecuencia notificada fue 3,06% vs. 2,86% para somnolencia; 4,01% vs. 3,38% para cefalea; 0,83% vs. 0,59 para mareo; y 0,83% vs. 1,32 para fatiga.

La información recogida durante la post-comercialización, ha confirmado el perfil de seguridad observado durante el desarrollo clínico.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas:

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>.

## 4.9. Sobredosis

No hay datos de sobredosis en niños.

La información relacionada con sobredosis aguda de bilastina se recoge de la experiencia de los ensayos clínicos realizados durante el desarrollo en adultos y la vigilancia pos-comercialización. En los ensayos clínicos, tras la administración de bilastina a dosis de 10 a 11 veces la dosis terapéutica (220 mg como

dosis única o 200 mg/día durante 7 días) a 26 voluntarios adultos sanos, la frecuencia de acontecimientos adversos tras el tratamiento fue dos veces superior a la observada tras la administración de placebo. Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas fueron mareo, cefalea y náusea. No se notificaron acontecimientos adversos graves ni prolongaciones significativas del intervalo QTc. La información recogida durante la pos-comercialización coincide con la información obtenida en los ensayos clínicos.

La evaluación crítica del efecto de dosis múltiples de bilastina (100 mg durante 4 días) sobre la repolarización ventricular en “un estudio cruzado de thorough QT/QTc” realizado con 30 voluntarios adultos sanos no mostró ninguna prolongación significativa del intervalo QTc.

En caso de producirse una sobredosis se recomienda tratamiento sintomático y de soporte. No se conoce ningún antídoto específico para bilastina.

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Antihistamínicos de uso sistémico, otros antihistamínicos de uso sistémico.  
Código ATC: R06AX29.

#### Mecanismo de acción

Bilastina es un antagonista de la histamina no sedante y de acción prolongada, con afinidad antagonista selectiva por los receptores  $H_1$  periféricos y sin afinidad por los receptores muscarínicos.

Tras la administración de una dosis única bilastina inhibió durante 24 horas las reacciones cutáneas de habón y eritema inducidas por histamina.

#### Eficacia clínica

Se ha estudiado la eficacia de bilastina en adultos y adolescentes. De acuerdo a las directrices, la eficacia probada en adultos y adolescentes se puede extrapolar a niños, habiéndose demostrado que la exposición sistémica de 10 mg de bilastina en niños de 2 a 11 años de edad con un peso corporal mínimo de 15 kg es equivalente a la exposición de 20 mg de bilastina en adultos (ver sección 5.2). La extrapolación de datos de adultos y adolescentes se considera apropiada para este medicamento dado que la fisiopatología de la rinoconjuntivitis alérgica y la urticaria es la misma para todos los grupos de edad.

En ensayos clínicos realizados en pacientes adultos y adolescentes con rinoconjuntivitis alérgica (estacional y perenne), bilastina administrada en una única dosis diaria de 20 mg durante 14-28 días fue eficaz para aliviar los síntomas, tales como estornudos, rinorrea, picor nasal, congestión nasal, picor ocular, lagrimeo y enrojecimiento ocular. Bilastina controló los síntomas de forma eficaz durante 24 horas.

En dos ensayos clínicos realizados en pacientes con urticaria crónica idiopática, bilastina administrada en una única dosis diaria de 20 mg durante 28 días fue eficaz para aliviar la intensidad del prurito y el número y tamaño de los habones, así como el malestar de los pacientes derivado de la urticaria. Los pacientes obtuvieron una mejoría en la calidad del sueño y en la calidad de vida.

En los ensayos clínicos realizados con bilastina no se observó ninguna prolongación del intervalo QTc ni ningún otro efecto cardiovascular clínicamente relevantes, incluso a dosis hasta 200 mg diarios (10 veces la dosis terapéutica) durante 7 días en 9 sujetos o incluso cuando se administraron de forma concomitante inhibidores de P-gp, tales como ketoconazol (24 sujetos) y eritromicina (24 sujetos).

Además, se ha llevado a cabo un estudio “thorough QT” en 30 voluntarios.

En los ensayos clínicos controlados realizados con la dosis recomendada de 20 mg una vez al día, el perfil de seguridad de bilastina sobre el SNC fue similar al placebo y la incidencia de somnolencia no fue estadísticamente diferente a placebo. Bilastina a dosis hasta 40 mg al día no afectó al rendimiento psicomotor en los ensayos clínicos y no afectó a la capacidad de conducción en un estudio estándar de conducción.

La eficacia y seguridad de bilastina en los pacientes de edad avanzada ( $\geq 65$  años de edad) incluidos en los estudios de fase II y III no mostraron diferencias con respecto a pacientes más jóvenes.

### Seguridad clínica

En un ensayo clínico controlado de 12 semanas con niños de 2 a 11 años de edad (509 niños en total, 260 tratados con 10 mg de bilastina: 58 de 2 a  $<6$  años de edad, 105 de 6 a  $<9$  años de edad y 97 de 9 a  $<12$

años de edad; y 249 tratados con placebo: 58 de 2 a  $<6$  años de edad, 95 de 6 a  $<9$  años de edad y 96 de 9 a

$<12$  años de edad), a la dosis pediátrica recomendada de 10 mg una vez al día, el perfil de seguridad de bilastina ( $n = 260$ ) fue similar a placebo ( $n = 249$ ), con reacciones adversas a medicamentos observados en 5,8% y 8,0% de los pacientes que tomaron 10 mg de bilastina y placebo, respectivamente. Durante este estudio, ambos grupos, bilastina 10 mg y placebo, mostraron una ligera disminución en las puntuaciones de somnolencia y sedación en el Cuestionario de Sueño Pediátrico, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento. En estos niños de 2-11 años de edad no se detectaron diferencias significativas en QTc tras la administración de 10 mg de bilastina diaria en comparación con placebo. Los cuestionarios de Calidad de Vida específicos para niños con rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica mostraron un incremento general en las puntuaciones tras 12 semanas sin diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de bilastina y placebo. La población total de 509 niños incluyó: 479 sujetos con rinoconjuntivitis alérgica y 30 sujetos diagnosticados de urticaria crónica. 260 niños recibieron bilastina, 252 (96,9%) para rinoconjuntivitis alérgica y 8 (3,1%) para la urticaria crónica. Por analogía, 249 niños recibieron placebo, 227 (91,2%) para rinoconjuntivitis alérgica y 22 (8,8%) para la urticaria crónica.

### Población pediátrica

La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con bilastina en todos los grupos de la población pediátrica menores de 2 años de edad (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la población pediátrica).

## **5.2. Propiedades farmacocinéticas**

### Absorción

Bilastina se absorbe rápidamente tras la administración oral con un tiempo de aproximadamente 1,3 horas hasta alcanzar la concentración plasmática máxima. No se ha observado acumulación. La biodisponibilidad oral media de bilastina es del 61%.

### Distribución

Estudios *in vitro* e *in vivo* han demostrado que bilastina es un sustrato de la P-gp (ver sección 4.5 “Interacción con ketoconazol o eritromicina” e “Interacción con diltiazem”) y del OATP (ver sección 4.5 “Interacción con zumo de pomelo”). A las dosis terapéuticas la unión de bilastina a las proteínas

plasmáticas es de 84-90%.

### Biotransformación

En estudios *in vitro* bilastina no indujo ni inhibió la actividad de los isoenzimas del CYP450.

### Eliminación

En un estudio de balance de masas realizado en voluntarios adultos sanos, tras la administración de una dosis única de 20 mg de  $^{14}\text{C}$ -bilastina, casi el 95% de la dosis administrada fue recuperada en orina (28,3%) y heces (66,5%) como bilastina inalterada, confirmando que bilastina no es significativamente metabolizada en humanos. La vida media de eliminación calculada en voluntarios sanos fue de 14,5 h.

### Linealidad

Bilastina presenta una farmacocinética lineal en el rango de dosis estudiado (5 a 220 mg), con una baja variabilidad interindividual.

### Insuficiencia renal

Los efectos de bilastina en pacientes con insuficiencia renal han sido estudiado en adultos.

En un estudio realizado en sujetos con insuficiencia renal la  $\text{AUC}_{0-\infty}$  media ( $\pm\text{DE}$ ) aumentó de 737,4 ( $\pm 260,8$ ) ngxh/ml en sujetos sin insuficiencia (IFG:  $> 80$  ml/min/ $1,73\text{ m}^2$ ) a 967,4 ( $\pm 140,2$ ) ngxh/ml en sujetos con insuficiencia leve (IFG: 50-80 ml/min/ $1,73\text{ m}^2$ ), 1384,2 ( $\pm 263,23$ ) ngxh/ml en sujetos con insuficiencia moderada (IFG: 30- $<50$  ml/min/ $1,73\text{ m}^2$ ), y 1708,5 ( $\pm 699,0$ ) ngxh/ml en sujetos con insuficiencia grave (IFG:  $< 30$  ml/min/ $1,73\text{ m}^2$ ). La semivida de eliminación media ( $\pm\text{DE}$ ) de bilastina fue de 9,3 h ( $\pm 2,8$ ) en sujetos sin insuficiencia, 15,1 h ( $\pm 7,7$ ) en sujetos con insuficiencia leve, 10,5 h ( $\pm 2,3$ ) en sujetos con insuficiencia moderada y 18,4 h ( $\pm 11,4$ ) en sujetos con insuficiencia grave. La excreción urinaria de bilastina fue esencialmente completa tras 48-72 h en todos los sujetos. No cabe esperar que estos cambios farmacocinéticos tengan una influencia clínicamente relevante sobre la seguridad de bilastina, ya que los niveles plasmáticos de bilastina en pacientes con insuficiencia renal continúan estando dentro del rango de seguridad de bilastina.

### Insuficiencia hepática

No hay datos farmacocinéticos en sujetos con insuficiencia hepática. Bilastina no es metabolizada en humanos. Puesto que los resultados del estudio en insuficiencia renal indican que la vía renal es la vía principal responsable de la eliminación, cabe esperar que la excreción biliar sólo esté implicada de forma marginal en la eliminación de bilastina. No se espera que los cambios en la función hepática tengan una influencia clínicamente relevante en la farmacocinética de bilastina.

### Población pediátrica

Los análisis farmacocinéticos en niños han sido realizados con los datos obtenidos en dos estudios que incluían 66 niños de edades comprendidas entre 2 y 11 años con rinoconjuntivitis alérgica o urticaria crónica, a los cuales se les administró una toma diaria de bilastina 10 mg comprimidos bucodispersables. El análisis farmacocinético de los datos de concentraciones plasmáticas mostró que la dosis pediátrica de bilastina 10 mg una vez al día da como resultado una exposición sistémica dentro del rango de la observada tras administrar una dosis de 20 mg en adultos y adolescentes, siendo el rango de valores de AUC (95% IC) entre 511,5 y 1450 ng\*hr/ml para niños de 2 a 11 años. Estos resultados estuvieron muy por debajo del umbral de seguridad basado en los datos de dosis de 80 mg una vez al día en adultos de acuerdo con el perfil de seguridad del medicamento. Estos resultados confirmaron la elección de bilastina vía oral una vez al día como la dosis terapéutica recomendada para población pediátrica en el rango de edad de 2 a 11 años con un peso corporal mínimo de 15 kg.

### 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos con bilastina no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad y potencial carcinogénico.

En los estudios de toxicidad para la reproducción únicamente se observaron efectos de bilastina sobre el feto (pérdidas pre- y post-implantación en ratas y osificación incompleta de los huesos craneales, el esternón y los miembros en conejos) a dosis tóxicas para la madre.

Los niveles de exposición determinados por las NOAEL son superiores (> 30 veces) a los niveles de exposición alcanzados en humanos a la dosis terapéutica recomendada.

En un estudio sobre lactancia se detectó bilastina en la leche de ratas en periodo de lactancia tras la administración oral de una dosis única (20 mg/kg). Las concentraciones de bilastina en la leche fueron alrededor de la mitad de las del plasma materno. Se desconoce la relevancia de estos resultados para los humanos.

En un estudio de fertilidad en ratas, la administración oral de bilastina a dosis hasta 1000 mg/kg/día no indujo ningún efecto sobre los órganos reproductivos de los machos ni de las hembras. Los índices de apareamiento, fertilidad y gravidez no se vieron afectados.

Tal y como se observó en un estudio de distribución en ratas, con determinación de las concentraciones de fármaco por autorradiografía, bilastina no se acumula a nivel del SNC.

## 6 . DATOS FARMACÉUTICOS

### 6.1. Lista de excipientes

Celulosa microcristalina  
Aroma de cereza (contiene alcohol bencílico y etanol)  
Aspartamo (E951)  
Manitol (E-421)/almidón de maíz  
Sacarina sódica  
Croscarmelosa sódica  
Fumarato de estearilo y sodio  
Sílice coloidal anhidra

### 6.2. Incompatibilidades

No procede.

### 6.3. Periodo de validez

2 años

### 6.4. Precauciones especiales de conservación

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

### **6.5. Naturaleza y contenido del envase**

Bilastina Flas Normon 10 mg comprimidos bucodispersables están envasados en un blíster unidosis de Aluminio/Poliamida-Aluminio-PVC.

Los blíster están envasados en estuches de cartón. Tamaños de envases: 10, 20 y 30 comprimidos.

### **6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

### **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS NORMON, S.A.  
Ronda de Valdecarrizo, 6 – 28760 Tres Cantos – Madrid (ESPAÑA)

### **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

91.259

### **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

Mayo 2026

### **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

Mayo 2026

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>)