

**PROSPECTO**

---



**TORLASPORÍN®**  
Cefalexina (D.C.I.) (monohidrato)

**COMPOSICIÓN**

Cada cápsula contiene:

Cefalexina (monohidrato) (D.C.I.) ..... 500 mg

*Excipientes:*

Lactosa y estearato de magnesio c.s.

**DESCRIPCIÓN**

La cefalexina es un antibiótico de amplio espectro para la administración por vía oral.

**INDICACIONES**

La cefalexina está indicada en el tratamiento de las infecciones bacterianas de las vías respiratorias, genitourinarias, tejidos blandos y piel, debidas a microorganismos sensibles a este antibiótico.

**CONTRAINDICACIONES**

No se debe administrar a pacientes con hipersensibilidad a las Cefalosporinas. Debe administrarse con precaución en pacientes con alergia a las penicilinas y en aquellos con historial alérgico anterior, fundamentalmente medicamentoso.

## **PROSPECTO**

---

### **INCOMPATIBILIDADES**

No debe asociarse con la administración de Eritromicina ni Rifampicina, por ser antibióticos farmacológicamente antagónicos a las Cefalosporinas.

Pueden presentarse también algunos casos de sensibilidad cruzada entre derivados de las Penicilinas con las Cefalosporinas.

### **ADVERTENCIAS**

Administrar con precaución en pacientes propensos a alergias o idiosincrasias medicamentosas.

Todavía no se ha establecido la inocuidad del Torlasporín® en el embarazo.

En infecciones crónicas de las vías urinarias es necesario análisis bacteriológico y observación clínica frecuentes.

En casos de insuficiencia renal puede ser necesario reducir la dosis al existir eliminación retardada.

En los pacientes tratados con Cefalexina puede darse una falsa reacción positiva de glucosa en la orina.

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes, aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en el caso de que aparecieran diarreas, debe consultar a su médico.

### **EFECTOS SECUNDARIOS**

Las intolerancias del aparato digestivo y las reacciones en la piel, no son tan molestas como para suspender el tratamiento.

---

## **PROSPECTO**

---

### **INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO**

A las dosis recomendadas no se han descrito casos de intoxicación. En caso de reacción alérgica se debe discontinuar el tratamiento y administrar, según reacción alérgica, un antihistamínico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA**

Torlasporín® se administra por vía oral.

- *Adultos:* la dosis usual es de 250-500 mg cada 6 horas. Se recomienda la dosis de 500 mg cada 6 horas para la remisión de los casos crónicos. Si se precisan mas de 4 g diarios, debe recurrirse a la vía parenteral con otra Cefalosporina.
- *Niños:* la dosis usual es de 25 a 50 mg/Kg de peso al día, en dosis iguales, según criterio médico. Estas dosis pueden ser aumentadas al doble en caso de infecciones graves, pero nunca excediendo de 4 g diarios, debiéndose entonces recurrir a la vía parenteral con otra Cefalosporina.

### **PRESENTACIONES**

Envase con 2 blisters de 14 cápsulas cada uno de ellos.

### **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

---

*LDP- Laboratorios TORLAN, S.A.*

***PROSPECTO***

---



**LDP-Laboratorios TORLAN, S.A.**

Ctra. de Barcelona 135-B 08290

Cerdanyola del Vallès (BARCELONA)