



PROSTUROL

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:

Extracto lípido-esterólico de Prunus Africana25 mg

Bencidamina (D.C.I. rec) HCl.....25 mg

Excipientes: Sílice coloidal, celulosa microcristalina, estearato magnésico, talco, eritrosina (E-127), amarillo de quinoleína (E-104), indigotina (E-132), bióxido de titanio (E-171) y gelatina.

TITULAR

Farmasierra Laboratorios S.L. - Ctra. de Irún km 26,200 San Sebastián de los Reyes - Madrid

RESPONSABLE DE FABRICACIÓN

Farmasierra Manufacturing S.L. - Ctra. de Irún km 26,200 San Sebastián de los Reyes - Madrid

PROPIEDADES

PROSTUROL regenera el epitelio secretor de la glándula prostática oponiéndose a los fenómenos involutivos de este órgano. Al mismo tiempo, desarrolla una actividad antiflogística-descongestionante, conduciendo su conjunto de propiedades a una remisión de la disuria, micción frecuente, nicturia y otros síntomas funcionales del prostático.

INDICACIONES

Hiperplasia de la próstata.

Cuadro de incontinencia urinaria y disuria post-adenomectomía.

Tratamiento preoperatorio en la cirugía del adenoma prostático. Prostatitis.

POSOLOGÍA

Vía oral. Administrar, preferentemente, durante las comidas.

Dosis usual media: 1 cápsula, 3-4 veces al día.

Dosis máxima: 2 cápsulas, 3 veces al día.

Dosis mínima: 1 cápsula, 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Úlcera péptica.

PRECAUCIONES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFECTOS SECUNDARIOS

En raras ocasiones, pueden observarse cefaleas, mareos o trastornos del sueño, que pueden aconsejar la supresión, al menos temporal, del tratamiento.

CORREO ELECTRÓNICO

sugerencias_ft@aemps.es

Se atenderán exclusivamente incidencias informáticas sobre la aplicación CIMA (<https://cima.aemps.es>)

C/ CAMPEZO, 1 – EDIFICIO 8
28022 MADRID



INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de sobredosificación, proceder al vaciamiento gástrico y terapéutica sintomática. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 5620420.

PRESENTACIÓN

Envase con 60 cápsulas.

CONSERVACIÓN

Se conservará tanto mejor cuanto más fresco sea el lugar donde se almacene. Deben conservarse las cápsulas dentro del envase.

CON RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

Farmasierra Laboratorios S.L.

Ctra. de Irún km. 26,200 San Sebastián de los Reyes 28700 Madrid