

TAUCOR 40 mg
Lovastatina
Comprimidos

1. Qué es TAUCOR 40mg y para qué se utiliza

COMPOSICIÓN

Lovastatina (D.C.I.) 40 mg

Excipientes:

Lactosa, almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina, estearato magnésico, butilhidroxianisol, indigotina (E-132) y amarillo de quinoleína (E-104), c.s.p. 1 comprimido

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Comprimidos:

TAUCOR 40 mg se presenta en envase de 30 comprimidos conteniendo cada uno 40 mg de lovastatina.

ACTIVIDAD

TAUCOR (lovastatina) reduce el nivel de colesterol en su sangre. Es un miembro de la clase de fármacos denominados inhibidores de la hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa.

TAUCOR disminuye la producción de colesterol en el hígado (la mayor fuente de colesterol del organismo) y aumenta la eliminación del colesterol de la circulación sanguínea por el hígado. Respecto al colesterol LDL y HDL, TAUCOR disminuye de forma significativa el colesterol LDL (colesterol nocivo) y, en la mayoría de los pacientes, eleva el HDL (colesterol beneficioso). Al combinar TAUCOR con la dieta, usted controla la cantidad de colesterol que ingiere y la cantidad que produce su organismo.

TITULAR

Alfasigma España S.L. Av. Diagonal, 490, 08006 Barcelona-España

FABRICANTE

ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.
Calle Bolivia nº 15
Polígono Industrial Azque
28806 - Alcalá de Henares (Madrid)
España

INDICACIONES

- Reducción de los niveles elevados de colesterol en pacientes con colesterol elevado en la sangre (hipercolesterolémicos) cuando la respuesta a la dieta y otras medidas solas ha sido inadecuada.
- Tratamiento junto con dieta apropiada para retrasar el avance de la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) en pacientes con hipercolesterolemia y cardiopatía coronaria.

2. Contraindicaciones y Precauciones

CONTRAINDICACIONES

No debe tomar TAUCOR si usted:

- es alérgico a cualquiera de sus componentes (ver COMPOSICIÓN).
- sufre enfermedad hepática activa diagnosticada.
- está embarazada o cría al pecho a su hijo.

PRECAUCIONES

Informe a su médico de sus problemas médicos actuales y pasados, y de cualquier alergia que sufra.

Informe a su médico si consume cantidades importantes de alcohol o si tiene antecedentes de enfermedad hepática.

Informe también a su médico o farmacéutico si presenta debilidad muscular constante. Podrían ser necesarias pruebas y medicamentos adicionales para diagnosticar y tratar este problema.

INTERACCIONES

Debe informar a su médico de todos los fármacos que esté tomando o piense emplear, incluidos los que se compran sin receta. Es especialmente importante que su médico sepa si está tomando ciclosporina, agentes antifúngicos (como itraconazol), derivados del ácido fibrico (como fenofibrato y gemfibrozilo) o dosis elevadas (> 1 g/día) de niacina o ácido nicotínico.

INCOMPATIBILIDADES

Véase INTERACCIONES

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

Las mujeres en edad fértil sólo deben tomar TAUCOR cuando sea muy improbable que queden embarazadas. Si usted concibe mientras recibe TAUCOR, debe interrumpir el tratamiento y consultar inmediatamente a su médico.

Las mujeres que toman TAUCOR no deben criar al pecho a sus hijos.

Efectos sobre la capacidad de conducción

Sin comentarios.

Uso en niños

No se recomienda el uso de TAUCOR en niños.

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico.

3. Cómo tomar TAUCOR 40 mg

POSOLOGÍA

El médico le ha recetado su dosis de TAUCOR. La dosis inicial habitual es de 20 mg por día, administrados como una dosis única con la cena. Algunos pacientes con hipercolesterolemia leve a moderada pueden ser tratados con una dosis inicial de 10 mg. El médico puede ajustarle la dosis hasta un máximo de 80 mg/día, administrados como dosis única con la cena, o en dosis divididas en la comida y la cena. El médico puede recetarle dosis inferiores, sobre todo si está tomando ciclosporina o padece ciertos trastornos renales. Siga tomando TAUCOR hasta que el médico le diga que interrumpa el tratamiento. Si deja de tomar TAUCOR, su colesterol puede aumentar de nuevo.

Intente tomar TAUCOR según le ha indicado el médico. Sin embargo, si olvida tomar una dosis, no tome una dosis extra. Límitese a seguir la pauta de tratamiento habitual.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

La mayoría de los pacientes toman TAUCOR con un vaso de agua.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20. Además, consulte a su médico de inmediato.

4. Posibles efectos adversos

Todo medicamento puede tener efectos no esperados o indeseables, denominadas reacciones adversas. En general, TAUCOR se tolera adecuadamente. En la mayoría de los casos las reacciones adversas han sido leves y de corta duración. Las reacciones adversas más frecuentes son: trastornos digestivos, vértigos, visión borrosa, cefalea y erupción cutánea. Son reacciones adversas menos frecuentes: dolor, sensibilidad a la presión o debilidad muscular, problemas hepáticos e hipersensibilidad (reacciones alérgicas que pueden tener diferentes síntomas, incluidos el dolor articular, la fiebre o las dificultades para respirar).

Frecuencia no conocida: Debilidad muscular constante

Debido a que los problemas musculares son graves en raras ocasiones, debe consultar rápidamente a su médico si presenta dolor, sensibilidad a la presión o debilidad de los músculos.

También pueden producirse en raras ocasiones otras reacciones adversas y al igual que con cualquier fármaco recetado, algunas pueden ser graves. Pida a su médico o farmacéutico más información. Ambos disponen de una lista más completa de reacciones adversas.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad del medicamento.

5. Conservación de TAUCOR 40 mg

Consérvelo a una temperatura inferior a 30°C. Protéjalo de la luz y consérvelo en el envase original.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

6. OTRAS PRESENTACIONES

También se dispone de TAUCOR 20 mg que se presenta en envases de 30 comprimidos ranurados conteniendo cada uno 20 mg de lovastatina.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
CON RECETA MÉDICA**

TEXTO REVISADO: Enero 1998