

Prospecto: información para el usuario

Clopixol 10 mg comprimidos recubiertos con película Zuclopentixol

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Clopixol y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Clopixol.
3. Cómo tomar Clopixol.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Clopixol.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es Clopixol y para qué se utiliza

Clopixol contiene el principio activo zuclopentixol. Clopixol pertenece a un grupo de medicamentos llamados antipsicóticos (también llamados neurolépticos).

Estos medicamentos actúan en las vías nerviosas en áreas específicas del cerebro y ayudan a corregir ciertos desequilibrios químicos en el cerebro que producen los síntomas de su enfermedad.

Clopixol se utiliza para el tratamiento de la esquizofrenia crónica y subcrónica, con crisis agudas, especialmente en pacientes agitados y/o agresivos.

Su médico, sin embargo, puede prescribir Clopixol para otro propósito. Hable con su médico para cualquier pregunta sobre porque se le ha prescrito Clopixol a usted.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Clopixol

No tome Clopixol

- Si usted es alérgico (hipersensible) al zuclopentixol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si tiene una disminución de la consciencia.
- Si tiene insuficiencia circulatoria.

Advertencias y precauciones

- Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Clopixol si usted: Padece un problema hepático (del hígado).
- Padece una enfermedad respiratoria grave.
- Padece enfermedad de Parkinson, alteración del tiroides, miastenia gravis, feocromocitoma o hipertrofia prostática.
- Tiene antecedentes de convulsiones o ataques.
- Padece diabetes (puede ser necesario un ajuste de su terapia antidiabética).
- Padece un síndrome orgánico cerebral (puede ser una condición resultante después de envenenarse con alcohol o solventes orgánicos).
- Tiene factores de riesgo para padecer ictus (infarto cerebral), p. ej. fumador, hipertensión.
- Clopixol pertenece a un grupo de medicamentos que pueden producir alteraciones en el electrocardiograma, para evitarlo se debe utilizar con precaución en pacientes que tienen hipopotasemia o hipomagnesemia (poco potasio o magnesio en su sangre) o predisposición genética a alteraciones cardíacas.
- Tiene antecedentes de trastornos cardiovasculares.
- Utiliza otros medicamentos antipsicóticos.
- Usted o alguien de su familia tiene antecedentes de coágulos en la sangre, ya que fármacos de este grupo se han relacionado con la formación de coágulos sanguíneos.

Si tiene síntomas de infección persistentes consulte con su médico, ya que puede ser representativo de una disminución de leucocitos (glóbulos blancos) en sangre.

Con el uso de diferentes antipsicóticos se ha notificado una condición muy poco frecuente pero grave denominada síndrome neuroléptico maligno que se caracteriza por signos como fiebre alta, rigidez inusual de los músculos y trastorno de la consciencia, especialmente si ocurre con sudoración y ritmo cardíaco rápido. Si presenta estos síntomas, pueden ser representativos de esta situación y debe acudir al médico (ver apartado de posibles efectos adversos).

Niños y adolescentes

Clopixol no está recomendado en este grupo de pacientes.

Toma de Clopixol con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Informe a su médico o farmacéutico si usted está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Antidepresivos tricíclicos.
- Guanetidina y medicamentos similares (usados para bajar la presión sanguínea).
- Barbitúricos y medicamentos similares (su uso con Clopixol puede hacerle sentir somnoliento).
- Medicamentos usados para tratar la epilepsia.
- Levodopa y medicamentos similares (usados para tratar la enfermedad de Parkinson).
- Metoclopramida (usado en el tratamiento de trastornos gastrointestinales).
- Piperazina (usado en el tratamiento de infección por lombrices y oxiuros).
- Medicamentos que causan alteraciones del equilibrio hidro-salino (demasiado poco potasio o magnesio en su sangre).
- Medicamentos que se conoce que incrementan la concentración de Clopixol en su sangre.

Los siguientes medicamentos no pueden tomarse al mismo tiempo con Clopixol:

- Medicamentos que cambian los latidos cardíacos (ej. quinidina, amiodarona, sotalol, dofetilida, eritromicina, terfenadina, astemizol, gatifloxacino, moxifloxacino, cisaprida, litio).
- Otros medicamentos antipsicóticos.

Toma de Clopixol con alimentos y alcohol

Clopixol puede tomarse con o sin alimentos.

Clopixol puede incrementar los efectos sedativos del alcohol provocándole somnolencia. Es recomendable no beber alcohol durante el tratamiento con Clopixol.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

No tome Clopixol si está embarazada a menos que sea claramente necesario.

No debe usar Clopixol durante el período de lactancia ya que pequeñas cantidades del medicamento pueden pasar a la leche materna.

Los síntomas siguientes pueden aparecer en recién nacidos de madres que han tomado Clopixol durante el tercer trimestre (tres últimos meses de su embarazo): temblor, agarrotamiento y/o debilidad muscular, tendencia al sueño, agitación, problemas de respiración y dificultad en la alimentación.

Si su bebé presenta cualquiera de estos síntomas, debería ponerse en contacto con su médico.

Estudios en animales han demostrado que Clopixol afecta a la fertilidad. Por favor, consulte a su médico.

Conducción y uso de máquinas

Clopixol puede producir síntomas tales como somnolencia, mareo o alteraciones en la vista, y disminuir la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia enfermedad pueden dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por lo tanto no conduzca, ni maneje máquinas, ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que su médico valore su respuesta a este medicamento.

Clopixol contiene lactosa y aceite de ricino hidrogenado

Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

El aceite de ricino hidrogenado puede producir molestias de estómago y diarrea.

3. Cómo tomar Clopixol

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis varía considerablemente y depende de la gravedad de la enfermedad.

La dosis recomendada es:

Adultos

La dosis habitual para el inicio del tratamiento suele ser entre 20 mg y 30 mg al día, la cual puede aumentarse gradualmente hasta un máximo de 150 mg al día, repartidos en varias tomas.

En algunos casos puede requerirse un aumento considerable de la dosis. La dosis máxima es 150 mg al día.

La dosis de mantenimiento es por lo general de 20-40 mg al día.

Pacientes de edad avanzada

La dosis es normalmente entre 2 mg y 6 mg al día tomadas al final de la tarde. La dosis puede incrementarse a 10-20 mg al día.

Pacientes con riesgos especiales

Los pacientes con problemas hepáticos normalmente reciben el rango más bajo de la dosis.

Uso en niños

Clopixol no está recomendado en niños.

Si usted tiene la impresión de que el efecto de Clopixol es demasiado fuerte o demasiado débil, hable con su médico o farmacéutico.

Cómo y cuándo tomar Clopixol

Tragar los comprimidos con un vaso de agua. No deben masticarse.

Al principio del tratamiento, Clopixol debe tomarse normalmente en 2 o 3 dosis separadas durante el día.

En el tratamiento de mantenimiento Clopixol puede tomarse como única dosis diaria.

Duración del tratamiento

Como con otros medicamentos para psicosis, pueden pasar un par de semanas antes de que empiece a sentirse mejor.

Su médico decidirá la duración del tratamiento. Siga tomando los comprimidos el tiempo recomendado por su médico. La enfermedad de base puede persistir durante largo tiempo y si interrumpe su tratamiento demasiado pronto, sus síntomas pueden reaparecer.

Nunca cambie la dosis de su medicamento sin hablar antes con su médico.

Si toma más Clopixol del que debe

En caso de sobredosis consulte inmediatamente a su médico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- Somnolencia.
- Inconsciencia.
- Movimientos musculares inusuales o rigidez.
- Convulsiones.
- Presión sanguínea baja, pulso débil, ritmo cardíaco rápido, palidez, inquietud.
- Temperatura corporal alta o baja.
- Se han observado cambios en los latidos cardíacos incluyendo latidos cardiacos irregulares o ritmo cardiaco lento cuando Clopixol se ha administrado en sobredosis junto con fármacos que se sabe que afectan al corazón.

Si olvidó tomar Clopixol

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Clopixol

Su médico decidirá cuando y como interrumpir su tratamiento para evitar síntomas desagradables que pueden ocurrir si interrumpe el tratamiento de forma brusca (e.j. dificultad para dormirse, rigidez muscular, sentirse mal).

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si usted tiene alguno de los siguientes síntomas debe contactar con su médico o ir al hospital enseguida.

Poco frecuente (Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Movimientos inusuales de la boca y de la lengua.
Esto puede ser un signo inicial de la condición denominada discinesia tardía.

Muy rara (Pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):

- Fiebre alta, rigidez de los músculos inusual y trastorno de la conciencia, especialmente si ocurre con sudoración y ritmo cardíaco rápido. Estos síntomas pueden ser signos de una rara condición denominada síndrome neuroléptico maligno que ha sido notificado con el uso de diferentes antipsicóticos.
- La coloración amarillenta de la piel y el blanqueo en los ojos; esto puede significar que su hígado está afectado y es signo de la condición conocida como ictericia.

Los siguientes efectos adversos son más pronunciados al principio del tratamiento y la mayoría de ellos normalmente desaparecen durante el tratamiento continuado.

Muy frecuente (Pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- Adormecimiento (somnolencia), dificultad para sentarse o mantenerse de pie (acatisia), movimientos involuntarios (hipercinesia), movimientos lentos o disminuidos (hipocinesia).
- Boca seca.

Frecuente (Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Rapidez cardíaca (taquicardia), sensación de rapidez, con fuerza, o latidos cardíacos irregulares (palpitaciones).
- Temblor, círculos o movimientos repetitivos o posturas anormales debido a contracciones musculares continuas (disonia), agarrotamiento muscular incrementado (hipertonía), mareos, dolor de cabeza, sensación de hormigueo, escozor o adormecimiento de la piel (parestesia), alteración en la atención, amnesia, marcha anormal.
- Dificultad para enfocar objetos cerca del ojo (trastorno de la acomodación), anomalías en la visión.
- Sensación de peonza o balanceo cuando el cuerpo está parado (vértigo).
- Bloqueo de los conductos nasales (congestión nasal), dificultad respiratoria o respiración dolorosa (disnea).

- Incremento de la secreción salivar (hipersecreción salivar), estreñimiento, vómitos, problemas digestivos o malestar centrado en la parte superior del abdomen (dispepsia), diarrea.
- Trastorno urinario (retención urinaria), volumen de la orina incrementado (poliuria).
- Aumento de la sudoración (hiperhidrosis), picor (prurito).
- Dolor muscular (mialgia).
- Aumento del apetito, aumento de peso.
- Fatiga, debilidad (astenia), sensación general de disconfort o inquietud (malestar), dolor.
- Falta de sueño (insomnio), depresión, ansiedad, nerviosismo, sueños anormales, agitación, disminución de la conducta sexual (disminución de la libido).

Poco Frecuente (Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Hiperactivo o hiperreceptivo (hiperreflexia), movimientos entrecortados (discinesia), parkinsonismo, desmayo (síncope), incapacidad para coordinar la actividad muscular (ataxia), trastorno del habla, disminución del tono muscular (hipotonía), convulsiones, migraña.
- Movimientos circulares de los ojos (oculogiración), pupilas dilatadas (midriasis).
- Sobresensibilidad a ciertos rangos de frecuencia de sonidos o dificultad para tolerar los sonidos diarios (hiperacusia), pitidos en los oídos (tinnitus).
- Dolor abdominal, flatulencia.
- Rash, reacción de la piel debida a sensibilidad a la luz (reacción fotosensible), trastorno de la pigmentación, grasa, brillo y color amarillento de la piel debido al incremento de la secreción de sebo (seborrea), eczema o inflamación de la piel (dermatitis), hemorragia bajo la piel observados como decoloraciones púrpura o rojas en la piel (púrpura).
- Rigidez muscular, incapacidad para abrir la boca normalmente (trismus), giros del cuello y una posición no natural de la cabeza (tortícolis, torcedura de cuello, rigidez de cuello).
- Disminución del apetito, disminución de peso.
- Presión sanguínea baja (hipotensión), sofocos.
- Sed, temperatura corporal baja anormal (hipotermia), fiebre (pirexia).
- Tests de la función hepática anormales.
- Trastorno sexual (retraso en la eyaculación, problemas con la erección, las mujeres pueden tener dificultad para llegar al orgasmo, sequedad vaginal (sequedad vulvovaginal)).
- Indiferencia pronunciada al propio entorno (apatía), pesadillas, aumento de la conducta sexual (aumento de la libido), estado de confusión.

Rara (Pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas):

- Recuento bajo de plaquetas en sangre (trombocitopenia), recuento bajo de glóbulos blancos en sangre (neutropenia), reducción del número de glóbulos blancos en la sangre (leucopenia), envenenamiento de la médula ósea (agranulocitosis).
- Nivel de prolactina en la sangre incrementado (hiperprolactinemia).
- Azúcar en sangre elevado (hiperglucemia), tolerancia a la glucosa alterada, incremento de los niveles de grasa de la sangre (hiperlipidemia).
- Exceso de sensibilidad (hipersensibilidad), reacción alérgica sistémica aguda y grave (reacción anafiláctica).
- Desarrollo de las mamas en el hombre (ginecomastia), excesiva producción de leche (galactorrea), falta de períodos menstruales (amenorrea), erección dolorosa del pene, persistente, no acompañada de excitación sexual o deseo (priapismo).

Como con otros medicamentos que actúan de forma similar a zuclopentixol (el principio activo de Clopixol), se han comunicado en casos raros los siguientes efectos adversos:

- Alargamiento del QT (latido cardiaco lento y cambio en el ECG).
- Latidos cardíacos irregulares (arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular).
- Torsades de Pointes (un tipo especial de latidos cardíacos irregulares).

En casos raros, latidos cardíacos irregulares (arritmias) pueden tener como resultado una muerte súbita.

Coágulos de sangre en las venas, en particular en las piernas (los síntomas incluyen la hinchazón, dolor y rubor en las piernas), pueden moverse a través de los vasos sanguíneos hasta los pulmones y provocando dolor en el pecho y dificultad para respirar. Si notase cualquiera de estos síntomas consulte a su médico inmediatamente.

En pacientes de edad avanzada con demencia se ha comunicado un pequeño incremento en el número de muertes en aquellos pacientes que toman antipsicóticos comparados con los que no los toman.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Clopixol

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Clopixol

El principio activo es zuclopentixol (como dihidrocloruro).

Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg de zuclopentixol como dihidrocloruro.

Los demás componentes son: almidón de patata, lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, copovidona, glicerol 85%, talco, aceite de ricino hidrogenado y estearato de magnesio.

Recubrimiento: hipromelosa 5 y macrogol 6000.

Colorantes: dióxido de titanio (E-171) y óxido de hierro rojo (E-172).

Aspecto del producto y contenido del envase

Clopixol se presenta en envases de comprimidos recubiertos con película (comprimidos) de 10 mg.

Descripción de los comprimidos recubiertos con película:

Los comprimidos recubiertos con película de 10 mg son, redondos, biconvexos, marrón rojizo claro.

Clopixol comprimidos recubiertos con película está disponible en envases conteniendo 30 ó 50 comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular

Lundbeck España, S.A.
Av. Diagonal, 605, 7º2ª
E-08028 Barcelona
Tel.: 93 494 96 20

Responsable de la fabricación

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Dinamarca

Fecha de la última revisión de este prospecto: Febrero 2017

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>