

Prospecto: información para el usuario

Condroage 200 mg/250 mg cápsulas duras Condroitín sulfato sódico/Glucosamina, hidrocloreuro

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Condroage y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Condroage
3. Cómo tomar Condroage
4. Posibles efectos adversos
- 5 Conservación de Condroage
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Condroage y para qué se utiliza

Condroage es una cápsula dura que contiene dos principios activos. Un principio activo es el condroitín sulfato y el otro es el hidrocloreuro de glucosamina. Ambos principios activos pertenecen al grupo de los antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.

Condroage se utiliza en el tratamiento de los síntomas de la artrosis de rodilla en pacientes con dolor moderado a grave en los que esté indicado el tratamiento combinado con condroitín sulfato y glucosamina.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Condroage

No tome Condroage:

- Si es alérgico (hipersensible) al condroitín, a la glucosamina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- Si es alérgico al marisco, pues la glucosamina procede del marisco.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Condroage.

- Si tiene alterada la tolerancia al azúcar (glucosa). Pueden ser necesarios controles más frecuentes de los niveles de azúcar en sangre cuando se empieza el tratamiento con glucosamina.
- Si tiene cualquier alteración del riñón o del hígado, debido a que no se han realizado estudios en este tipo de pacientes y por tanto no pueden darse recomendaciones sobre dosificación.
- Si padece alguna enfermedad grave del corazón. Consulte a su médico.

Niños

No se recomienda el uso de Condroage en niños o adolescentes menores de 18 años.

Uso de Condroage con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Se recomienda precaución si se administra Condroage en combinación con otros medicamentos, sobre todo con:

- Algunos tipos de medicamentos utilizados para evitar la coagulación de la sangre (p. ej., warfarina, dicumarol, fenprocumon, acenocumarol y fluindiona). El efecto de estos medicamentos se puede potenciar si se utilizan junto con glucosamina. Por lo tanto, los pacientes tratados con estas combinaciones deben ser vigilados de forma más cuidadosa al inicio o finalización del tratamiento con glucosamina.
- Medicamentos para tratar las infecciones (antibióticos como la tetraciclina, el cloranfenicol o la penicilina).

Consulte a su médico o farmacéutico para más información.

Toma de Condroage con alimentos y bebidas

Puede tomar este medicamento antes, durante o después de las comidas. No obstante, si a menudo experimenta molestias de estómago con la toma de medicamentos, es aconsejable tomar Condroage después de las comidas.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Se desconoce si los principios activos de Condroage pasan a la leche materna. Por tanto, no tome este medicamento si está en período de lactancia, ya que no existen datos suficientes sobre la salud del lactante.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Si usted siente mareo o somnolencia, evite conducir o utilizar maquinaria.

3. Cómo tomar Condroage

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 2 cápsulas 3 veces al día.

Las cápsulas deben tragarse sin masticar con una cantidad suficiente de líquido.

Si toma más Condroage del que debe

Si usted ha tomado más cápsulas de las que debería, puede experimentar dolor de cabeza, vértigos, desorientación, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos o diarrea, aunque es probable que no experimente ningún síntoma. En cualquier caso, informe a su médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica teléfono 91 562 04 20 (indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

Si olvidó tomar Condroage

Puede tomar la dosis olvidada cuando lo recuerde pero no tome más de 6 cápsulas al día.

Si interrumpe el tratamiento con Condroage

Los síntomas pueden reaparecer. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Informe a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos: Infección de las vías respiratorias, infección de las vías urinarias o dolor de pecho.

Los efectos adversos más comunmente observados con Condroage son:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes/personas):

- dolor de cabeza
- diarrea, náuseas, indigestión, flatulencia (gases)

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes/personas):

- alteración del sentido del gusto
- dolor de estómago
- reflujo gastroesofágico (afección en la cual el alimento o el líquido se devuelve desde el estómago hacia el esófago, el conducto que va desde la boca hasta el estómago)
- estreñimiento, acidez, distensión abdominal
- calambres musculares, dolor en una extremidad
- fatiga
- infección de las vías respiratorias, infección de vías urinarias
- aumento de los niveles de enzimas del hígado
- alteraciones en los análisis de orina

Los efectos adversos observados en pacientes tratados únicamente con condroitín sulfato (y no descritos anteriormente) son los siguientes:

Muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 pacientes/personas):

- edema, retención de agua
- reacción de tipo alérgico

Los efectos adversos observados en pacientes tratados únicamente con hidrocloreuro de glucosamina (y no descritos anteriormente) son los siguientes:

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes/personas):

- enrojecimiento o erupción de alguna zona de la piel y picores

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- hinchazón de la cara, la lengua o la garganta
- urticaria, hinchazón / tumefacción de tobillos, piernas y pies
- mareos, vómitos
- empeoramiento en el control de la glucosa sanguínea en pacientes con diabetes mellitus

Por lo general, los efectos adversos que pueden aparecer durante el tratamiento con Condroage son de carácter leve y desaparecen con la suspensión del tratamiento.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Condroage

No conservar a temperatura superior a 30° C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los

medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Condroage

- Los principios activos son condroitín sulfato y glucosamina, cada capsula contiene 200 mg de condroitín sulfato sódico y 250 mg de hidrocloreuro de glucosamina.
- El otro componente es estearato de magnesio.

Aspecto del producto y contenido del envase

Condroage se presenta en forma de cápsulas de gelatina dura de color turquesa.

Condroage está envasado en una caja de cartón que contiene 90 cápsulas acondicionadas en blíster. Cada envase contiene 6 blisteres de 15 cápsulas. El blister es de Al/PVC/PVDC.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización:

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Gran Capitán, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) España

Responsable de la fabricación:

J.URIACH & Cía, S.A. Av. Camí Reial 51-57

08184 – Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

Finlandia: Droglican

Austria, Francia: Cartifit

Hungría: Droglycan

Polonia: Chronada

Fecha de la última revisión de este prospecto: Agosto 2019

Otras fuentes de información

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es>.