

## **Prospecto: información para el usuario**

### **Triflusal pensa 300 mg cápsulas duras EFG**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **Contenido del prospecto**

1. Qué es Triflusal Pensa y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Triflusal Pensa
3. Cómo tomar Triflusal Pensa
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Triflusal Pensa
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es Triflusal Pensa y para qué se utiliza**

Triflusal Pensa pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiagregantes plaquetarios, que actúan evitando la formación de coágulos (trombos) que pueden obstruir los vasos sanguíneos.

Este medicamento está indicado en adultos para reducir el riesgo de reaparición de un infarto de miocardio, de una angina estable o inestable o de un infarto cerebral en pacientes que han padecido previamente alguno de estos procesos. También está indicado en pacientes que han sido sometidos a una operación de “by-pass” coronario.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Triflusal Pensa**

##### **No tome Triflusal Pensa**

- si es alérgico (hipersensible) al principio activo triflusal o a otros salicilatos o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si tiene una úlcera de estómago o antecedentes de úlcera de estómago complicada.
- si padece cualquier otro trastorno que cause hemorragias.

##### **Advertencias y precauciones:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Triflusal Pensa

Tenga especial cuidado con Triflusal Pensa

- si padece trastornos del riñón o del hígado.
- si está expuesto a riesgo de hemorragia, sea por traumatismo u otras situaciones patológicas o porque toma, durante periodos prolongados de tiempo, antiinflamatorios no esteroides (medicamentos utilizados para tratar el dolor y/o la inflamación de músculos o articulaciones).
- si va a someterse a alguna intervención quirúrgica. En este caso el riesgo hemorrágico debe evaluarse y, si fuera necesario, usted tendrá que dejar de tomar Triflusal Pensa siete días antes de la intervención.

Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubiera ocurrido alguna vez.

## **Niños**

La seguridad y eficacia en niños menores de 18 años no ha sido establecida, por lo tanto no está recomendada su administración.

## **Uso de Triflusal Pensa con otros medicamentos**

Comuníquese a su médico o farmacéutico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Ciertos medicamentos pueden interactuar con Triflusal Pensa, en este caso puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento. Es importante que informe a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos: antiinflamatorios no esteroides, antidiabéticos orales o anticoagulantes orales, ya que pueden intensificarse los efectos de estos medicamentos, incluyendo los de Triflusal Pensa.

## **Toma de Triflusal Pensa con alimentos y bebidas**

Tomando Triflusal Pensa con las comidas disminuye la posibilidad de aparición de los efectos adversos digestivos.

## **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

En caso de embarazo o lactancia su médico valorará la utilización de esta medicación.

## **Conducción y uso de máquinas**

No se han descrito efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

## **3. Cómo tomar Triflusal Pensa**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de dos cápsulas (600 mg de triflusal) al día en una toma única o repartida en dos tomas o de tres cápsulas (900 mg de triflusal) al día repartida en tres tomas.

Triflusal Pensa se administra por vía oral.

Ingiera la cápsula con una cantidad suficiente de líquido y, preferentemente, con las comidas.

Recuerde tomar su medicamento cada día. Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Triflusal Pensa. No lo suspenda sin que su médico se lo indique.

### **Si toma más Triflusal Pensa del que debe**

Por ingestión de dosis muy elevadas pueden aparecer síntomas de intoxicación por salicilatos (dolor de cabeza, zumbidos, vértigo, náuseas, vómitos, respiración acelerada).

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó tomar Triflusal Pensa**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas sino, por el contrario, continúe con la dosis habitual.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Triflusal Pensa puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

-Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):  
Pesadez de estómago.

-Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 100 personas):  
Dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, estreñimiento, vómitos, flatulencia y anorexia. Estos síntomas suelen ser leves y desaparecer al cabo de pocos días incluso sin suspender el tratamiento.

-Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 1000 personas):  
Se ha observado hemorragia gastrointestinal, distensión abdominal, diarrea, sangre en las heces, sangre en la orina, hematoma, hemorragia nasal, hemorragia rectal, sangrado de las encías y hemorragia cerebral, aumento de la tensión arterial, accidente isquémico transitorio, anemia, disminución anormal del número de plaquetas. Fiebre, síntomas de gripe. Picor y erupción de la piel.

-Efectos adversos muy raros (pueden afectar a menos de 1 de cada 10.000 personas, incluidos casos aislados):  
Reacción alérgica de la piel expuesta a la luz solar.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.


## **5. Conservación de Triflusal Pensa**

No conservar a temperatura superior a 25°C.

Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. Contenido del envase e información adicional**

### **Composición de Triflusal Pensa**

- El principio activo es triflusal. Cada cápsula contiene 300 mg de triflusal.
- Los demás componentes son la gelatina de la cápsula.

### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Triflusal Pensa se presenta en forma de cápsulas transparentes que contienen un polvo cristalino de color blanco o casi blanco. Cada envase contiene 30 ó 50 cápsulas.

### **Titular de la autorización de comercialización**

Pensa Pharma, S.A.  
c/ Jorge Comín (médico pediatra), 3  
46015 Valencia

### **Responsable de la fabricación:**

J. Uriach y Compañía, S.A.  
Av. Camí Reial 51-57  
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

### **Fecha de la última revisión del prospecto: Junio de 2012**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>