

Prospecto: información para el usuario

Bortezomib Teva 3,5 mg polvo para solución inyectable EFG Bortezomib

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Bortezomib Teva y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bortezomib Teva
3. Cómo usar Bortezomib Teva
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Bortezomib Teva
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Bortezomib Teva y para qué se utiliza

Bortezomib Teva contiene el principio activo bortezomib, un “inhibidor proteosómico”. Los proteosomas juegan un papel importante controlando el funcionamiento y crecimiento de las células. Bortezomib puede destruir las células del cáncer, interfiriendo con su funcionamiento.

Bortezomib se utiliza en el tratamiento del mieloma múltiple (un cáncer de la médula ósea) en pacientes mayores de 18 años:

- solo o junto con los medicamentos doxorubicina liposomal pegilada o dexametasona, para pacientes cuya enfermedad está empeorando (en progresión) después de recibir al menos un tratamiento previo y para aquellos pacientes cuyo trasplante de células precursoras de la sangre no funcionó o no es adecuado,
- en combinación con los medicamentos melfalán y prednisona, para pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada previamente y no sea adecuado que reciban altas dosis de quimioterapia previo a un trasplante de células precursoras de la sangre,
- en combinación con los medicamentos dexametasona o dexametasona junto con talidomida, en pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada previamente y que reciben altas dosis de quimioterapia previa a un trasplante de células precursoras de la sangre (tratamiento de inducción).

Bortezomib Teva se utiliza en el tratamiento del linfoma de células del manto (un tipo de cáncer que afecta a los ganglios linfáticos) en pacientes de 18 años o mayores en combinación con los medicamentos rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona, en pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada previamente y para aquellos pacientes que no se les considera apropiado un trasplante de células precursoras de la sangre.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bortezomib Teva

No use Bortezomib Teva

- si es alérgico al bortezomib, al boro o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).
- si tiene ciertos problemas **graves** de pulmón o de corazón.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Bortezomib Teva si presenta lo siguiente:

- número bajo de glóbulos rojos o glóbulos blancos
- problemas de hemorragia y/o bajo número de plaquetas en sangre
- diarrea, estreñimiento, náuseas o vómitos
- antecedentes de desmayos, mareos o aturdimiento
- problemas de riñón
- problemas de hígado de moderados a graves
- entumecimiento, hormigueo o dolor de las manos o pies (neuropatía) en el pasado
- problemas de corazón o con su presión sanguínea
- dificultad para respirar o tos
- convulsiones
- herpes zóster (localizado incluyendo alrededor de los ojos o extendido por el cuerpo),
- síntomas de síndrome de lisis tumoral, como calambres musculares, debilidad muscular, confusión, pérdida o alteraciones de la visión y dificultad para respirar
- pérdida de memoria, alteraciones del pensamiento, dificultad para andar o pérdida de visión. Pueden ser signos de una infección grave del cerebro y su médico puede aconsejar realizar más pruebas y hacer un seguimiento.

Tendrá que hacerse de forma regular análisis de sangre antes y durante el tratamiento con Bortezomib Teva para comprobar el recuento de las células de la sangre.

Debe informar a su médico si tiene linfoma de células del manto y se le administra rituximab conjuntamente con Bortezomib Teva:

- si cree que tiene en la actualidad o ha tenido en el pasado infección por hepatitis. En unos pocos casos, pacientes que han tenido hepatitis B pueden tener ataques repetidos de hepatitis, que pueden resultar fatales. Si tiene antecedentes de infección por hepatitis B usted será controlado exhaustivamente por su médico para detectar si hay signos de hepatitis B activa.

Antes de empezar el tratamiento con Bortezomib Teva, debe leer los prospectos de todos los medicamentos que tiene que usar en combinación con Bortezomib Teva para consultar la información relacionada con estos medicamentos.

Cuando use talidomida, se debe prestar especial atención a la realización de pruebas de embarazo y a las medidas de prevención (ver Embarazo, lactancia y fertilidad en esta sección).

Niños y adolescentes

Bortezomib Teva no se debe usar en niños y adolescentes porque no se sabe cómo les afectará el medicamento.

Uso de Bortezomib Teva con otros medicamentos

Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

En particular, informe a su médico si está usando medicamentos que contienen alguno de los siguientes principios activos:

- ketoconazol, para tratar infecciones por hongos
- ritonavir, para tratar la infección por el VIH
- rifampicina, un antibiótico para tratar infecciones por bacterias

- carbamazepina, fenitoína o fenobarbital utilizados para tratar la epilepsia
- hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), utilizada para la depresión u otras situaciones
- antidiabéticos orales.

Embarazo, lactancia y fertilidad

No debe usar Bortezomib Teva si está embarazada a no ser que sea claramente necesario.

Tanto los hombres como las mujeres que usan Bortezomib Teva deben utilizar anticonceptivos eficaces durante y hasta 3 meses después del tratamiento. Si, a pesar de estas medidas, se queda embarazada, informe **inmediatamente** a su médico.

NO debe dar el pecho mientras esté usando Bortezomib Teva. Consulte a su médico cuándo es seguro reiniciar la lactancia después de terminar su tratamiento.

La talidomida causa defectos de nacimiento y **muerte del feto**. Cuando Bortezomib Teva se administre en combinación con talidomida se debe seguir el programa de prevención del embarazo de talidomida (consultar el prospecto de talidomida).

Conducción y uso de máquinas

Bortezomib Teva puede causar cansancio, mareos, desmayos o visión borrosa. No conduzca ni maneje herramientas o máquinas si usted experimenta estos efectos secundarios; incluso si usted no los presenta, debe todavía ser cauteloso.

3. Cómo usar Bortezomib Teva

Su médico le indicará la dosis de Bortezomib Teva de acuerdo con su talla y su peso (superficie corporal). La dosis de inicio habitual de Bortezomib Teva es de 1,3 mg/m² de superficie corporal dos veces a la semana.

Su médico puede modificar la dosis y el número total de ciclos de tratamiento dependiendo de su respuesta al tratamiento, de la aparición de ciertos efectos adversos y de su situación de base (p. ej.: problemas de hígado).

Mieloma múltiple en progresión

Cuando Bortezomib Teva se administra **solo**, recibirá 4 dosis de Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea los días 1, 4, 8 y 11, seguido de un intervalo de 10 días “de descanso” sin tratamiento. Este periodo de 21 días (3 semanas) corresponde con un ciclo de tratamiento. Puede recibir hasta 8 ciclos (24 semanas).

También es posible que reciba Bortezomib Teva junto con los medicamentos doxorubicina liposomal pegilada o dexametasona.

Cuando Bortezomib Teva se administra **junto con doxorubicina liposomal pegilada**, recibirá Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea en un ciclo de tratamiento de 21 días y doxorubicina liposomal pegilada 30 mg/m² se administra el día 4 del ciclo de tratamiento de Bortezomib Teva de 21 días, mediante una perfusión intravenosa después de la inyección de Bortezomib Teva. Puede recibir hasta 8 ciclos (24 semanas).

Cuando Bortezomib Teva se administra **junto con dexametasona**, recibirá Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea en un ciclo de tratamiento de 21 días y dexametasona 20 mg se administra por vía oral los días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12, del ciclo de tratamiento de Bortezomib Teva de 21 días. Puede recibir hasta 8 ciclos (24 semanas).

Mieloma múltiple no tratado previamente

Si **no** se ha tratado antes de mieloma múltiple y **no es** candidato a recibir un trasplante de células precursoras de la sangre, recibirá Bortezomib Teva **junto con otros dos medicamentos: melfalán y prednisona.**

En este caso, la duración de un ciclo de tratamiento es de 42 días (6 semanas). Recibirá 9 ciclos (54 semanas).

- En los ciclos 1 a 4, Bortezomib Teva se administra dos veces a la semana los días 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 y 32.
- En los ciclos 5 a 9, Bortezomib Teva se administra una vez a la semana los días 1, 8, 22 y 29.

Melfalán (9 mg/m²) y prednisona (60 mg/m²) se administran vía oral durante los días 1, 2, 3 y 4 de la primera semana de cada ciclo.

Si **no** ha recibido previamente ningún tratamiento para el mieloma múltiple y **es** candidato a recibir un trasplante de células precursoras de la sangre, recibirá Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea junto con los medicamentos dexametasona, o dexametasona y talidomida, como tratamiento de inducción.

Cuando Bortezomib Teva se administra **junto con dexametasona**, recibirá Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea en un ciclo de tratamiento de 21 días y dexametasona se administra por vía oral en dosis de 40 mg los días 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 del ciclo de tratamiento con Bortezomib Teva de 21 días. Recibirá 4 ciclos (12 semanas).

Cuando Bortezomib Teva se administra **junto con talidomida y dexametasona**, la duración de un ciclo de tratamiento es de 28 días (4 semanas).

Dexametasona 40 mg se administra por vía oral los días 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 del ciclo de tratamiento de Bortezomib Teva de 28 días y talidomida se administra por vía oral una vez al día a dosis de 50 mg hasta el día 14 del primer ciclo y, si se tolera, la dosis de talidomida se aumenta a 100 mg en los días 15 a 28 y desde el segundo ciclo y posteriores se puede aumentar aún más hasta 200 mg diarios.

Puede recibir hasta 6 ciclos (24 semanas).

Linfoma de células del manto no tratado previamente

Si **no** se ha tratado antes de linfoma de células del manto recibirá Bortezomib Teva por vía intravenosa o subcutánea **junto con los medicamentos rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona.**

Bortezomib Teva se administra por vía intravenosa o subcutánea en los días 1, 4, 8 y 11, seguido por un “periodo de descanso” sin tratamiento. La duración de un ciclo de tratamiento es de 21 días (3 semanas). Puede recibir hasta 8 ciclos (24 semanas).

Los siguientes medicamentos se administran mediante perfusión intravenosa en el día 1 del ciclo de tratamiento de Bortezomib Teva de 21 días:

Rituximab a dosis de 375 mg/m², ciclofosfamida a dosis de 750 mg/m² y doxorubicina a dosis de 50 mg/m².

Prednisona se administra por vía oral a dosis de 100 mg/m² los días 1, 2, 3, 4 y 5 del ciclo de tratamiento de Bortezomib Teva.

Cómo se administra Bortezomib Teva

Este medicamento se administra por vía intravenosa o subcutánea. Se le administrará Bortezomib Teva por un profesional sanitario experto en el uso de medicamentos citotóxicos.

El polvo de Bortezomib Teva se tiene que disolver antes de la administración. Se hará por un profesional sanitario. La solución reconstituida se inyecta después en una vena o bajo la piel. La inyección en la vena es rápida, dura entre 3 y 5 segundos. La inyección bajo la piel se administra en los muslos o en el abdomen.

Si recibe más Bortezomib Teva del que debe

Este medicamento será administrado por su médico o enfermero, por lo que es improbable que reciba una cantidad excesiva. En el caso improbable de que se produzca una sobredosis, su médico le vigilará por si presenta efectos adversos.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Algunos efectos pueden ser graves.

Si se le administra Bortezomib Teva para mieloma múltiple o linfoma de células del manto, **informe enseguida a su médico** si observa alguno de los síntomas siguientes:

- calambres musculares, debilidad muscular
- confusión, pérdida o alteraciones de la visión, ceguera, convulsiones, dolores de cabeza
- dificultad para respirar, hinchazón de los pies o alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial alta, cansancio, desmayo
- tos y dificultad respiratoria u opresión en el pecho.

El tratamiento con Bortezomib Teva puede causar muy frecuentemente una disminución del número de glóbulos rojos y blancos y plaquetas en sangre. Por lo tanto, tendrá que realizarse de forma regular análisis de sangre antes y durante el tratamiento con Bortezomib Teva, para comprobar regularmente el recuento de sus células en sangre. Puede experimentar una reducción en el número de:

- plaquetas, que le puede hacer ser más propenso a la aparición de hematomas (moratones), o de hemorragia sin lesión evidente (por ejemplo, hemorragia de intestino, estómago, boca y encía o hemorragia en el cerebro o hemorragia del hígado),
- glóbulos rojos, que puede causar anemia, con síntomas como cansancio y palidez,
- glóbulos blancos, que le puede hacer ser más propenso a infecciones o síntomas parecidos a los de la gripe.

Si se le administra Bortezomib Teva para el tratamiento de mieloma múltiple los efectos adversos que puede experimentar se incluyen a continuación:

Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes

- sensibilidad, entumecimiento, hormigueo o sensación de quemazón en la piel o dolor de manos o pies debido a daño en el nervio
- reducción en el número de glóbulos rojos y/o glóbulos blancos (ver arriba)
- fiebre
- sensación de malestar (náuseas) o vómito, pérdida de apetito
- estreñimiento con o sin hinchazón (puede ser grave)
- diarrea: si aparece, es importante que beba más agua de lo habitual. Su médico puede darle otro medicamento para controlar la diarrea
- agotamiento (cansancio), sensación de debilidad
- dolor muscular, dolor óseo.

Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes

- presión arterial baja, bajada repentina de la presión arterial cuando se está de pie, que podría dar lugar a desmayos
- presión arterial alta
- disminución del funcionamiento de los riñones
- dolor de cabeza

- sensación de malestar general, dolor, vértigo, aturdimiento, sensación de debilidad o pérdida del conocimiento
- escalofríos
- infecciones, incluidas neumonía, infecciones respiratorias, bronquitis, infecciones por hongos, tos con flemas, enfermedad de tipo gripal
- herpes zóster (localizado incluyendo alrededor de los ojos o extendido por el cuerpo)
- dolor en el pecho o dificultad al respirar haciendo ejercicio
- diferentes tipos de erupciones
- picor de piel, bultos en la piel o piel seca
- rubor facial o rotura de capilares pequeños
- enrojecimiento de la piel
- deshidratación
- ardor de estómago, hinchazón, eructo, flatulencia, dolor de estómago, hemorragias intestinales o estomacales
- alteración del funcionamiento del hígado
- llagas en la boca o labio, boca seca, úlceras en la boca o dolor de garganta
- pérdida de peso, pérdida del gusto
- calambres musculares, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor en las extremidades
- visión borrosa
- infección de la capa más externa del ojo y de la superficie interna de los párpados (conjuntivitis)
- hemorragias nasales
- dificultad o problemas para dormir, sudores, ansiedad, cambios de humor, estado de ánimo deprimido, desasosiego o agitación, cambios en su estado mental, desorientación
- hinchazón del cuerpo, incluyendo alrededor de los ojos y en otras partes del cuerpo.

Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes

- insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, dolor de pecho, malestar del pecho, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca
- fallo de los riñones
- inflamación de una vena, coágulos de sangre en las venas y los pulmones
- problemas de coagulación sanguínea
- circulación insuficiente
- inflamación del revestimiento del corazón o fluido alrededor del corazón
- infecciones, incluyendo infecciones de las vías urinarias, gripe, infección por el virus del herpes, infección de oído, y celulitis
- deposiciones sanguinolentas o hemorragias en las membranas mucosas, por ejemplo, de la boca o la vagina
- trastornos cerebrovasculares
- parálisis, convulsiones, caídas, trastornos del movimiento, alteraciones o cambios en, o disminución de la sensibilidad (tacto, oído, gusto, olfato), trastornos de la atención, temblores, sacudidas
- artritis, incluyendo inflamación de las articulaciones de los dedos de las manos y los pies y de la mandíbula
- trastornos que afectan a los pulmones, impidiendo que el organismo reciba una cantidad suficiente de oxígeno. Algunos de ellos son dificultad para respirar, falta de aliento, falta de aliento sin hacer ejercicio, respiración que puede llegar a ser superficial, difícil o detenerse, respiración jadeante
- hipo, trastornos del habla
- aumento o disminución de la producción de orina (debido a una lesión renal), dolor al orinar o sangre/proteínas en la orina, retención de líquidos
- alteración del nivel de conciencia, confusión, alteración o pérdida de la memoria
- hipersensibilidad
- pérdida de audición, sordera o zumbido en los oídos, molestias en los oídos
- alteraciones hormonales que pueden afectar a la absorción de la sal y del agua
- hiperactividad de la glándula tiroides

- incapacidad para producir suficiente insulina o resistencia a los niveles normales de insulina
- irritación o inflamación ocular, ojos demasiado húmedos, dolor de ojos, ojos secos, infecciones oculares, quiste en el párpado (chalazión), párpados enrojecidos e hinchados, ojos llorosos (lagrimeo), visión alterada, hemorragia del ojo
- hinchazón de ganglios linfáticos
- rigidez de las articulaciones o músculos, sensación de pesadez, dolor en la ingle
- pérdida del pelo y textura extraña del pelo
- reacciones alérgicas
- enrojecimiento o dolor en el lugar de inyección
- dolor de boca
- infecciones o inflamación de la boca, úlceras en la boca, esófago, estómago e intestino, asociadas a veces a dolor o hemorragia, movimiento escaso del intestino (incluyendo, obstrucción), molestias en el abdomen o en el esófago, dificultad para tragar, vómitos de sangre
- infecciones cutáneas
- infecciones por bacterias y virus
- infección dental
- inflamación del páncreas, obstrucción de las vías biliares
- dolor de los genitales, problemas para lograr una erección
- aumento de peso
- sed
- hepatitis
- trastornos en el lugar de la inyección o relacionados con el dispositivo de inyección
- reacciones y trastornos cutáneos (que pueden ser graves y poner en riesgo la vida), úlceras cutáneas
- moratones, caídas y heridas
- inflamación o hemorragia de los vasos sanguíneos que pueden aparecer como pequeños puntos de color rojo o púrpura (normalmente en las piernas) hasta grandes manchas semejantes a hematomas bajo la piel o el tejido
- quistes benignos
- un trastorno grave y reversible en el cerebro que incluye convulsiones, presión arterial alta, dolores de cabeza, cansancio, confusión, ceguera u otros problemas de la visión.

Raros: pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes

- problemas de corazón, incluyendo ataque al corazón, angina de pecho
- rubor
- decoloración de las venas
- inflamación de los nervios espinales
- problemas con los oídos, hemorragia del oído
- hipoactividad de la glándula tiroidea
- síndrome de Budd–Chiari (síntomas clínicos causados por la obstrucción de las venas hepáticas)
- cambios o anomalías de la función intestinal
- hemorragia cerebral
- coloración amarilla de los ojos y de la piel (ictericia)
- reacción alérgica grave (shock anafiláctico), cuyos signos pueden ser dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho y/o sensación de mareo/desmayo, picor intenso de la piel o bultos en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, que puede causar dificultad para tragar, colapso
- trastornos de las mamas
- desgarro vaginal
- inflamación de los genitales
- incapacidad para tolerar el consumo de alcohol
- demacración o pérdida de masa corporal
- aumento del apetito
- fístula

- derrame articular
- quistes en el revestimiento de las articulaciones (quistes sinoviales)
- fractura
- descomposición de las fibras musculares que provoca otras complicaciones
- hinchazón del hígado, hemorragia del hígado
- cáncer de riñón
- enfermedad de la piel parecida a la psoriasis
- cáncer de piel
- palidez de la piel
- aumento de las plaquetas o las células plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco) en la sangre
- coágulo sanguíneo en vasos sanguíneos pequeños (microangiopatía trombótica)
- reacción anómala a las transfusiones de sangre
- pérdida parcial o total de la visión
- pérdida de libido
- babeo
- ojos saltones
- sensibilidad a la luz
- respiración acelerada
- dolor rectal
- cálculos biliares
- hernia
- heridas
- uñas débiles o quebradizas
- depósitos anómalos de proteínas en órganos vitales
- coma
- úlceras intestinales
- fallo multiorgánico
- muerte
- inflamación de los nervios grave, que puede causar parálisis y dificultad respiratoria (síndrome de Guillain-Barré).

Si se le administra Bortezomib Teva junto con otros medicamentos para el tratamiento de linfoma de células del manto los efectos adversos que puede experimentar se incluyen a continuación:

Muy frecuentes: pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes

- neumonía
- pérdida de apetito
- sensibilidad, entumecimiento, hormigueo o sensación de quemazón en la piel o dolor de manos o pies debido a daño en el nervio.
- náuseas o vómitos
- diarrea
- úlceras en la boca
- estreñimiento
- dolor muscular, dolor óseo
- pérdida del pelo y textura anómala del pelo
- agotamiento, sensación de debilidad
- fiebre

Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes

- herpes zóster (localizado incluyendo alrededor de los ojos o extendido por el cuerpo)
- infección por virus Herpes
- infecciones por bacterias y virus

- infecciones respiratorias, bronquitis, tos con flemas, enfermedad de tipo gripal
- infecciones por hongos
- hipersensibilidad (reacción alérgica)
- incapacidad para producir suficiente insulina o resistencia a los niveles normales de insulina
- retención de líquidos
- dificultad o problemas para dormir
- pérdida del conocimiento
- alteración del nivel de conciencia, confusión
- sensación de mareo
- aumento del ritmo cardíaco, presión arterial alta, sudores
- visión alterada, visión borrosa
- insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, dolor de pecho, malestar del pecho, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca
- presión arterial alta o baja
- bajada repentina de la presión arterial cuando se está de pie, que podría dar lugar a desmayos
- dificultad al respirar con el ejercicio
- tos
- hipo
- zumbido en los oídos, molestias en los oídos
- hemorragia de intestino o estómago
- ardor de estómago
- dolor de estómago, hinchazón
- dificultad para tragar
- infección o inflamación de estómago e intestino
- dolor de estómago
- llagas en la boca o labio, dolor de garganta
- alteración del funcionamiento del hígado
- picor de piel
- enrojecimiento de la piel
- erupción
- espasmos musculares
- infección de las vías urinarias
- dolor de las extremidades
- hinchazón del cuerpo, incluyendo alrededor de los ojos y en otras partes del cuerpo
- escalofríos
- enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección
- sensación de malestar general
- pérdida de peso
- aumento de peso

Poco frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes

- hepatitis
- reacción alérgica grave (reacción anafiláctica), cuyos signos pueden ser dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho y/o sensación de mareo/desmayo, picor intenso de la piel o bultos en la piel, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, que puede causar dificultad para tragar, colapso
- trastornos del movimiento, parálisis, sacudidas
- vértigo
- pérdida de audición, sordera
- trastornos que afectan a los pulmones, impidiendo que el organismo reciba una cantidad suficiente de oxígeno. Algunos de ellos son dificultad para respirar, falta de aliento, falta de aliento sin hacer ejercicio, respiración que puede llegar a ser superficial, difícil o detenerse, respiración jadeante
- coágulos de sangre en los pulmones

- coloración amarilla de los ojos y de la piel (ictericia).
- quiste en el párpado (chalazión), párpados enrojecidos e hinchados.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes)

- coágulo sanguíneo en vasos sanguíneos pequeños (microangiopatía trombótica)

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Bortezomib Teva

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el vial y en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Mantener el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.

La estabilidad en uso química y física de la solución reconstituida se ha demostrado durante 24 horas a 25°C (conservada en el vial original y/o una jeringa). Desde un punto de vista microbiológico, a menos que el método de apertura /reconstitución evite el riesgo de contaminación microbiana, la solución reconstituida debe utilizarse inmediatamente tras la preparación. Si la solución reconstituida no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación tras la reconstitución y las condiciones antes del uso son responsabilidad del usuario.

Bortezomib Teva es exclusivamente para un solo uso.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Bortezomib Teva

- El principio activo es bortezomib. Cada vial contiene 3,5 mg de bortezomib (como éster bórico de manitol).
- Los demás componentes son manitol (E421).

Reconstitución para administración intravenosa:

Tras la reconstitución con 3,5 ml, 1 ml de solución para inyección intravenosa contiene 1 mg de bortezomib.

Reconstitución para administración subcutánea:

Tras la reconstitución con 1,4 ml, 1 ml de solución para inyección subcutánea contiene 2,5 mg de bortezomib.

Aspecto del producto y contenido del envase

Bortezomib Teva es un polvo para solución para inyección de color blanco a blanquecino.

Cada envase de Bortezomib Teva 3,5 mg polvo para solución inyectable contiene un vial de vidrio con un tapón gris y cápsula de aluminio gris, con flip-off rojo. Estos viales se cierran (provistos de envoltura protectora transparente).

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización

Teva Pharma, S.L.U.

c/ Anabel Segura 11, Edificio Albatros B, 1ª planta

28108 Alcobendas Madrid

España

Responsable de la fabricación

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Ave., the 1st District

Bucharest, 011171

Rumanía

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres

Austria	Bortezomib ratiopharm 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Bélgica	Bortezomib Teva 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie
Croacia	Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju
Chipre	Bortezomib/Teva 3,5 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα
Dinamarca	Bortezomib Teva
Estonia	Bortezomib Teva
Francia	Bortézomib Teva 3,5 mg, poudre pour solution injectable
Alemania	Bortezomib-ratiopharm 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Grecia	Bortezomib/Teva 3,5 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα
Hungría	Bortezomib Teva 3,5 mg por oldatos injekcióhoz
Italia	Bortezomib Teva
Luxemburgo	Bortezomib Teva 3,5 mg poudre pour solution injectable
Noruega	Bortezomib Teva
Portugal	Bortezomib Teva
Eslovenia	Bortezomib Teva 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje
España	Bortezomib Teva 3,5 mg polvo para solución inyectable EFG
Suecia	Bortezomib Teva
Reino Unido (IN)	Bortezomib Teva 3.5 mg Powder for Solution for Injection

Fecha de la última revisión de este prospecto: Abril 2021.

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>

Esta información está destinada únicamente a profesionales del sector sanitario:

1. RECONSTITUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVENOSA

Nota: Bortezomib Teva es un agente citotóxico. Por lo tanto, se deberá tener precaución durante la manipulación y la preparación. Se recomienda la utilización de guantes y otras vestimentas protectoras para prevenir el contacto con la piel y proteger al usuario.

PUESTO QUE BORTEZOMIB TEVA CARECE DE CONSERVANTES, SE ACONSEJA SEGUIR ESTRICTAMENTE UNA TÉCNICA ASÉPTICA DURANTE SU MANIPULACIÓN.

1.1 Preparación de un vial de 3,5 mg: añada cuidadosamente 3,5 ml de solución estéril para inyección de cloruro sódico de 9 mg/ml (0,9%) al vial que contiene el polvo de Bortezomib Teva utilizando una jeringa de tamaño adecuado sin quitar el tapón del vial. La disolución del polvo liofilizado se completa en menos de 2 minutos.

La concentración de la solución resultante será 1 mg/ml. La solución debe ser transparente e incolora, con un pH final de 4 a 7. No es necesario comprobar el pH de la solución.

1.2 Antes de la administración, inspeccione visualmente la solución, para descartar la presencia de partículas y decoloración. Si se observa cualquier decoloración o partícula, la solución debe desecharse. Compruebe que se está utilizando la dosis correcta para la administración por **vía intravenosa** (1 mg/ml).

1.3 La solución reconstituida carece de conservantes y se debe utilizar inmediatamente después de su preparación. Sin embargo, la estabilidad química y física durante la utilización de la solución reconstituida cuando se prepara como se describió anteriormente ha sido demostrada durante 24 horas a 25°C conservado en el vial original y/o una jeringa. El tiempo total de conservación del medicamento reconstituido no debe superar las 24 horas antes de la administración. Si la solución reconstituida no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación tras la reconstitución y las condiciones antes del uso son responsabilidad del usuario.

No es necesario proteger el medicamento reconstituido de la luz.

2. ADMINISTRACIÓN

- Una vez disuelto, retire la cantidad apropiada de la solución reconstituida según la dosis calculada basada en el Área de Superficie Corporal del paciente.
- Confirme la dosis y la concentración contenida en la jeringa antes del uso (compruebe que la jeringa está marcada para administración por vía intravenosa).
- Inyecte la solución mediante un bolo intravenoso de 3 a 5 segundos, a través de un catéter intravenoso periférico o central en una vena.
- Lave el catéter periférico o intravenoso con solución de cloruro sódico, 9 mg/ml (0,9%) estéril.

Bortezomib Teva 3,5 mg polvo para solución para inyección SE DEBE ADMINISTRAR ÚNICAMENTE POR VÍA INTRAVENOSA O SUBCUTÁNEA. No administrar por otras vías. La administración intratecal ha provocado casos de muerte.

3. ELIMINACIÓN

Un vial es para un solo uso y la solución restante debe ser desechada.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local para agentes citotóxicos.

Esta información está destinada únicamente a profesionales del sector sanitario:

Solo pueden administrarse por vía subcutánea los viales de 2,5 mg y 3,5 mg, como se describe a continuación.

1. RECONSTITUCIÓN PARA INYECCIÓN SUBCUTÁNEA

Nota: Bortezomib Teva es un agente citotóxico. Por lo tanto, se deberá tener precaución durante la manipulación y la preparación. Se recomienda la utilización de guantes y otras vestimentas protectoras para prevenir el contacto con la piel y proteger al usuario.

PUESTO QUE BORTEZOMIB TEVA CARECE DE CONSERVANTES, SE ACONSEJA SEGUIR ESTRICTAMENTE UNA TÉCNICA ASÉPTICA DURANTE SU MANIPULACIÓN.

1.1. Preparación de un vial de 3,5 mg: añade cuidadosamente 1,4 ml de solución estéril para inyección de cloruro sódico de 9 mg/ml (0,9%) al vial que contiene el polvo de Bortezomib Teva utilizando una jeringa de tamaño adecuado sin quitar el tapón del vial. La disolución del polvo liofilizado se completa en menos de 2 minutos.

La concentración de la solución resultante será 2,5 mg/ml. La solución será transparente e incolora, con un pH final de 4 a 7. No es necesario comprobar el pH de la solución.

1.2 Antes de la administración, inspeccione visualmente la solución, para descartar la presencia de partículas y decoloración. Si se observa cualquier decoloración o partícula, la solución debe desecharse. Compruebe que se está utilizando la dosis correcta para la administración por **vía subcutánea** (2,5 mg/ml).

1.3 La solución reconstituida carece de conservantes y se debe utilizar inmediatamente después de su preparación. Sin embargo, la estabilidad química y física durante la utilización de la solución reconstituida cuando se prepara como se describió anteriormente ha sido demostrada durante 24 horas a 25°C conservado en el vial original y/o una jeringa. El tiempo total de conservación del medicamento reconstituido no debe superar las 24 horas antes de la administración. Si la solución reconstituida no se usa inmediatamente, los tiempos de conservación tras la reconstitución y las condiciones antes del uso son responsabilidad del usuario.

No es necesario proteger el medicamento reconstituido de la luz.

2. ADMINISTRACIÓN

- Una vez disuelto, retire la cantidad apropiada de la solución reconstituida según la dosis calculada basada en el Área de Superficie Corporal del paciente.
- Confirme la dosis y la concentración contenida en la jeringa antes del uso (compruebe que la jeringa está marcada para su administración por vía subcutánea).
- Inyecte la solución por vía subcutánea en un ángulo de 45 a 90°.
- Inyecte la solución por vía subcutánea en el muslo (derecho o izquierdo) o en el abdomen (lado derecho o izquierdo).
- Se debe rotar los lugares de administración con cada inyección.

- Si se producen reacciones locales en el lugar de administración tras la inyección por vía subcutánea de Bortezomib Teva, se puede administrar o bien por vía subcutánea una solución menos concentrada de bortezomib (1 mg/ml en lugar de a 2,5 mg/ml) o bien se recomienda cambiar a una inyección intravenosa.

Bortezomib Teva 3,5 mg polvo para solución para inyección SE DEBE ADMINISTRAR ÚNICAMENTE POR VÍA INTRAVENOSA O SUBCUTÁNEA. No administrar por otras vías. La administración intratecal ha provocado casos de muerte.

3. ELIMINACIÓN

Un vial es para un solo uso y la solución restante debe ser desechada.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local para agentes citotóxicos.