

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Elvanse Adultos 30 mg cápsulas duras

lisdexanfetamina dimesilato

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Elvanse Adultos y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Elvanse Adultos
3. Cómo tomar Elvanse Adultos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Elvanse Adultos
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Elvanse Adultos y para qué se utiliza

Qué es Elvanse Adultos

Elvanse Adultos contiene el principio activo lisdexanfetamina dimesilato que actúa sobre la actividad cerebral. Ayuda a mejorar la atención, la concentración y a reducir la impulsividad.

Elvanse Adultos es un medicamento de acción prolongada que actúa de forma gradual durante 14 horas.

Para qué se utiliza

Elvanse Adultos forma parte de un programa de tratamiento integral para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos que han tenido TDAH desde la infancia. Si no ha recibido anteriormente tratamiento para el TDAH, el médico comprobará si ha tenido TDAH desde la infancia antes de recetarle Elvanse Adultos.

Debe informar a su médico si no se siente mejor o si se siente peor después de un mes de tratamiento.

Elvanse Adultos no está recomendado para todos los pacientes con TDAH, y la decisión de usar este medicamento debe basarse en una evaluación médica exhaustiva.

Para niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad, hay disponible otro medicamento que contiene lisdexanfetamina dimesilato. Elvanse Adultos no está indicado en el tratamiento del TDAH en niños menores de 6 años de edad, ya que se desconoce si es seguro o beneficioso para personas tan jóvenes.

Cómo actúa Elvanse Adultos

Elvanse Adultos mejora la actividad de ciertas partes del cerebro que se encuentran con baja actividad. El medicamento puede ayudar a mejorar la atención, la concentración y a reducir el comportamiento impulsivo.

El medicamento se administra como parte de un programa de tratamiento que suele incluir:

- terapia psicológica
- terapia educativa
- terapia del comportamiento
- terapia ocupacional
- terapia social

Solo puede ser recetado por médicos que tengan experiencia en el tratamiento de personas que padecen problemas de comportamiento.

Acerca del TDAH

Las personas que padecen TDAH tienen dificultades para:

- permanecer sentados
- concentrarse

Estas personas no tienen la culpa de no ser capaces de hacer estas cosas. Sin embargo, el TDAH puede provocar problemas en la vida diaria. Las personas que padecen TDAH pueden tener dificultades para trabajar, aprender y relacionarse, y tienen la autoestima baja.

El TDAH no afecta la inteligencia de la persona.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Elvanse Adultos

NO tome Elvanse Adultos

- si es alérgico a la lisdexanfetamina, a otros compuestos de anfetaminas o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6);
- si está tomando un medicamento denominado “inhibidor de la monoaminoxidasa” (IMAO) que se utiliza para la depresión o si ha tomado un IMAO en los últimos 14 días;
- si tiene problemas de tiroides;
- si se siente excepcionalmente exaltado, más activo o más desinhibido de lo normal;
- si tiene o ha tenido alguna vez problemas de corazón, como un infarto, latidos irregulares, dolor y malestar en el pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca o problemas de corazón de nacimiento;
- si tiene la tensión arterial alta o muy alta o un estrechamiento de los vasos sanguíneos;
- si tiene la tensión ocular elevada (glaucoma).

No tome Elvanse Adultos si presenta cualquiera de las circunstancias indicadas arriba. Si no está seguro, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar Elvanse Adultos, ya que puede empeorar estos problemas.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar el tratamiento con Elvanse Adultos si:

- ha abusado alguna vez de los medicamentos con receta o de drogas;
- ha tenido problemas de riñón;
- ha tenido ataques (crisis, convulsiones, epilepsia) o alteración en el electroencefalograma (EEG);
- ha tenido temblores difíciles de controlar en cualquier parte del cuerpo o si repite sonidos y palabras;
- tiene la tensión arterial alta;
- antecedentes familiares o médicos de latido cardíaco irregular (visible en un electrocardiograma), o si padece una enfermedad o sigue un tratamiento que le hagan proclive a arritmias o alteraciones del sodio;
- tiene un problema de corazón no incluido en la sección anterior “No tome Elvanse Adultos”;
- tiene antecedentes de ictus;
- tiene un problema de salud mental, entre otros:
 - cambios bruscos de humor (de estados maníacos a depresivos, lo que se conoce como “trastorno bipolar”);
 - empieza a comportarse de forma agresiva u hostil o se agravan estos comportamientos;
 - ve, oye o siente cosas que no son reales (alucinaciones);
 - cree cosas que no son reales (delirio);
 - se siente más desconfiado de lo normal (paranoia);
 - se siente agitado, ansioso o tenso;
 - se siente deprimido o culpable.

O si es una mujer fértil, tiene intención de quedarse embarazada o está embarazada (ver la sección “Embarazo, lactancia y fertilidad”).

Informe a su médico o farmacéutico si presenta cualquiera de las circunstancias indicadas arriba antes de empezar el tratamiento. Elvanse Adultos puede empeorar estos problemas. Su médico querrá hacer un seguimiento de cómo le afecta el medicamento.

Si Elvanse Adultos no se utiliza de forma adecuada, puede provocar un comportamiento anormal y el usuario puede desarrollar dependencia del medicamento. Informe a su médico si alguna vez ha abusado del alcohol, los medicamentos con receta o las drogas, o si ha tenido dependencia de alguna de estas sustancias. No dé este medicamento a ninguna otra persona, aunque sus síntomas parezcan similares.

Elvanse Adultos puede provocar trastornos del latido cardíaco en algunos pacientes. Si experimenta palpitaciones o latidos irregulares durante el período de tratamiento, deberá informar a su médico inmediatamente. El riesgo de padecer problemas cardíacos puede aumentar al incrementar la dosis. Por lo tanto, deberá seguirse la dosis recomendada.

Comprobaciones que su médico hará antes de que empiece a tomar Elvanse Adultos

Estas comprobaciones se hacen para decidir si Elvanse Adultos es el medicamento correcto para usted. Su médico le preguntará sobre:

- otros medicamentos que esté tomando;
- si en su familia hay historial de muerte súbita inexplicable;
- cualquier otro problema médico (como problemas de corazón) que haya tenido usted o su familia;
- cómo se siente, si se siente alegre o triste, si tiene pensamientos extraños o si ha tenido estos sentimientos en el pasado;
- si tiene un historial familiar de “tics” (un temblor difícil de controlar y repetido de cualquier parte del cuerpo o la repetición de sonidos y palabras);
- cualquier problema de salud mental o conducta que usted o su familia haya padecido. Su médico revisará su historial de salud mental y comprobará si alguien de su familia presenta un historial de suicidio, trastorno bipolar (cambios de humor desde estados maníacos a depresivos) o depresión.

Es importante que facilite la mayor información que le sea posible. Esto ayudará a su médico a decidir si Elvanse Adultos es el medicamento correcto para usted. Su médico puede decidir que hay que realizar otras pruebas antes de que empiece a tomar este medicamento.

Efectos sobre el peso

Elvanse Adultos puede provocar una pérdida de peso en algunas personas.

Su médico le hará un seguimiento de su peso, así como para saber si come bien. Si está perdiendo peso, puede que su médico le interrumpa el tratamiento con Elvanse Adultos durante un periodo breve de tiempo.

Uso de Elvanse Adultos con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

NO tome Elvanse Adultos si:

- está tomando un medicamento llamado “inhibidor de la monoaminoxidasa” (IMAO) que se usa para la depresión o ha tomado un IMAO en los últimos 14 días. El uso de un IMAO con Elvanse Adultos puede provocar un aumento repentino de la tensión arterial. Su médico o farmacéutico puede decirle si está tomando un medicamento que es un IMAO.

Elvanse Adultos puede interactuar con otros medicamentos. Si toma alguno de los siguientes medicamentos consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar Elvanse Adultos:

- medicamentos para problemas de salud mental graves
- medicamentos que se usan para subir o bajar la tensión arterial
- medicamentos usados durante la cirugía, como los analgésicos
- remedios para la tos y el catarro. Algunos de estos medicamentos pueden afectar a la tensión arterial así que es importante que consulte con su farmacéutico cuando adquiera algunos de estos medicamentos
- medicamentos que pueden afectar a la acidez de la orina, como la vitamina C (ácido ascórbico) o el bicarbonato de sodio (por ejemplo en medicamentos para la indigestión).

Si no está seguro si los medicamentos que toma están en la lista superior, consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar Elvanse Adultos.

Control de dopaje y uso en deportistas

Se debe advertir a los pacientes que este medicamento puede producir un resultado positivo en las pruebas de control de drogas.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Elvanse Adultos en el cuerpo se transforma en otras sustancias que pueden atravesar la placenta y pasar a la leche materna. Los datos disponibles sobre el uso de Elvanse Adultos durante los primeros tres meses del embarazo no indican un mayor riesgo de malformaciones congénitas en el niño, pero pueden aumentar el riesgo de preeclampsia (afección que generalmente ocurre después de las 20 semanas de embarazo y se caracteriza por tensión arterial alta y proteínas en la orina) y parto prematuro. Los recién nacidos expuestos a anfetamina durante el embarazo pueden presentar síntomas de abstinencia (temblor, irritabilidad, hipertensión muscular). No debe utilizar este medicamento durante el embarazo a no ser que su médico se lo indique explícitamente, ni dar el pecho si está tomando Elvanse Adultos.

Conducción y uso de máquinas

Puede que se sienta mareado, que tenga problemas para fijar la vista o que vea borroso cuando tome Elvanse Adultos. Si esto le ocurre, es peligroso realizar actividades como conducir o utilizar máquinas.

ELVANSE ADULTOS CONTIENE SODIO

Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por cápsula; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

3. Cómo tomar Elvanse Adultos

Cuánto tomar

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Elvanse Adultos es solo para usted. No le dé este medicamento a nadie más, incluso si tiene síntomas similares.

Cómo tomar Elvanse Adultos

- Tome Elvanse Adultos por la mañana antes del desayuno. Se puede tomar con o sin alimentos.
- Hay dos maneras de tomar Elvanse Adultos:
 - Tragar la cápsula entera con un vaso de agua.
 - Abrir la cápsula y vaciar el contenido en:
 - un alimento blando como un yogur
 - un vaso de agua o zumo de naranja

Utilice una cuchara para deshacer cualquier grumo y remover bien Elvanse Adultos y el yogur, el agua o el zumo de naranja hasta que se mezcle todo bien. Tome todo el yogur o beba todo el agua o zumo de naranja inmediatamente después de mezclar con Elvanse Adultos. No lo guarde. No se preocupe si queda una película en el vaso o recipiente; no es el principio activo.

Dosis

- Su médico le indicará qué cápsula tiene que tomar cada día.
- La dosis recomendada al principio del tratamiento es de 30 mg. Su médico puede aumentar la dosis si lo considera necesario. La dosis máxima diaria es de 70 mg.
- Si tiene algún problema de riñón, su médico le puede reducir la dosis.
- Si es un paciente de edad avanzada, su médico evaluará su presión arterial y estado cardiovascular antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento (ver sección 2 “NO tome Elvanse Adultos” y “Advertencias y precauciones”). También es posible que su médico le reduzca la dosis.
- No divida la dosis de una cápsula, tómese todo el contenido de la cápsula. No tome menos del contenido de una cápsula al día.

Si no se encuentra mejor después de 1 mes de tratamiento

Si no se siente mejor, informe a su médico. Puede que necesite un tratamiento diferente.

Si hace un uso inadecuado de Elvanse Adultos

- Si usa Elvanse Adultos de forma incorrecta, puede experimentar un comportamiento anormal o desarrollar dependencia del medicamento. Por tanto, informe a su médico si alguna vez ha tenido problemas con el alcohol, los medicamentos con receta o las drogas.

Si toma más Elvanse Adultos del que debe

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a un médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Los signos de sobredosis pueden incluir: inquietud, temblores, aumento de movimientos incontrolados, temblor muscular, respiración acelerada, confusión, tendencia a pelearse o discutir, ver, sentir u oír cosas que no son reales (alucinaciones), estado de pánico, fiebre alta o colapso muscular. A continuación se pueden sentir cansancio y depresión. También pueden darse náuseas, vómitos, diarrea y calambres estomacales. Pueden darse también cambios en el ritmo cardíaco (lento, rápido o irregular), tensión arterial alta o baja, colapso circulatorio, ataques y coma.

Si olvidó tomar Elvanse Adultos

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si olvidó una dosis, espere al día siguiente. Evite tomar la dosis por la tarde ante la posibilidad de trastornos del sueño (insomnio).

Si interrumpe el tratamiento con Elvanse Adultos

Si deja de tomar este medicamento, puede que vuelvan los síntomas del TDAH.

No deje de tomar el medicamento sin antes consultar con su médico. No debe dejar de tomar el medicamento de forma repentina ni por su propia cuenta.

Qué hará su médico cuando usted esté con el tratamiento Elvanse Adultos

Su médico le realizará algunas pruebas

- Antes de empezar: asegurarse de que Elvanse Adultos es seguro y beneficioso para usted.
- Después de empezar: su médico le hará pruebas por lo menos cada 6 meses, e incluso más a menudo. También se le harán pruebas cuando cambie de dosis. Estas pruebas incluirán:
 - control del apetito,
 - medición del peso,
 - medición de la tensión arterial y las pulsaciones,
 - comprobar si ha tenido problemas de humor, estado de ánimo o cualquier otro sentimiento fuera de lo normal o si estas cuestiones han empeorado al tomar Elvanse Adultos.

Tratamiento a largo plazo

Elvanse Adultos no se necesita tomar para siempre. Si toma Elvanse Adultos durante más de un año, su médico debe interrumpir el tratamiento durante un periodo breve de tiempo, como puede ser durante las vacaciones. Esto permite ver si todavía necesita el medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Su médico le informará sobre estos efectos adversos.

Algunos efectos adversos pueden ser graves. Si aparece cualquiera de los efectos adversos mencionados a continuación, acuda al médico de inmediato:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 adultos)

- latidos irregulares (palpitaciones)
- dolor en el pecho (puede ser un signo de problemas cardíacos)

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 adultos)

- sentirse más emocionado, activo o desinhibido de lo normal (manía)
- reacción alérgica (hipersensibilidad)

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- ver, sentir u oír cosas que no son reales (alucinaciones)
- reacción alérgica grave caracterizada por una bajada intensa de tensión arterial, dificultad para respirar y urticaria/picores (reacción anafiláctica)
- ver, sentir u oír cosas que no son reales, paranoia y delirios (episodios psicóticos)
- empeoramiento del trastorno de Tourette, con signos como sacudidas repetidas y difíciles de controlar de alguna parte del cuerpo o repetición de sonidos y palabras (tics)
- ataques (crisis convulsivas)
- latido cardíaco anormal, latido cardíaco irregular potencialmente mortal (observado en un electrocardiograma). Ver sección 2, “Advertencias y precauciones”.
- lesión alérgica del hígado que se puede detectar por el color amarillo de los ojos y/o piel (hepatitis eosinofílica)
- hinchazón del rostro, la lengua o la garganta; dificultad para tragar; urticaria y dificultades respiratorias (angioedema) o erupción cutánea grave, con o sin ampollas, en la piel y en las membranas mucosas o irritación cutánea, úlceras o hinchazón de la boca, la garganta, los ojos, la nariz y alrededor de los genitales (síndrome de Stevens-Johnson)
- falta de aire o hinchazón de las piernas (signos de enfermedad del músculo cardíaco)

Si presenta alguno de los efectos adversos mencionados anteriormente, acuda al médico de inmediato.

Otros efectos adversos incluyen los siguientes. Si se vuelven graves, informe a su médico o farmacéutico:**Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 adultos)**

- disminución del apetito
- incapacidad para dormir
- boca seca
- dolor de cabeza

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 adultos)

- sentirse agitado, nervioso, ansioso o irritable
- sentirse más cansado o inquieto de lo normal
- incapacidad para alcanzar o mantener una erección o cambios en el deseo sexual
- sentirse mareado
- espasmos, sacudidas y temblores incontrolados o estar más activo de lo normal
- temblores repetidos y difíciles de controlar en cualquier parte del cuerpo o repetición de sonidos y palabras (tics)
- cambios de humor
- tensión arterial alta, latido rápido o irregular (taquicardia)
- dificultad respiratoria
- náuseas o diarrea
- estreñimiento
- pérdida de peso
- sudoración excesiva
- dolor de estómago

- rechinar de dientes

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 adultos)

- hablar sin parar
- sentirse deprimido, preocupado, triste o intranquilo (disforia)
- sentirse demasiado feliz o emocionado (euforia)
- pellizcarse la piel de manera excesiva
- temblores o sacudidas incontrolados
- sentir más sueño de lo normal
- picor, erupción cutánea o zonas de la piel enrojecidas elevadas que pican (urticaria)
- visión borrosa
- temperatura alta (fiebre)
- vómitos
- sabor a metal o cambios en el sentido del gusto (disgeusia)
- desmayo
- hemorragia nasal

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

- dilatación excesiva de las pupilas
- agresividad
- mala circulación de la sangre que hace que los dedos de las manos y los pies se duerman y adquieran un color pálido (fenómeno de Raynaud)

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Elvanse Adultos


No conservar a temperatura superior a 25°C.

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Guardar este medicamento en lugar seguro, donde otras personas no puedan acceder a él. Puede causar daños graves a las personas que no les ha sido recetado.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el frasco y en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice este medicamento si las cápsulas muestran cualquier tipo de daño.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Elvanse Adultos

El principio activo es lisdexanfetamina dimesilato.

Cada cápsula dura de 30 mg contiene 30 mg de lisdexanfetamina dimesilato, que equivalen a 8,9 mg de dexanfetamina.

Los demás componentes son:

- Contenido de la cápsula: celulosa microcristalina (E460), croscarmelosa de sodio (E468), estearato de magnesio (E572)
- Cobertura de la cápsula: gelatina, dióxido de titanio (E171)
 - Cada cápsula dura de 30 mg también contiene eritrosina (E127)
- Tinta de impresión: shellac (E904), hidróxido potásico (E525), óxido de hierro negro (E172), propilenglicol (E1520) y solución de amoníaco, concentrada (E527).

Aspecto del producto y contenido del envase

Cápsulas duras.

Las cápsulas de 30 mg tienen el cuerpo blanco opaco y la tapa rosa opaca, con la impresión “S489” y “30 mg” en tinta negra.

Tamaño del envase: 28 o 30 cápsulas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50-58 Baggot Street Lower Dublín 2, D02 HW68
Irlanda

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com

Responsable de la fabricación:

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Block 2 & 3 Miesian Plaza
50 – 58 Baggot Street Lower
Dublín 2
Irlanda

o

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
Block 2 Miesian Plaza
50 – 58 Baggot Street Lower
Dublín 2, D02 HW68
Irlanda

o

Takeda GmbH,
Plant Oranienburg, Lehnitzstrasse 70-98,
16515 Oranienburg
Alemania

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

Takeda Farmacéutica España S.A.
Calle Albacete, 5, planta 9ª,
Edificio Los Cubos
28027 Madrid
España
Tel: +34 91 790 42 22

ESTE MEDICAMENTO ESTÁ AUTORIZADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y EN REINO UNIDO (IRLANDA DEL NORTE) CON LOS SIGUIENTES NOMBRES:

Austria	Elvanse Erwachsene
Dinamarca	Aduvanz
Finlandia, Alemania, Islandia	Elvanse Adult
Noruega	Aduvanz
España	Elvanse Adultos
Suecia	Elvanse Vuxen
Reino Unido (Irlanda del Norte)	Elvanse Adult

Fecha de la última revisión de este prospecto: 11/2024

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).