Prospecto: Información para el usuario

Bacnas 20 mg/g pomada nasal

Mupirocina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es **Bacnas** y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar **Bacnas**
3. Cómo usar **Bacnas**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Bacnas**
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es Bacnas y para qué se utiliza

Bacnas 20 mg/g pomada nasal (en este prospecto llamado Bacnas) contiene la sustancia activa denominada mupirocina cálcica. Bacnas es una pomada nasal antibiótica.

Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro.

Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico.

No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura.

Se emplea para:

- destruir un grupo de bacterias en la nariz denominadas «estafilococos».
- Este grupo incluye el SARM (*Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina).
- Esta pomada debe usarse únicamente en la nariz.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Bacnas

No use Bacnas

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

si es alérgico (hipersensible) a la mupirocina cálcica, la mupirocina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Los lactantes no deben tratarse con Bacnas para evitar su aspiración en la tráquea.

Si no está seguro de si esta limitación es aplicable a usted, no use este medicamento. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Bacnas.

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Bacnas.
Bacnas puede causar reacciones cutáneas graves o alergias. Ver las "Situaciones a tener en cuenta" en sección 4.

El uso prolongado de Bacnas puede provocar el desarrollo de infecciones con organismos no sensibles. Si esto sucede informe a su médico, farmacéutico o enfermero.

Mantenga la pomada lejos de los ojos.
- En caso de contacto accidental de la pomada con los ojos, lávelos a fondo con agua.

Otros medicamentos y Bacnas
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas
No es probable que Bacnas vaya a afectar su capacidad de conducir u operar máquinas.

3. Cómo usar Bacnas

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Posología
Adultos (incluidas personas de edad avanzada) y niños a partir de un año de edad:
Aplique Bacnas dos o tres veces al día en las dos fosas nasales.

Niños menores de un año de edad:
Bacnas no debe utilizarse en niños menores de un año de edad.

Pacientes con insuficiencia renal:
No es necesario el ajuste de la dosis.

Pacientes con insuficiencia hepática:
No es necesario el ajuste de la dosis.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Uso de este medicamento
Aplicar Bacnas 2 a 3 veces al día en la nariz.
1. Lávese y seque las manos.
2. Coloque una pequeña cantidad de Bacnas, aproximadamente del tamaño de la cabeza de una cerilla, en su dedo meñique.
3. Aplíquela en el interior de una fosa nasal.
4. Repita los pasos 2 y 3 para la otra fosa nasal.
5. Presione los laterales de la nariz para repartir la pomada por la fosa nasal.
6. Coloque de nuevo el tapón en el tubo y lávese las manos.

En lugar del dedo meñique puede usar también un bastoncillo de algodón para aplicar la pomada, sobre todo en niños pequeños o personas gravemente enfermas.

Cuánto tiempo debe usar Bacnas
Use Bacnas el tiempo que le haya indicado su médico. Si no está seguro, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Por regla general, las bacterias desaparecen de la nariz entre 5 a 7 días después de iniciar el tratamiento.

En caso de ingesta de Bacnas
Si ingiere alguna cantidad de la pomada, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar Bacnas
- Si olvidó la aplicación de Bacnas, aplique la pomada en cuanto se acuerde.
- Si debe aplicarse la siguiente dosis en menos de una hora, no aplique la dosis olvidada.
- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Bacnas
Si interrumpe el tratamiento con Bacnas antes de tiempo es posible que no se hayan destruido todas las bacterias, o que continúen reproduciéndose. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero si interrumpe el uso de la pomada.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Situaciones a tener en cuenta

Reacciones cutáneas graves o alergias:
Son muy raras en las personas que usan Bacnas. Los signos incluyen:
- Exantema abultado con picor
- hinchazón, en ocasiones en el rostro o la boca, que dificulta la respiración
- desmayo o pérdida del conocimiento.

➔ **Póngase inmediatamente en contacto con un médico** si presenta alguno de estos síntomas. Interrumpa el tratamiento con Bacnas.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

- Si desarrolla una reacción cutánea grave o alergia:
- lave la pomada para eliminarla
- interrumpa su uso
- consulte al médico lo antes posible

En ocasiones raras, los medicamentos como Bacnas pueden provocar una inflamación del colon (intestino grueso), provocando diarrea, habitualmente con sangre y moco, dolor de estómago y fiebre (*colitis pseudomembranosa*).

➔ **Informe a su médico tan pronto como sea posible** si presenta alguno de estos síntomas.

Este medicamento puede provocar los siguientes efectos adversos:

Poco frecuentes (pueden afectar hasta a 1 de cada 100 personas)
- Picor, enrojecimiento, quemazón, hormigueo o pinchazos en la nariz.

Muy raras (pueden afectar hasta a 1 de cada 10.000 personas)
- Algunas personas pueden desarrollar una reacción cutánea o alergia que puede a ser grave. Entre los signos figuran exantema, picor, enrojecimiento o dolor.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Bacnas

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el tubo y en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
- No conservar a temperatura superior a 25 °C.
- Tras la primera apertura el contenido se puede usar durante 7 días.
- Bacnas es una pomada blanda de color blanquecino. No lo utilice si su aspecto es diferente a lo normal.
- Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Bacnas
- El principio activo es mupirocina en forma de mupirocina cálcica. 100 g de pomada nasal contienen 2,00 g de mupirocina en forma de mupirocina cálcica. 1 g de pomada nasal contiene 20 mg de mupirocina en forma de mupirocina cálcica.
- Los demás componentes son parafina blanca y blanda y bis-digliceril poliaciladipato-2.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Aspecto de Bacnas y contenido del envase

- Bacnas es una pomada nasal blanda de color blanquecino.
- Bacnas está disponible en tubos de 3 g o 5 g. Cada tubo se presenta dentro de una caja.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Str. 1
64646 Heppenheim
Alemania

Representante local

Galenicum Derma, S.L.U.
Ctra N-1, Km 36
28750, San Agustin del Guadalix (Madrid)
España

Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo con los siguientes nombres:

Alemania:	Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe
Francia:	MupiNa 2 %, pommade nasale
Grecia:	MupiNa
Italia:	PSEROCINA NASALE
Países Bajos:	Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf
Austria:	Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe
Polonia:	Mupina
Portugal:	Mupirocina Infectopharm Nasal
Eslovaquia:	Mupina 20 mg/g nosová masť
España:	Bacnas 20 mg/g pomada nasal
República Checa:	Mupina
Hungría:	Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g orrkenőcs
Reino Unido:	Mupirocin 20 mg/g Nasal Ointment

Fecha de la última revisión de este prospecto: 05/2023
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/

MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios