

## Prospecto: información para el usuario

### Sitagliptina/Metformina Stada 50 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película EFG sitagliptina/metformina, hidrocloreuro

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### Contenido del prospecto

1. Qué es Sitagliptina/Metformina Stada y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Sitagliptina/Metformina Stada
3. Cómo tomar Sitagliptina/Metformina Stada
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Sitagliptina/Metformina Stada
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es Sitagliptina/Metformina Stada y para qué se utiliza

Sitagliptina/Metformina Stada contiene dos medicamentos distintos, llamados sitagliptina y metformina.

- La sitagliptina pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores de la DPP-4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4)
- La metformina pertenece a una clase de medicamentos denominados biguanidas.

Actúan conjuntamente para controlar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes adultos con una forma de diabetes llamada “diabetes mellitus tipo 2”. Este medicamento ayuda a aumentar los niveles de insulina producida después de una comida y reduce la cantidad de azúcar producida por su cuerpo.

Junto con la dieta y el ejercicio, este medicamento le ayuda a bajar su nivel de azúcar en la sangre. Este medicamento se puede usar sólo o con ciertos medicamentos para la diabetes (insulina, sulfonilureas o glitazonas).

#### ¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que su cuerpo no produce insulina suficiente y la insulina que produce su cuerpo no funciona tan bien como debería. Su cuerpo puede también producir demasiado azúcar.

Cuando esto ocurre, se acumula azúcar (glucosa) en la sangre. Esto puede conducir a problemas médicos graves, como enfermedades que afectan al corazón (cardíacas), enfermedades que afectan al riñón (renales), ceguera y amputaciones.

## 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Sitagliptina/Metformina Stada

### **NO tome Sitagliptina/Metformina Stada:**

- si es alérgico a sitagliptina, a metformina o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- si tiene una reducción grave de la función renal
- si tiene diabetes no controlada con, por ejemplo, hiperglucemia grave (glucosa alta en sangre), náuseas, vómitos, diarrea, pérdida rápida de peso, acidosis láctica (ver “Riesgo de acidosis láctica” a continuación) o cetoacidosis. La cetoacidosis es un trastorno en el que las sustancias llamadas “cuerpos cetónicos” se acumulan en la sangre, lo que puede conducir a un pre-coma diabético. Los síntomas incluyen dolor de estómago, respiración rápida y profunda, somnolencia o que su aliento desarrolle un aroma afrutado poco habitual
- si tiene una infección grave o está deshidratado
- si le van a hacer una radiografía para la que deben inyectarle un contraste. Necesitará dejar de tomar sitagliptina/metformina en el momento de la radiografía y durante 2 o más días después, tal como le indique su médico, dependiendo del funcionamiento de sus riñones
- si ha tenido recientemente un ataque al corazón o tiene problemas circulatorios graves, como “shock” o dificultades para respirar
- si tiene problemas de hígado
- si bebe alcohol en exceso (ya sea cada día o sólo de vez en cuando)
- si se encuentra en periodo de lactancia.

No tome sitagliptina/metformina si le afecta cualquiera de las circunstancias anteriores y consulte con su médico acerca de otras formas de controlar su diabetes. Si no está seguro, consulte con su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar sitagliptina/metformina.

### **Advertencias y precauciones**

Han sido comunicados casos de inflamación del páncreas (pancreatitis) en pacientes tratados con sitagliptina/metformina (ver sección 4).

Si usted observa ampollas en la piel, puede ser un signo de una enfermedad llamada penfigoide bulloso. Es posible que su médico le pida que deje de tomar sitagliptina/metformina.

### **Riesgo de acidosis láctica**

Sitagliptina/metformina puede ocasionar un efecto adverso muy raro, pero muy grave, llamado acidosis láctica, en especial si sus riñones no funcionan de forma adecuada. El riesgo de desarrollar acidosis láctica también se ve aumentado con la diabetes descontrolada, infecciones graves, el ayuno prolongado o la ingesta de alcohol, la deshidratación (ver más información a continuación), problemas en el hígado y cualquier trastorno médico en el que una parte del cuerpo tenga un suministro reducido de oxígeno (como enfermedades agudas y graves del corazón).

Si cualquiera de lo anterior es aplicable a usted, consulte a su médico para obtener más instrucciones.

**Deje de tomar sitagliptina/metformina durante un corto periodo de tiempo si tiene un trastorno que pueda estar asociado con la deshidratación** (pérdida significativa de líquidos corporales), como vómitos intensos, diarrea, fiebre, exposición al calor o si bebe menos líquido de lo normal. Consulte con su médico para obtener más instrucciones.

**Deje de tomar sitagliptina/metformina y póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano inmediatamente si experimenta cualquiera de los síntomas que produce la acidosis láctica, ya que este trastorno puede dar lugar a coma.**

Los síntomas de la acidosis láctica incluyen:

- vómitos
- dolor de estómago (dolor abdominal)
- calambres musculares
- sensación general de malestar, con un cansancio intenso
- dificultad para respirar
- reducción de la temperatura corporal y de la frecuencia de los latidos del corazón

La acidosis láctica es una urgencia médica y se debe tratar en un hospital.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Sitagliptina/Metformina Stada:

- si padece o ha padecido una enfermedad del páncreas (como pancreatitis).
- si padece o ha padecido cálculos biliares, adicción al alcohol o tiene los niveles en sangre muy altos de triglicéridos (un tipo de grasa). Estas situaciones médicas pueden incrementar su probabilidad de desarrollar pancreatitis (ver sección 4).
- si tiene diabetes tipo 1. Esta enfermedad también puede llamarse diabetes dependiente de insulina.
- si tiene o ha tenido una reacción alérgica a la sitagliptina, la metformina o sitagliptina/metformina (ver sección 4).
- si a la vez que sitagliptina/metformina está tomando una sulfonilurea o insulina, otros medicamentos para la diabetes, porque puede sufrir bajadas de los niveles de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Puede que su médico considere necesario reducir la dosis de la sulfonilurea o insulina que está tomando.

Si necesita someterse a una cirugía mayor debe dejar de tomar sitagliptina/metformina mientras se le realice el procedimiento y durante un tiempo después del mismo. Su médico decidirá cuándo debe interrumpir el tratamiento con sitagliptina/metformina y cuándo reiniciarlo.

Si no está seguro de si le afecta alguna de las circunstancias anteriores, consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar sitagliptina/metformina.

Durante el tratamiento con sitagliptina/metformina, su médico comprobará la función de sus riñones, al menos una vez al año o de manera más frecuente si usted es una persona de edad avanzada y/o si su función renal está empeorando.

### **Niños y adolescentes**

Los niños y adolescentes menores de 18 años no deben usar este medicamento. No es eficaz en niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 17 años. Se desconoce si este medicamento es seguro y eficaz cuando se usa en niños menores de 10 años.

### **Otros medicamentos y Sitagliptina/Metformina Stada**

Si necesita que se le administre en su torrente sanguíneo una inyección de un medio de contraste que contiene yodo, por ejemplo, en el contexto de una radiografía o de una exploración, debe dejar de tomar sitagliptina/metformina antes de la inyección o en el momento de la misma. Su médico decidirá cuándo debe interrumpir el tratamiento con sitagliptina/metformina y cuándo reiniciarlo.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento. Puede que necesite análisis más frecuentes de la glucosa en sangre y de la función renal, o puede que su médico tenga que ajustar la dosis de sitagliptina/metformina. Es especialmente importante mencionar lo siguiente:

- medicamentos utilizados para tratar enfermedades que producen inflamación, como el asma y la artritis, tomados por vía oral, inhalación o inyección (corticosteroides).
- medicamentos que incrementan la producción de orina (diuréticos).
- medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación (AINEs e inhibidores de la COX-2, como ibuprofeno y celecoxib).
- ciertos medicamentos para tratar la hipertensión (inhibidores de la ECA y antagonistas del receptor de la angiotensina II).
- medicamentos específicos para el tratamiento del asma bronquial (simpaticomiméticos  $\beta$ ).
- agentes de contraste yodados o medicamentos que contengan alcohol.
- ciertos medicamentos utilizados para tratar problemas de estómago (como cimetidina).
- un medicamento utilizado para tratar la angina de pecho (ranolazina).
- un medicamento utilizado para tratar la infección por VIH (dolutegravir).
- un medicamento utilizado para tratar un tipo específico de cáncer de tiroides como cáncer medular de tiroides (vandetanib).
- para tratar el latido cardiaco irregular y otros problemas del corazón (digoxina). Se puede necesitar comprobar el nivel de digoxina en su sangre si está tomando sitagliptina/metformina.

### **Toma de Sitagliptina/Metformina Stada con alcohol**

Evite la ingesta excesiva de alcohol mientras toma sitagliptina/metformina, ya que esto puede incrementar el riesgo de acidosis láctica (ver sección “Advertencias y precauciones”).

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. No debe tomar este medicamento durante el embarazo o si se encuentra en periodo de lactancia. Ver sección 2, **NO tome Sitagliptina/Metformina Stada.**

### **Conducción y uso de máquinas**

La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se han comunicado casos de mareos y somnolencia durante el tratamiento con sitagliptina, los cuales pueden afectar su capacidad para conducir y usar máquinas.

Tomar este medicamento junto con los medicamentos llamados sulfonilureas o con insulina puede producir hipoglucemia, que puede afectar a su capacidad para conducir y usar máquinas o trabajar sin un punto de apoyo seguro.

### **Sitagliptina/Metformina Stada contiene sodio**

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido; esto es, esencialmente “exento de sodio”.

## **3. Cómo tomar Sitagliptina/Metformina Stada**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

### Dosis

La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día.

Puede que su médico tenga que aumentar la dosis para controlar los niveles de azúcar en la sangre.

### Forma de administración

Debe tomarse por vía oral con alimentos para reducir la probabilidad de que sienta molestias en el estómago.

### Problemas de riñón

Si usted tiene una función renal reducida, su médico le puede recetar una dosis menor.

### Otros medicamentos y recomendaciones

Debe continuar con la dieta recomendada por su médico durante el tratamiento con este medicamento y tener cuidado de que la ingesta de hidratos de carbono se distribuya por igual durante el día.

Es poco probable que el tratamiento solo con este medicamento le produzca una bajada anormal del azúcar en sangre (hipoglucemia). Se puede producir una bajada del azúcar en sangre cuando este medicamento se toma junto con un medicamento que contenga sulfonilurea o con insulina, por lo que, es probable que su médico considere necesario reducir la dosis de su sulfonilurea o insulina.

### **Si toma más Sitagliptina/Metformina Stada del que debe**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si toma más de la dosis recetada de este medicamento, póngase en contacto con su médico inmediatamente. Vaya al hospital si usted tiene síntomas de acidosis láctica tales como sensación de frío o malestar, náuseas o vómitos intensos, dolor de estómago, pérdida inexplicable de peso, calambres musculares o respiración agitada (ver sección “Advertencias y precauciones”).

### **Si olvidó tomar Sitagliptina/Metformina Stada**

Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Si no se acuerda hasta la hora de su siguiente dosis, sátese la dosis olvidada y siga con el tratamiento habitual. No tome una dosis doble de este medicamento.

### **Si interrumpe el tratamiento con Sitagliptina/Metformina Stada**

Siga tomando este medicamento todo el tiempo que le indique su médico, para que le ayude a controlar el nivel de azúcar en la sangre. No debe dejar de tomar este medicamento sin consultar primero con su médico. Si interrumpe el tratamiento con sitagliptina/metformina, puede que su azúcar en sangre aumente de nuevo.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

## **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

**DEJE de tomar sitagliptina/metformina y póngase en contacto con un médico o el hospital más cercano inmediatamente si nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves:**

**Muy raros** (pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas):

- acidosis láctica (ver sección “Advertencias y precauciones”). La acidosis láctica puede conducir al coma

**DEJE de tomar sitagliptina/metformina y póngase en contacto un médico inmediatamente si nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves:**

**Frecuencia no conocida** (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

- dolor intenso y persistente en el abdomen (zona del estómago) que puede llegar hasta la espalda con o sin náuseas y vómitos. Estos pueden ser signos de una inflamación del páncreas (pancreatitis)
- reacción alérgica grave, incluyendo erupción cutánea, urticaria, ampollas en la piel/descamación de la piel e hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta que puede causar dificultad al respirar o tragar  
Su médico le prescribirá un medicamento para tratar la reacción alérgica y le cambiará el medicamento para el tratamiento de la diabetes

**Algunos pacientes que tomaban metformina han experimentado los siguientes efectos adversos después de comenzar el tratamiento con sitagliptina:**

**Frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- nivel bajo de azúcar en sangre
- náuseas
- gases
- vómito

**Poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- dolor de estómago
- diarrea
- estreñimiento
- somnolencia

**Algunos pacientes que tomaban metformina han experimentado los siguientes efectos adversos después de comenzar el tratamiento con la combinación de sitagliptina y metformina:**

**Frecuentes:**

- diarrea
- náuseas
- gases
- estreñimiento
- dolor de estómago
- vómitos

**Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos mientras tomaban este medicamento junto con una sulfonilurea tal como glimepirida:**

**Muy frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- niveles bajos de azúcar en la sangre

**Frecuentes:**

- estreñimiento

**Algunos pacientes presentaron los siguientes efectos adversos mientras tomaban este medicamento en combinación con pioglitazona:**

**Frecuentes:**

- hinchazón de manos o piernas

**Algunos pacientes presentaron los siguientes efectos adversos mientras tomaban este medicamento en combinación con insulina:**

**Muy frecuentes:**

- niveles bajos de azúcar en la sangre

**Poco frecuentes:**

- sequedad de boca
- dolor de cabeza

**Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos durante los estudios clínicos mientras tomaban sitagliptina sola (uno de los medicamentos que contiene sitagliptina/metformina) o durante el uso después de la aprobación de sitagliptina/metformina o sitagliptina sola o con otros medicamentos para la diabetes:**

**Frecuentes:**

- niveles bajos de azúcar en la sangre
- dolor de cabeza
- infección de las vías respiratorias superiores
- congestión o mucosidad nasal y dolor de garganta
- artrosis
- dolor en el brazo o la pierna

**Poco frecuentes:**

- mareos
- estreñimiento
- picor

**Raros:**

- reducción del número de plaquetas

**Frecuencia no conocida:**

- problemas de riñón (que en ocasiones requieren diálisis)
- vómitos
- dolor en las articulaciones
- dolor muscular
- dolor de espalda
- enfermedad intersticial de los pulmones
- un tipo de ampolla en la piel (penfigoide bulloso)

**Algunos pacientes han experimentado los siguientes efectos adversos después de tomar metformina sola:**

**Muy frecuentes:**

- náuseas
- vómitos
- diarrea
- dolor de estómago
- pérdida del apetito

Estos síntomas pueden aparecer cuando usted empieza a tomar metformina y habitualmente desaparecen.

**Frecuentes:**

- sabor metálico
- disminución o niveles bajos de vitamina B12 en sangre (los síntomas pueden incluir cansancio extremo (fatiga), dolor y enrojecimiento de la lengua (glositis), hormigueo (parestesia) o piel pálida o amarillenta). Su médico puede solicitar pruebas para averiguar la causa de sus síntomas porque algunos de ellos pueden estar causados también por diabetes u otros problemas de salud no relacionados

**Muy raros:**

- hepatitis (un problema del hígado)
- urticaria
- enrojecimiento de la piel (erupción)
- picor

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es). Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

**5. Conservación de Sitagliptina/Metformina Stada**

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

*Frascos*


No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el frasco y en el envase después de CAD.

*Blísteres*

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster y en el envase después de CAD.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**6. Contenido del envase e información adicional****Composición de Sitagliptina/Metformina Stada**

- Los principios activos son sitagliptina y metformina. Cada comprimido recubierto con película (comprimido) contiene sitagliptina hidrocloreto monohidrato equivalente a 50 mg de sitagliptina y 850 mg de metformina hidrocloreto.



- Los demás componentes son:

Núcleo del comprimido: celulosa microcristalina, povidona (K29/32), laurilsulfato de sodio, estearato de magnesio.

Recubrimiento con película: Copolímero de injerto de macrogol y poli(alcohol vinílico) (E1209), talco (E553b), dióxido de titanio (E171), GMDCC, GMCC mono/glicéridos Tipo 1, glicerol (E471), alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado (E1203), óxido de hierro rojo (E172).

#### **Aspecto de Sitagliptina/Metformina Stada y contenido del envase**

Comprimido recubierto con película, con forma ovalada, biconvexo, de color rosa, de aproximadamente 20,5 mm x 9,5 mm y con "S476" grabado en un lado.

#### Frascos

Los comprimidos recubiertos con película se envasan en un frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) y tapón de rosca de polipropileno (PP) con anillo de seguridad y desecante de gel de sílice contenido en el tapón de PP.

Envases de 100, 196 comprimidos.

#### Blísteres

Los comprimidos recubiertos con película se envasan en blísteres opacos de aluminio duro/PVC/PVDC.

Envases de 14, 28, 30, 56, 60, 196, 210 comprimidos.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

#### **Titular de la autorización de comercialización**

Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

España

info@stada.es

#### **Responsable de la fabricación**

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Alemania

o

Laboratorios Liconsa S.A.

Avenida Miralcampo 7

19200 Azuqueca De Henares

España

o

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Vienna

Austria

o

Clonmel Healthcare Limited

3 Waterford Road

E91 D768 Clonmel

Irlanda

**Este medicamento está autorizado en los estados miembros del Espacio Económico con los siguientes nombres:**

Holanda	Sitagliptine/Metformine hydrochloride STADA 50 mg/850 mg filmomhulde tabletten
Austria	Sitagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg Filmtabletten
República Checa	Sitagliptin/Metformin STADA
Alemania	Sitagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg Filmtabletten
Dinamarca	Sitagliptin/Metformin STADA
España	Sitagliptina/Metformina STADA 50 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finlandia	Sitagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit
Irlanda	Sitagliptin/Metformin Clonmel 50 mg/850 mg film-coated tablets
Islandia	Sitagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg filmuhúðaðar töflur
Italia	Sitagliptin e Metformina EG
Portugal	Metformina + Sitagliptina Ciclum
Suecia	Sitagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg filmdragerade tabletter
Eslovenia	Sitagliptin/metforminijev klorid STADA 50 mg/850 mg filmsko obložene tablete
Eslovaquia	Sitagliptin-Metformin STADA 50mg/850mg filmom obalené tablety

**Fecha de la última revisión de este prospecto:** marzo 2024

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).